

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

Id	Quesito	Risp_esatta	Risp_errata_1	Risp_errata_2	Risp_errata_3	Materia
1	Cos'è la compromissione della mobilità?	La compromissione della mobilità è una diagnosi infermieristica	La compromissione della mobilità è un problema collaborativo	La compromissione della mobilità è una complicanza clinica	La compromissione della mobilità è una diagnosi riabilitativa	INFERMIERISTICA GENERALE
2	NANDA accetta proposte per nuove diagnosi, da quale dei seguenti soggetti?	Qualsiasi infermiere interessato	Organizzazione mondiale della sanità	Esperti di riconosciuto valore	Ordini infermieristici	INFERMIERISTICA GENERALE
3	In cosa consiste la consegna infermieristica?	Una sorta di diario di reparto su cui è riportato tutto ciò che attiene alla vita del reparto stesso	Una relazione sul lavoro del caposala	Una tabella per segnare le ore di straordinario	Una scheda contenente il nome dei farmaci da somministrare	INFERMIERISTICA GENERALE
4	Secondo NANDA, quali sono gli elementi di una diagnosi infermieristica reale:	Titolo, definizione, caratteristiche definenti, fattori correlati	Titolo, definizione, caratteristiche definenti, eziologia	Titolo, definizione, sintomi, fattori correlati	Categoria, definizione, caratteristiche definenti, fattori correlati	INFERMIERISTICA GENERALE
5	Per quanto tempo la cartella clinica viene conservata:	per tempo illimitato	per dieci anni	fino alla morte del paziente	per cinque anni dopo la dimissione o il decesso	INFERMIERISTICA GENERALE
6	L'assistenza infermieristica si realizza attraverso quale tipi di intervento:	specialistico, autonomi e complementari, di natura tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativi	interventi pratici, soprattutto di somministrazione farmaci	interventi di assistenza tecnica e relazionale del paziente mai autonomi	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
7	Cos'è l'assistenza infermieristica o nursing:	è una disciplina che consiste essenzialmente nell'assistere e prendersi cura degli individui, delle famiglie e delle comunità per ottenere, riottenere e mantenere lo stato di salute	è caratterizzata prettamente dall'assistenza del malato in ospedale	non interessa la comunità ma il singolo individuo	non è regolata da un codice etico	INFERMIERISTICA GENERALE
8	Qual è il modello concettuale di salute che rende più evidente la specificità della professione infermieristica:	il modello bio-psico-sociale	il modello bio-organicistico	il modello psico-sociale	il modello biologico	INFERMIERISTICA GENERALE
9	Cosa si intende per procedura:	una serie logica di interventi finalizzati ad effettuare un trattamento secondo criteri standard	una serie logica di interventi finalizzati ad effettuare un trattamento secondo criteri induttivi	una serie logica di interventi finalizzati ad effettuare un trattamento secondo criteri prestabiliti di appropriatezza ed efficacia	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
10	Come è denominato il costrutto teorico di nursing transculturale elaborato da Purnell e Paulanka:	modello della competenza culturale	modello della salute-malattia	modello della diversità	modello globalizzato	INFERMIERISTICA GENERALE
11	Il protocollo infermieristico ha la funzione di:	uniformare i diversi comportamenti infermieristici	informare il paziente circa le prestazioni che l'équipe assistenziale è in grado di offrire	definire in collaborazione con il caposala/coordinatore le attività del reparto	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
12	Nel modello concettuale elaborato da Calista Roy, come sono definiti gli agenti di stress:	stimoli ambientali che richiedono una risposta adattiva	reazioni essenzialmente patologiche alle sollecitazioni ambientali	azioni in grado di scatenare reazioni abnormi	stimoli abnormi in risposta a situazioni problematiche	INFERMIERISTICA GENERALE
13	Secondo le ipotesi teoriche di F. Nightingale, il concetto di ambiente è:	essenzialmente fisico	essenzialmente psico-sociale	inteso in senso globale	essenzialmente sociale	INFERMIERISTICA GENERALE
14	Si può parlare di ambito disciplinare un insieme di conoscenze che ha almeno:	un proprio oggetto di studio, uno scopo e un metodo	strumenti disciplinari e non disciplinari	una tradizione culturale	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
15	La prima azione della cosiddetta catena della sopravvivenza prevede:	la chiamata del 118	l'applicazione della ventilazione artificiale	l'uso del defibrillatore	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
16	Da chi è stato introdotto l'approccio interpretativo fenomenologico nel nursing:	M. Rogers	M. Leininger	F. G. Abdellah	V. Henderson	INFERMIERISTICA GENERALE
17	Cosa rappresenta il piano di assistenza infermieristica:	rappresenta un metodo idoneo per comunicare e organizzare l'assistenza	rappresenta un metodo efficace per gestire il budget assegnato ad ogni dipartimento assistenziale	è la rappresentazione grafica del metodo di lavoro adottato all'interno di un'équipe assistenziale	rappresenta un metodo efficace per gestire il budget assegnato ad ogni dipartimento delle professioni sanitarie	INFERMIERISTICA GENERALE
18	Com'è denominato il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro in serie per linea di attività:	modello tecnico o per compiti	modello per piccole équipe	modello primary care	modello personalizzato di cure	INFERMIERISTICA GENERALE
19	Da chi è stato elaborato il concetto di self care:	Dorothea Orem	Nathan Roper	Maria Montessori	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
20	Qual è l'obiettivo della terapia palliativa:	il miglioramento della qualità della vita	la guarigione clinica del paziente	la possibilità di evitare una terapia chirurgica	la riduzione delle dimensioni del tumore	INFERMIERISTICA GENERALE
21	Quali sono le dimensioni della salute:	fisica, psichica, emotiva, relazionale, spirituale, sociale	fisica, psichica, emotiva, relazionale, spirituale, territoriale	fisica, psichica, emotiva, relazionale, religiosa, sociale	fisica, psichica, emotiva, relazionale, religiosa, economica	INFERMIERISTICA GENERALE
22	Cosa NON includono i modelli funzionali (fisiologici) specificati da Gordon:	la prevenzione dei rischi	l'attività ed esercizio fisico	la sessualità e riproduzione	il riposo e sonno	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

23	Il testo teorico di maggior rilievo di Virginia Henderson è:	The Principles and Practice of Nursing	The Foundations of Nursing	Nursing: a general Theory	Theory and Practice of Nursing	INFERMIERISTICA GENERALE
24	Cosa definisce il concetto di empowerment:	un processo intenzionale orientato allo sviluppo della capacità dei membri di risolvere i problemi in modo adeguato, utilizzando specifiche competenze	la mobilitazione delle risorse a disposizione degli individui in relazione ai diversi carichi di lavoro	l'azione di un gruppo di lavoro che deve migliorare il sistema di qualità aziendale	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
25	Quali sono le fasi essenziali del nursing secondo le ipotesi teoriche di Peplau:	orientamento, identificazione, utilizzazione, risoluzione	raccolta dati, identificazione, formulazione degli obiettivi, valutazione	orientamento e definizione del campo problematico	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
26	Quale filosofa del nursing definisce il bisogno come «una qualsiasi esigenza da parte della persona ammalata che può essere soddisfatta da un infermiere professionale»?	J. Travelbee	D. Orem	J. Watson	E. Adam	INFERMIERISTICA GENERALE
27	La NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) come definisce le diagnosi infermieristiche:	un giudizio clinico sulle risposte di un individuo, di una famiglia o di una comunità a processi di salute/vita reali o potenziali	un obiettivo infermieristico	una singola definizione concettuale come obesità o malnutrizione	un sintomo come, per esempio, il vomito	INFERMIERISTICA GENERALE
28	Qual è la sequenza corretta del processo di assistenza:	accertamento, diagnosi, pianificazione, attuazione, valutazione	diagnosi, accertamento, attuazione, pianificazione, valutazione	accertamento, pianificazione, diagnosi, attuazione, valutazione	accertamento, valutazione, diagnosi, pianificazione, attuazione	INFERMIERISTICA GENERALE
29	La celebrazione della giornata dell'infermiere cade ogni anno il 12 maggio, perchè:	è nata Florence Nightingale	è nata Virginia Henderson	è stata istituita la prima scuola per infermiere in Gran Bretagna	è stato fondato il consiglio nazionale delle infermiere (ICN)	INFERMIERISTICA GENERALE
30	Qual è la differenza fra segno e sintomo?	Il sintomo è una sensazione soggettiva mentre il segno rappresenta un'evidenza oggettiva	Si manifesta sempre prima il sintomo e poi il segno	Il sintomo segue sempre il segno	Il sintomo viene riferito ad un organo interno, il segno ad una zona esterna dell'organismo	INFERMIERISTICA GENERALE
31	Secondo Carpenito gli infermieri hanno la responsabilità di trattare:	diagnosi infermieristiche e problemi collaborativi	interventi clinici e diagnostici secondo prescrizione medica	interventi di infermieristica avanzata	diagnosi infermieristiche e prescrizioni mediche	INFERMIERISTICA GENERALE
32	La Carta di Ottawa definisce i parametri del concetto di salute con riferimento a:	aspirazioni, bisogni, modificazione dell'ambiente o adattamento ad esso	esitamento e riduzione dei danni e delle patologie	interventi di infermieristica avanzata	concetto di salute, concetto di malattia, concetto di intervento sanitario	INFERMIERISTICA GENERALE
33	Chi è l'infermiere:	il professionista responsabile dell'assistenza infermieristica	la persona che fa da tramite tra il paziente e il medico	colui che dipende in ogni sua azione dal medico	colui che mette in pratica le terapie prescritte dal medico	INFERMIERISTICA GENERALE
34	Qual è il ruolo dell'infermiere:	assistere l'ammalato ma anche supportare emotivamente i suoi familiari	partecipare all'assistenza del paziente eseguendo solo istruzioni mediche	assistere l'ammalato prescindendo dai suoi familiari	assistere solo ed esclusivamente il paziente accentrando tutta la sua attenzione su di lui	INFERMIERISTICA GENERALE
35	Cos'è la cartella infermieristica:	è uno strumento di supporto cartaceo e/o informatico atto a contenere la registrazione dei dati e l'insieme dei documenti di pertinenza	è compilata solo ed esclusivamente dal medico di turno	nessuna delle altre risposte è corretta	non è considerata un documento valido per una buona pratica infermieristica	INFERMIERISTICA GENERALE
36	Qual è il metodo attualmente più diffuso per la valutazione del rischio nelle strutture sanitarie:	il metodo MAPO	la misura dinamometrica	la valutazione del numero dei posti letto	il metodo NIOSH	INFERMIERISTICA GENERALE
37	Indicare la finalità del triage all'ingresso in pronto soccorso:	l'agevolazione dell'accesso alle cure non sulla base dell'ordine di arrivo ma della gravità delle condizioni	la compilazione della cartella clinica	nessuna delle altre risposte è corretta	l'assegnazione ad ogni paziente di un numero che definisca l'ordine di arrivo	INFERMIERISTICA GENERALE
38	La teoria di Madeleine Leininger tratta i problemi dell'infermieristica rivolti:	alla multiculturalità e transculturalità	all'ambiente e relazione	all'adattamento e consapevolezza	al self-care	INFERMIERISTICA GENERALE
39	Cosa implica la nozione di pianificazione assistenziale:	l'acquisizione di dati, la previsione delle condizioni future, la definizione degli obiettivi	esclusivamente la previsione delle condizioni future	nessuna delle altre risposte è corretta	l'acquisizione delle caratteristiche strutturali dell'azienda presa in esame, la conoscenza delle condizioni di budget attuali e la definizione degli obiettivi	INFERMIERISTICA GENERALE
40	La teoria dei bisogni, nelle discipline infermieristiche, è un modello teorico elaborato da:	V. Henderson	A. Maslow	J. Travelbee	D. Snell	INFERMIERISTICA GENERALE
41	Cosa si intende per profilo di cura:	un piano di cura interdisciplinare creato per rispondere ai problemi diagnostici e clinici di gruppi di pazienti	la continuità assistenziale tra strutture ospedaliere e strutture territoriali	il piano di cura proposto dal medico di base	un piano di cura creato per rispondere al profilo psicologico di gruppi di pazienti	INFERMIERISTICA GENERALE
42	Cosa impilca il concetto di sviluppo sostenibile:	uno sviluppo economico compatibile con il complesso degli ecosistemi, in regime di equilibrio ambientale	un'iniziativa legislativa circa un progetto ambientale sviluppato in linea con le normative nazionali	nessuna delle altre risposte è corretta	il rapporto genericamente positivo tra progetti umani e ambiente fisico	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

43	La prospettiva emic nel nursing transculturale indica il:	punto di vista folk o popolare	punto di vista appreso e trasmesso a livello formale	rapporto supportivo che intercorre tra due persone, infermiere e utente, che ricoprono ruoli paritetici	processo del prendersi cura	INFERMIERISTICA GENERALE
44	Con l'espressione "Evidence Based Nursing" cosa si intende:	l'uso, nella pratica infermieristica, di verifiche empiriche in associazione con diagnosi cliniche	l'accentuazione delle problematiche socio-sanitarie in contesti politico-istituzionali	nessuna delle altre risposte è corretta	l'uso, nella pratica infermieristica, di modelli logici e procedure deduttive	INFERMIERISTICA GENERALE
45	Non è un sistema di classificazione dell'assistenza infermieristica:	il DRG	il NOC	il NANDA	il NIC	INFERMIERISTICA GENERALE
46	Quando un bisogno diventa una richiesta sanitaria?	Quando un individuo, sano o malato, si rivolge alla struttura sanitaria	Quando un individuo non presenta alcun problema medico	Nessuna delle altre risposte è corretta	Quando un individuo prenota un check-up completo	INFERMIERISTICA GENERALE
47	I piani assistenziali standardizzati cosa contengono:	linee guida che indicano l'assistenza da erogare in situazioni tipiche	standard di procedure organizzative di specifiche unità assistenziali	problemi ed obiettivi personalizzati	problemi, obiettivi ed interventi personalizzati di assistenza infermieristica	INFERMIERISTICA GENERALE
48	Un gruppo di pazienti, il cui il lavoro è basato sulla pianificazione e l'integrazione, prende il nome di:	modello per piccole équipes	modello primary care	modello dell'équipe multidisciplinare	modello tecnico o per compiti	INFERMIERISTICA GENERALE
49	Cos'è l'unità del malato?	Lo spazio e gli accessori dati in uso al paziente durante la sua degenza	La terapia e la diagnosi	Il materiale necessario per la terapia durante la degenza	L'équipe medica e infermieristica addetta alla sua degenza	INFERMIERISTICA GENERALE
50	La legge n. 42 del 1999 sostituì la denominazione professione sanitaria ausiliaria in:	professione sanitaria	professione ausiliaria	lavoratore in campo sanitario	lavoratore sanitario	INFERMIERISTICA GENERALE
51	Quale provvedimento ha istituito la qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario?	Il d.lgs. 229/1999	La legge 261/2002	La legge 261/2000	La legge 271/2000	INFERMIERISTICA GENERALE
52	L'infermiere è tenuto a mantenere il segreto professionale, in quali casi:	sia per obbligo giuridico che come espressione del rapporto di fiducia creatosi con il paziente	può agire come meglio crede senza particolari obblighi	solo per obblighi giuridici	per acquisire la fiducia del paziente	INFERMIERISTICA GENERALE
53	Il principio fondamentale della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari è:	il potere di controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati	nessuna delle altre risposte è corretta	l'agevolazione concessa ad utenti bisognosi circa l'utilizzo dei servizi sanitari pubblici	il rispetto del dettato costituzionale in materia socio-sanitaria	INFERMIERISTICA GENERALE
54	Il modello funzionale di salute identificato da M. Gordon è rappresentato:	dall'attività ed esercizio	dai sistemi corporei	dall'autorealizzazione	dalla continuità assistenziale	INFERMIERISTICA GENERALE
55	Cosa si intende per accreditamento professionale:	costituisce un sistema standardizzato di valutazione della qualità delle prestazioni professionali in strutture private	può contribuire a promuovere la buona qualità delle prestazioni erogate	definisce i prerequisiti di una struttura privata ai fini di ottenere la possibilità di erogare servizi pubblici	corrisponde alla verifica periodica dei requisiti funzionali minimi di una struttura socio-sanitaria	INFERMIERISTICA GENERALE
56	Il processo di nursing è definibile come:	un metodo d'identificazione e di soluzione dei problemi infermieristici	nessuna delle altre risposte è corretta	un metodo d'identificazione degli interventi più appropriati	un processo dinamico di individuazione delle aree di competenza del nursing	INFERMIERISTICA GENERALE
57	Per ospedalizzazione domiciliare si intende:	una forma di ospedalizzazione alternativa al ricovero	una forma di preospedalizzazione	il confino di un paziente affetto da una malattia infettiva contagiosa	l'assistenza domiciliare prestata a pazienti affetti da malattie	INFERMIERISTICA GENERALE
58	L'ambiente in cui si svolge l'interazione infermiere/paziente si definisce terapeutico quando:	il modello organizzativo dell'assistenza è basato sulla multidisciplinarietà	il modello organizzativo dell'assistenza è basato sul riduzionismo teorico di alcune discipline rispetto ad altre	sussiste una netta divisione dei compiti all'interno dell'équipe assistenziale	prevale una concezione organicistica della salute dell'uomo	INFERMIERISTICA GENERALE
59	Le tecniche ergonomiche si occupano di:	definire le condizioni migliori affinché il lavoro possa adattarsi all'uomo	nessuna delle altre risposte è corretta	legiferare in materia di prevenzione sugli infortuni del lavoro	ottimizzare le performance in lavori che implicano l'utilizzo di macchinari complessi	INFERMIERISTICA GENERALE
60	Il sistema di sorveglianza delle infezioni ospedaliere risulta efficace quando:	è continuativo e si basa sulla raccolta dei dati di laboratorio, sulle notifiche dei casi da parte dei medici delle unità operative e sulla raccolta dei dati effettuati	nessuna delle altre risposte è corretta	si basa sulla raccolta di dati microbiologici derivati dall'effettuazione di analisi sui campioni biologici dei pazienti ritenuti infetti	non è continuativo ma implica frequenti controlli a campione	INFERMIERISTICA GENERALE
61	Di cosa si occupa la semeiotica:	dello studio dei sintomi di una determinata patologia	nessuna delle altre risposte è corretta	dell'individuazione delle specie dei semi	dello studio dei processi culturali di significazione in genere	INFERMIERISTICA GENERALE
62	Fabbisogno di personale di assistenza. Qual è uno degli indici per calcolarlo adeguatamente:	il PRN	il PCA	il PDCA	il metodo inglese	INFERMIERISTICA GENERALE
63	Nella sperimentazione clinica, viene definito gruppo di controllo il gruppo:	di pazienti che non ricevono il trattamento oggetto di sperimentazione	nessuna delle altre risposte è corretta	di pazienti oggetto effettivo di sperimentazione	del campione complessivo di riferimento	INFERMIERISTICA GENERALE
64	Indicare quale tra le seguenti è una fonte autorevole di revisioni sistematiche della letteratura biomedica:	Cochrane Library	Elsevier	C.I.N.A.H.L.	Google	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

65	Nel modello di quale tra le seguenti studiosi la cura di sé è interpretata come essenziale bisogno umano?	D. Orem	E. Adam	J. Watson	E. Wiedenbach	INFERMIERISTICA GENERALE
66	Il personale obiettore può rifiutarsi di prestare assistenza antecedente o conseguente all'intervento diretto, che determina l'interruzione della gravidanza alle donne che abortiscono?	No	Solo se qualcun altro può prestare assistenza al posto loro	Solo in alcune Regioni	In alcuni casi	INFERMIERISTICA GENERALE
67	Quale attività non è di competenza dell'operatore professionale coordinatore?	Delegare ad esterni l'attività didattica e di formazione	Partecipare ad eventuali commissioni per l'acquisto di materiali ed attrezzature	Esercitare funzioni di controllo e supervisione	Coordinare l'attività del personale	INFERMIERISTICA GENERALE
68	I crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) sono stati imposti:	a tutti gli operatori dipendenti o liberi professionisti, operanti sia nella sanità pubblica che in quella privata	solo ai liberi professionisti	solo agli operatori che operano nella sanità privata	solo agli operatori sanitari che operano nella sanità pubblica	INFERMIERISTICA GENERALE
69	Il NIC (Nursing Interventions Classification) riporta esclusivamente interventi infermieristici:	nessuna delle altre risposte è corretta	generalistici	specialistici	collaborativi	INFERMIERISTICA GENERALE
70	La diagnosi infermieristica:	indirizza gli interventi volti a conseguire dei risultati di cui è responsabile l'infermiere	non può mai costituire un giudizio clinico	è sinonimo di diagnosi medica	non esiste	INFERMIERISTICA GENERALE
71	Nightingale istituì le prime scuole per infermiere allo scopo di:	tutte le altre risposte sono corrette	innalzare lo status sociale dell'infermiere	attrezzare le infermiere con competenze specifiche	preparare infermiere-insegnanti per le allieve infermiere	INFERMIERISTICA GENERALE
72	Fra gli strumenti che hanno mostrato la maggiore utilità nella valutazione del rischio di caduta di un paziente si annovera:	la scala di Conley	la scala di Likert	la scala di Cheops	la scala ADL di Katz	INFERMIERISTICA GENERALE
73	Indicare quale tra i seguenti principi non è contemplato nell'atto costitutivo dell'OMS:	nessuna delle altre risposte è corretta	la salute dei popoli	il pericolo delle condizioni di ineguaglianza tra i diversi paesi	l'ammissione di tutti i popoli ai benefici delle conoscenze acquisite dalla ricerca scientifica	INFERMIERISTICA GENERALE
74	Quale delle seguenti funzioni non appartiene al coordinatore professionale sanitario esperto?	Pulizia e riordino degli ambienti	Analisi del sistema organizzativo	Gestione delle dinamiche e delle motivazioni al lavoro	Esercizio della leadership	INFERMIERISTICA GENERALE
75	Secondo l'approccio per attributi di Greenwood, quale tra i seguenti non è un carattere distintivo di una professione?	L'orientamento teorico del professionista	La cultura professionale	La sanzione della comunità	L'autorità professionale	INFERMIERISTICA GENERALE
76	Il Center for Disease Control di Atlanta, nel 2007, ha identificato delle linee guida per l'isolamento in ospedale prevedendo due livelli di intervento. Quali fra le seguenti non sono precauzioni raccomandate in tale sede?	Precauzioni generiche	Precauzioni per malattie a trasmissione aerea	Precauzioni per malattie a trasmissione attraverso droplet	Precauzioni per malattie trasmissibili attraverso il contatto	INFERMIERISTICA GENERALE
77	Il Daily Routine Work è un metodo di miglioramento della qualità:	per l'outcome	per gli esiti	per obiettivi	per la struttura	INFERMIERISTICA GENERALE
78	Da chi è stato elaborato il modello della salute come espansione della coscienza:	M. A. Newman	C. Roy	E. Wiedenbach	N. Roper	INFERMIERISTICA GENERALE
79	L'infermieristica secondo alcune classificazioni è considerata una scienza:	prescrittiva	normativa	ecologica	descrittiva	INFERMIERISTICA GENERALE
80	Indicare quale delle seguenti azioni non fa parte delle fasi del processo di assistenza infermieristica:	prevenzione dei rischi	accertamento e diagnosi	identificazione degli obiettivi	pianificazione e attuazione	INFERMIERISTICA GENERALE
81	Il concetto di area critica implica:	una struttura complessivamente ritenuta idonea a fornire assistenza ottimale al paziente critico	mezzi ed ambiente adatti all'assistenza di un paziente in condizioni gravi	zona sorvegliata in cui può accedere solo personale autorizzato	un reparto dotato di attrezzature di terapia intensiva	INFERMIERISTICA GENERALE
82	L'ambiente in cui si svolge l'interazione infermiere/paziente si definisce terapeutico quando:	propone un modello di assistenza basato su approcci multidisciplinari	sussiste una netta divisione dei compiti all'interno dell'équipe assistenziale	emerge la componente tecnica della professione infermieristica	prevale una concezione organicistica della salute dell'uomo	INFERMIERISTICA GENERALE
83	Come è definibile la sorveglianza sanitaria:	attività di prevenzione basata sul controllo sanitario dei lavoratori esposti a rischio, al fine di proteggere la loro salute e prevenire malattie professionali e correlate al lavoro	misura di controllo delle acque di balneazione	misura di restrizione applicata ai contatti sani di un caso contagioso	misura di controllo degli animali da macello	INFERMIERISTICA GENERALE
84	Nell'ambito della formazione, le competenze chiave del professionista vengono anche definite:	competenze trasversali	competenze di base	competenze esperte	competenze avanzate	INFERMIERISTICA GENERALE
85	Come vengono definiti in medicina gli acufeni?	percezioni di fenomeni sonori nonostante l'assenza di stimolazione fisiologica dei recettori cocleari	mancata percezione dei suoni esterni	vertigini adolescenziali	formazioni delle cupole ampollari	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

86	Quale patologia ha come sintomo caratteristico la diarrea ad acqua di riso?	Colera	Salmonella	Infezione da HSV	Infezione da micobatteri atipici	INFERMIERISTICA GENERALE
87	Qual è la principale caratteristica delle ustioni di secondo grado:	flittene	infezione virale	escara molle	diminuzione di tessuto necrotico	INFERMIERISTICA GENERALE
88	La peculiarità della tossina botulinica, è:	Penetra attraverso la barriera ematoencefalica	Viene inattivata a 37 C° per 5 minuti	Inibisce la divisione cellulare	Viene prodotta dai germi comuni	INFERMIERISTICA GENERALE
89	In quali casi definiamo la febbre come febbre intermittente:	la temperatura presenta dei rialzi improvvisi, separati da periodi in cui i valori sono nella norma	la temperatura rimane elevata con variazioni di un grado	la temperatura si mantiene per breve tempo a 38 °C	si alternano periodi in cui la temperatura si eleva gradualmente a periodi di stabile ipertermia	INFERMIERISTICA GENERALE
90	Quale occlusione intestinale non è uno strangolamento:	l'ileo biliare	il volvolo del tenue	l'ernia strozzata	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
91	La definizione di pneumoconiosi è:	malattia professionale polmonare	broncopneumopatia maligna ostruttiva	broncopneumopatia cronica	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
92	Il vaccino antitetanico è formato da:	anatossina	batteri vivi attenuati	batteri uccisi al calore	batteri vivi	INFERMIERISTICA GENERALE
93	Cos'è il botulismo?	Un'intossicazione alimentare	Un'epatite alcolica	Un avvelenamento da funghi	Un'infezione a trasmissione aerea	INFERMIERISTICA GENERALE
94	La principale modalità di trasmissione del virus dell'epatite E è:	oro-fecale	transplacentale	via respiratoria	attraverso morsi di animali	INFERMIERISTICA GENERALE
95	Le misure di isolamento in ospedale prevedono l'utilizzo di precauzioni:	standard e aggiuntive	universali	per i liquidi biologici infetti	per i liquidi biologici in persone con HIV positivo	INFERMIERISTICA GENERALE
96	Quale tra le seguenti sostanze ha azione irritante sull'apparato broncopolmonare:	acido solforico	rame	ferro	lattice	INFERMIERISTICA GENERALE
97	L'emottisi è:	emissione di sangue proveniente dalle vie respiratorie	emissione di sangue dall'apparato urinario	emissione di sangue con le feci	emissione di sangue proveniente dalle vie digestive	INFERMIERISTICA GENERALE
98	L'origine dell'encefalomielite acuta disseminata è:	virale	batterica	parassitaria	eziologia non infettiva	INFERMIERISTICA GENERALE
99	Si definisce dismorfofobia la paura di:	deformazioni corporee	malattie	buio	colori	INFERMIERISTICA GENERALE
100	Quale patologia è caratterizzata dalla sindrome del dito bianco?	vibrazioni	tunnel carpale	idrargirismo	avvelenamento da solventi organici	INFERMIERISTICA GENERALE
101	La Toxoplasmosi è una patologia che si trasmette tramite le feci di quale dei seguenti animali:	gatto	galline	canarino	roditori	INFERMIERISTICA GENERALE
102	Si definisce sincope:	una temporanea alterazione o perdita dello stato di coscienza	un sintomo dell'epilessia	un sinonimo di ipotermia	una perdita di coscienza irreversibile	INFERMIERISTICA GENERALE
103	Le emorroidi di terzo grado sono caratterizzate da:	protrusione con il ponzamento che si riduce manualmente	protrusione nella defecazione che si riduce spontaneamente	sanguinamenti	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
104	La Salmonella typhi nel primo settenario di malattia può essere isolata da:	sangue	liquor	urine	muco	INFERMIERISTICA GENERALE
105	Con la colorazione di Ziehl-Neelsen al microscopio osserviamo:	il bacillo della tubercolosi	Stafilococchi	Neisserie	Streptococchi	INFERMIERISTICA GENERALE
106	Le macchie di Janeway sono tipiche di:	endocardite infettiva	tifo	rosolia	vaiolo	INFERMIERISTICA GENERALE
107	Quale è l'obiettivo della terapia HAART?	Bloccare la replicazione virale	Prevenire l'infezione nel soggetto esposto	Vaccinare il soggetto non esposto	Prevenire le infezioni opportunistiche AIDS correlate	INFERMIERISTICA GENERALE
108	Che tipo di complicanza è più frequente nel morbillo?	Broncopolmonite	Epatite	Epilessia	Nefriti interstiziali	INFERMIERISTICA GENERALE
109	Quale mitto di urina bisogna prendere per eseguire un'analisi batteriologica?	Il mitto intermedio	Il mitto iniziale	Il mitto terminale	Il mitto intermedio e quello terminale	INFERMIERISTICA GENERALE
110	L'adrenalina viene usata in quale caso:	fibrillazione ventricolare	tachicardia	angina pectoris	blocco atrio-ventricolare	INFERMIERISTICA GENERALE
111	Perché prima di eseguire una venipuntura si aspira il sangue?	Per essere sicuri di avere inserito l'ago in vena	Per ridurre il rischio di complicanze	Per operare un lavaggio fisiologico della siringa	Per ridurre le complicanze infettive	INFERMIERISTICA GENERALE
112	La scala di Maslow serve per capire:	le necessità e i bisogni dell'uomo	il rischio radioattivo	lo stato di coma	lo stato di idratazione	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

113	A quale anno risale l'emanazione del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro?	2008	2010	2012	2014	INFERMIERISTICA GENERALE
114	In caso di intervento chirurgico ai polmoni cosa bisogna fare:	effettuare ginnastica respiratoria	somministrare i farmaci preanestetici	controllare la zona interessata	preparare il tavolo operatorio	INFERMIERISTICA GENERALE
115	Quale procedura è indispensabile per eseguire un cateterismo vescicale?	Disinfezione del meato uretrale esterno	Porre il paziente in decubito prono	Puntura sovrapubica	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
116	In che anno Fleming scoprì la penicillina?	1929	1937	1945	1925	INFERMIERISTICA GENERALE
117	La talassemia è trasmessa con meccanismo:	autosomico recessivo	legato al cromosoma X	legato al cromosoma Y	autosomico codominante	INFERMIERISTICA GENERALE
118	Il flebopatico peggiora generalmente in quale stagione:	estate	autunno	inverno	non risente di variazioni stagionali	INFERMIERISTICA GENERALE
119	Quale dei seguenti fattori svolge un ruolo determinante nella formazione delle piaghe da decubito?	Perdita della sensibilità dolorifica	Stato settico	Ipossia locale per fenomeni vasospastici	Umidificazione dei tessuti cutanei	INFERMIERISTICA GENERALE
120	Quale dei seguenti fattori è coinvolto nella cardiomiopatia congestizia?	Alcool	Dieta ipoproteica	Obesità	Ipercolesterolemia	INFERMIERISTICA GENERALE
121	Il segno più affidabile di una trombosi profonda è:	edema distale dell'arto	senso di peso e di tensione	dilatazione delle vene superficiali	rossore e infiammazione del tessuto sottocutaneo	INFERMIERISTICA GENERALE
122	Quale fra le seguenti malattie del connettivo presenta con maggior frequenza un interessamento dell'esofago?	Sclerodermia	Dermatomiosite	Artrite reumatoide	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
123	Nell'endocardite infettiva dell'esame del sedimento urinario mostra pressoché costantemente:	microematuria	cilindruria	cristalluria (ossalati e urati)	tappeto di cellule delle basse vie urinarie morfologicamente alterate	INFERMIERISTICA GENERALE
124	Un paziente di 60 anni presenta da tempo tosse stizzosa e febbre irregolare. Il primo esame da richiedere ai fini della diagnosi è:	Rx torace	esame citologico dell'espettorato	Tine Test	broncoscopia	INFERMIERISTICA GENERALE
125	La valutazione definitiva dell'arresto cardiaco si fa attraverso:	l'ECG	il riscontro di assenza del polso periferico	il riscontro della scomparsa della pressione sanguigna	il riscontro di assenza di respiro spontaneo	INFERMIERISTICA GENERALE
126	In quale di queste condizioni si rileva di solito tremore a riposo, bradicinesia e rigidità muscolare?	Morbo di Parkinson	Morbo di Sture-Weber	Sclerosi laterale amiotrofica	Siringomielia	INFERMIERISTICA GENERALE
127	La sede più comune negli arti inferiori in cui un embolo si arresta è:	femorale comune	femorale profonda	poplitea	tibiale anteriore	INFERMIERISTICA GENERALE
128	La definizione di focolaio epidemico si differenzia da quella classica di epidemia per il fatto che:	l'epidemia si è sviluppata improvvisamente in un contesto spaziale limitato	si sono manifestati solo uno o pochi casi di malattia in una popolazione nella quale tale patologia è normalmente assente	un agente patogeno persiste in una determinata popolazione causando un numero di casi di malattia che tende a mantenersi stabile nel tempo	l'epidemia si diffonde attraverso i continenti	INFERMIERISTICA GENERALE
129	Quale tra i seguenti sintomi non precede la crisi ipoglicemica?	Poliuria	Cefalea	Sudorazione	Tachicardia	INFERMIERISTICA GENERALE
130	Cosa indica la poichilocitosi:	la presenza di eritrociti di forme diverse	la presenza di eritrociti di dimensioni diverse	una particolare forma di leucocitosi	la presenza di eritrociti con diversa concentrazione di emoglobina	INFERMIERISTICA GENERALE
131	Quale delle seguenti malattie si può trasmettere per via aerea?	Parotite	Mononucleosi	Meningite cerebrospinale epidemica	Tutte le altre risposte sono corrette	INFERMIERISTICA GENERALE
132	Quale delle seguenti sostanze può determinare neuropatie?	Mercurio	Lattice	Cadmio	Talco	INFERMIERISTICA GENERALE
133	La frattura di Colles è localizzata a livello di quale parte de corpo:	estremità distale del radio	estremità prossimale del femore	piede	bacino	INFERMIERISTICA GENERALE
134	Che cosa si intende per acalasia:	assenza di peristalsi esofagea	contrazioni non peristaltiche con periodi di peristalsi normale	peristalsi normale con onde di ampiezza elevata	turbe aspecifiche della malattia esofagea	INFERMIERISTICA GENERALE
135	Per un paziente in stato di shock ipovolemico è indicata una terapia:	infusionale-trasfusionale	antiaritmica	antiipertensiva	con alfamimetici	INFERMIERISTICA GENERALE
136	Le proteine G sono:	parte del sistema di trasduzione del segnale	canali ionici	presenti nel nucleo cellulare	proteine del plasma	INFERMIERISTICA GENERALE
137	In quale caso, tra i seguenti, un infermiere è tenuto ad effettuare un lavaggio antisettico delle mani?	Prima e dopo procedure invasive come l'inserzione di un catetere venoso	Prima del contatto diretto con un paziente	Dopo aver effettuato un prelievo di sangue ad un paziente apparentemente sano	Prima di una qualsiasi procedura	INFERMIERISTICA GENERALE
138	Si definisce zoonosi una malattia che:	si trasmette dagli animali all'uomo	si trasmette per via aerea	è infettiva ed è trasmessa da uomo malato a uomo sano	si manifesta solo nell'uomo	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

139	La patologia definita cataratta dei vetrai è causata da:	radiazioni infrarosse emesse dal vetro incandescente	radiazioni X emesse dai metalli nel vetro	nessuna delle altre risposte è corretta	polvere di vetro in sospensione nell'aria	INFERMIERISTICA GENERALE
140	Qual è la definizione della malattia di Becker?	Distrofia muscolare progressiva	Mucopolisaccaridosi	Gangliosidosi	Calcolosi delle vie biliari	INFERMIERISTICA GENERALE
141	In quale delle seguenti condizioni si realizza la fonazione?	C'è coordinazione tra apparato respiratorio e fonatorio	Il flusso inspiratorio è diminuito	Nessuna delle altre risposte è corretta	Le corde vocali sono intatte	INFERMIERISTICA GENERALE
142	Si parla di malattia da ustione quando la parte ustionata supera il:	20% nell'adulto e 10-12% nel bambino	ogni volta che sia presente un'ustione indipendentemente dal grado	50% nel bambino e 60% nell'adulto	50% nell'adulto e 30% nel bambino	INFERMIERISTICA GENERALE
143	Cosa si intende per tossinfezione alimentare:	una serie di sintomi causati dall'ingestione di cibi contaminati da sostanze tossiche o da microrganismi patogeni	una serie di sintomi causati dall'ingestione di cibi scaduti	un'intolleranza verso il latte	un'infezione causata da spore contenute negli alimenti	INFERMIERISTICA GENERALE
144	La via di trasmissione preferenziale per l'infezione da HIV è:	la via sessuale	la via oro-fecale	tutte le altre risposte sono corrette	la via materno-fetale	INFERMIERISTICA GENERALE
145	In Italia, le principali cause di morte in ordine decrescente sono:	malattie cardiovascolari, tumori, malattie infettive	tumore al seno, malattie cardiovascolari, nefropatie	malattie cardiovascolari, tumore della cervice uterina, malattie infettive	malattie infettive, infezioni nosocomiali, tumori, malattie cardiovascolari	INFERMIERISTICA GENERALE
146	Le neoplasie sono causate anche dalle radiazioni ionizzanti perché:	inducono mutazioni in macromolecole informative (DNA, RNA, proteine)	provocano apoptosi cellulare	provocano lesioni della cute	indeboliscono l'immunità innata e acquisita	INFERMIERISTICA GENERALE
147	Le epilessie sono malattie contraddistinte da:	accessi parossistici ricorrenti	perdita di coscienza	ritardo mentale	lenta insorgenza di deficit neurologici irreversibili	INFERMIERISTICA GENERALE
148	La listeriosi è una malattia infettiva che generalmente si trasmette attraverso:	gli alimenti	i medicinali scaduti	i pidocchi	le mosche del genere Anopheles	INFERMIERISTICA GENERALE
149	Qual è la caratteristica della miopia?	Il bulbo oculare è più lungo del normale	La completa rigidità del cristallino	Il bulbo oculare è infiammato	Una curvatura non regolare della cornea	INFERMIERISTICA GENERALE
150	Il roditore è serbatoio naturale della:	peste	febbre gialla	difterite	brucellosi	INFERMIERISTICA GENERALE
151	Qual è una caratteristica delle verruche?	Sono più frequenti sul dorso delle mani	Hanno guarigione spontanea	Sono di origine autoimmune	Non sono contagiose	INFERMIERISTICA GENERALE
152	La reazione di rigetto del trapianto è causata da:	linfociti T del ricevente	globuli rossi del ricevente	linfociti B del donatore	linfociti T del donatore	INFERMIERISTICA GENERALE
153	Quale tra queste è una caratteristica della meningite cerebrospinale epidemica?	Si trasmette per contatto diretto	Si trasmette con l'acqua non potabile	Si rimane contagiosi per un lungo periodo	Si trasmette dai rifiuti organici	INFERMIERISTICA GENERALE
154	Quale fattore è responsabile della durata della contumacia?	Periodo di incubazione	Sintomi iniziali	Medico curante	Gravità della malattia	INFERMIERISTICA GENERALE
155	Quale tra i seguenti agenti eziologici è causa di miocardite acuta?	Coxsackie virus B	CMV	VZV	Staphylococcus pyogenes	INFERMIERISTICA GENERALE
156	L'esantema varicellare è:	polimorfo (macule/papule/vescicole/pustole)	esclusivamente vescicolare	solo papulare	maculo-papulare	INFERMIERISTICA GENERALE
157	I principali antigeni dei virus influenzali sono:	emoagglutinina e neuroaminidasi	emolisina e monoaminidasi	monoaminidasi e neuroaminidasi	emolisina e neuraminidasi	INFERMIERISTICA GENERALE
158	Un paziente si ricovera per febbre di origine sconosciuta. I test di laboratorio evidenziano IgM anti EBV, pertanto il paziente è affetto da:	mononucleosi infettiva	salmonellosi	micobatteriosi	febbre gialla	INFERMIERISTICA GENERALE
159	Cosa sono le brucelle?	Gram negative, acapsulate, asporigene	Gram positive, acapsulate, asporigene	Gram negative, capsulate, sporigene	Gram positive, capsulate, sporigene	INFERMIERISTICA GENERALE
160	L'eziologia più comune dell'aneurisma dell'aorta addominale è:	arteriosclerotico	lue	HCV	ereditaria	INFERMIERISTICA GENERALE
161	La pressione endoculare nel soggetto normale:	varia fra 10 e 20 mmHg	si abbassa con l'età	oscilla fra 5 e 35 mmHg	è direttamente correlata con la pressione arteriosa	INFERMIERISTICA GENERALE
162	Dove ritroviamo prevalentemente le verruche piane?	Volto	Tronco	Regione sacrale	Palmo delle mani	INFERMIERISTICA GENERALE
163	Quale tra le seguenti malattie deve essere presa in considerazione in un paziente con dermatite seborroica grave?	Infezione da HIV	Leucemia mieloide	Sepsi gonococcica	Sifilide primaria	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

164	Quale delle caratteristiche non è peculiare dell'herpes simplex di tipo 1?	Associazione con la dermatite erpetiforme di Duhring	E' recidivante	L'esposizione al sole può portare all'eruzione	Lesioni vescicolose	INFERMIERISTICA GENERALE
165	Il BCG viene utilizzato come vaccinazione:	antitubercolare	antifungina	antitetanica	anticarbonchiosa	INFERMIERISTICA GENERALE
166	La diagnosi di AIDS in un soggetto sieropositivo si fa in caso di:	comparsa di patologie opportunistiche classificate	HIV-RNA nel plasma non rilevabile	HIV-RNA nel liquor cefalo-rachidiano	insorgenza di influenza	INFERMIERISTICA GENERALE
167	Quale tra le seguenti non è una manifestazione clinica dell'AIDS?	Influenza A	Herpes-Zoster	Toxoplasmosi cerebrale	Retinite da Cytomegalovirus	INFERMIERISTICA GENERALE
168	Prima di eseguire un intervento chirurgico in zone dove ci sono peli o capelli cosa si deve fare?	Tricotomia	Disinfezione con Dechin	Lavaggio con soluzione fisiologica	Lavaggio con alcool	INFERMIERISTICA GENERALE
169	In quale distretto va eseguita la paracentesi?	Fossa iliaca sinistra	Fossa iliaca destra	Pancreas	Epigastrio	INFERMIERISTICA GENERALE
170	Il ferro somministrato per via orale può causare:	disturbi gastrointestinali	policitemia	aumento delle transaminasi	prurito	INFERMIERISTICA GENERALE
171	L'insulina sottocutanea va evitata in caso di:	aree cutanee ustionate	aree cutanee ricche di adipe	nessuna delle altre risposte è corretta	ciclo mestruale	INFERMIERISTICA GENERALE
172	La pressione arteriosa diastolica di un adulto è:	70-90 mmHg	40-60 mmHg	90-110 mmHg	80-190 mmHg	INFERMIERISTICA GENERALE
173	I battiti cardiaci/minuto in un adulto sono:	60-80	90-100	>90	30-50	INFERMIERISTICA GENERALE
174	Prima di una mastectomia non è necessario:	posizionare correttamente l'arto interessato	fornire al paziente informazioni sull'intervento	preparare la barella per il trasporto in sala operatoria	sostegno psicologico	INFERMIERISTICA GENERALE
175	Il termine neurolettico:	indica le capacità di certi farmaci di ridurre la tensione nervosa e neurovegetativa producendo rilassamento	indica le patologie per le quali certi farmaci sono risultati efficaci	raggruppa tutti i farmaci attivi sul sistema nervoso	indica un'azione di stimolazione del farmaco sul SNC	INFERMIERISTICA GENERALE
176	Una situazione di bisogno sanitario non percepito è esemplificata da:	malattia in fase clinicamente silente	servizi sanitari incapaci di soddisfare il bisogno sanitario	nessuna delle altre risposte è corretta	alterazione morbosa che si traduca in sintomi avvertibili	INFERMIERISTICA GENERALE
177	Un aumento assoluto dei reticolociti è espressione di:	aumentata produzione di eritrociti	aumentata sopravvivenza degli eritrociti	aumentata attività del sistema reticolo-endoteliale	distruzione di eritrociti	INFERMIERISTICA GENERALE
178	Nel quadro dello shock settico manca:	bradicardia	brivido che precede l'ipotensione	cute calda e asciutta	ipotensione	INFERMIERISTICA GENERALE
179	Nell'ipertiroidismo uno di questi sintomi è per lo più assente. Quale?	Ipersensibilità al freddo	Astenia	Tremori	Perdita di peso	INFERMIERISTICA GENERALE
180	Tutte le seguenti situazioni patologiche rappresentano fattori di rischio per tumori del colon retto, tranne una. Quale?	Morbo di Crohn	Dieta ad alto contenuto di grassi e proteine animali	Poliposi multipla gastrointestinale	Rettocolite ulcerosa	INFERMIERISTICA GENERALE
181	Quale delle seguenti patologie è nota anche come malattia di Kahler - Bozzolo?	Mieloma multiplo	Colecistite cronica	Granuloma dentario	Polmonite	INFERMIERISTICA GENERALE
182	Se a distanza di 24-48 ore da una frattura di femore compare confusione mentale, allucinazioni, vomito, bisogna pensare a:	embolia cerebrale	focolaio epilettico	ictus cerebrale	emorragia cerebrale	INFERMIERISTICA GENERALE
183	L'anemia ipocromica è determinata da:	riduzione del contenuto emoglobinico medio	riduzione della concentrazione emoglobinica corpuscolare media	tutte le altre risposte sono corrette	riduzione del volume corpuscolare medio	INFERMIERISTICA GENERALE
184	Quale di questi sintomi è sempre presente nell'ittero emolitico?	Bilirubinuria	Emoglobinemia diminuita	Reticolociti aumentati	Urobilinuria	INFERMIERISTICA GENERALE
185	Nell'atelettasia di un polmone il mediastino:	si sposta dallo stesso lato	si sposta in alto	rimane fisso	si sposta controlateralmente	INFERMIERISTICA GENERALE
186	Quale delle seguenti è la più precoce alterazione rilevabile in corso di infarto miocardico acuto?	Sopralivellamento ST	Aumento del CPK	Aumento di LDH	Aumento della glicemia	INFERMIERISTICA GENERALE
187	Il sintomo più evidente di una peritonite è:	contrattura a quadrante	rigidità diffusa dell'addome	shock ipovolemico relativo	dolore spontaneo che si aggrava con la palpazione dell'addome	INFERMIERISTICA GENERALE
188	Nelle malattie diarroiche è molto importante evitare l'assunzione di:	nutrienti ad elevata osmolarità	proteine	amido	liquidi	INFERMIERISTICA GENERALE
189	La disfagia determina:	difficoltà nella deglutizione	assunzione di quantità eccessive di liquidi	avversione per i cibi solidi	dolore post-prandiale	INFERMIERISTICA GENERALE
190	Il tappo di cerume è causa di:	ipoacusia di trasmissione	nessuna delle altre risposte è corretta	difficoltà nell'equilibrio	otalgia ed acufeni	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

191	Qual è la caratteristica principale della lesione ulcerativa nel piede diabetico neuropatico?	Bordo dell'ulcera ipercheratosico	Scarsa tendenza alla riparazione se scarificata	Fondo della lesione non granuleggiante	Tendenza alla guarigione spontanea	INFERMIERISTICA GENERALE
192	I criptosporidi sono responsabili di:	diarrea	polmoniti	febbre	faringiti	INFERMIERISTICA GENERALE
193	L'emorragia rettale in medicina è definita come:	proctorragia	nessuna delle altre risposte è corretta	papilloma	melena	INFERMIERISTICA GENERALE
194	Il benzene agisce a livello di:	midollo osseo	milza	vescica	fegato	INFERMIERISTICA GENERALE
195	I vaccini misti sono composti da:	germi di malattie differenti	farmaci antivirali	germi e anatossine	ceppi diversi di una stessa specie	INFERMIERISTICA GENERALE
196	Cosa provoca l'intossicazione da cromo?	Dermatite ulcerativa, faringotracheite, nefropatia tubulare	Glomerulonefrite e nefropatia vascolare	Calcolosi renale	Coliche addominali, ipertensione	INFERMIERISTICA GENERALE
197	Chi ha inventato la scala dello sviluppo cognitivo?	Binet-Simon	Nessuna delle altre risposte è corretta	Freud	Jung	INFERMIERISTICA GENERALE
198	L'azione degli anticorpi prodotti in seguito ad immunizzazione tetanica è quella di:	neutralizzare la tossina prodotta dall'agente patogeno	impedire l'invasione sistemica da parte dell'agente patogeno	opsonizzare il Clostridium tetani	aumentare l'azione delle cellule T	INFERMIERISTICA GENERALE
199	Che cosa comporta il tricobezoario?	Capelli nello stomaco	Carcinoma del colon	Granuloma nel polmone	Infestazione parassitaria intestinale	INFERMIERISTICA GENERALE
200	Cos'è la nocicezione?	La ricezione, trasmissione ed elaborazione centrale dello stimolo doloroso	La soglia minima del dolore	La manifestazione di stimoli odorosi	Un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole	INFERMIERISTICA GENERALE
201	Nella steatosi osserviamo un accumulo di:	lipidi	carboidrati	proteine	lipasi	INFERMIERISTICA GENERALE
202	La terapia della meningite meningococcica prevede l'utilizzo di:	beta lattamici	antidolorifici	immunoglobuline	chinoloni	INFERMIERISTICA GENERALE
203	Quale dei seguenti microrganismi non è causa di infezione opportunistica in pazienti immunodepressi?	Neisseria gonorrhoeae	Virus Varicella-zoster	Pneumocystis carinii	Aspergillus fumigatus	INFERMIERISTICA GENERALE
204	Quale di queste complicanze si osserva in corso di parotite epidemica?	Tutte le altre risposte sono corrette	Nessuna delle altre risposte è corretta	Orchite	Pancreatite	INFERMIERISTICA GENERALE
205	Nella sindrome da inappropriata secrezione dell'ormone antidiuretico (ADH) quale terapia è controindicata?	Idratazione	Restrizione idrica	Diuretici	Sali di litio	INFERMIERISTICA GENERALE
206	Cosa producono i fibroblasti?	Fibre elastiche e collagene	Tutte le altre risposte sono corrette	Fibre muscolari	Fibre reticolari	INFERMIERISTICA GENERALE
207	Il virus SV40, a quale gruppo di virus appartiene?	Papovavirus	Retrovirus	Coronavirus	Herpesvirus	INFERMIERISTICA GENERALE
208	Quali batteri possono essere isolati nel paziente mediante coprocultura?	Shigella sonnei	Neisseria gonorrhoeae	Corynebacterium diphtheriae	Stafilococco aureus	INFERMIERISTICA GENERALE
209	Quale dei seguenti distretti corporei non ha flora residente?	Vescica	Apparato digerente	Apparato respiratorio superiore	Apparato genitale femminile	INFERMIERISTICA GENERALE
210	Quale delle seguenti manifestazioni cliniche può essere causata dalla Candida albicans?	Vulvo-vaginite	Diarrea	Febbre puerperale	Tigna	INFERMIERISTICA GENERALE
211	Dove sono collocate le porine dei batteri gram negativi?	Membrana esterna	Capsula batterica	Membrana citoplasmatica	Periplasma	INFERMIERISTICA GENERALE
212	Come viene definito un drenaggio di Bulao?	Drenaggio toracico	Sonda rettale	Drenaggio addominale	Drenaggio a valvola ad acqua	INFERMIERISTICA GENERALE
213	Per prelievi di campioni muco-cutanei serve un tampone di:	cotone	poliestere	alginato di calcio	nylon	INFERMIERISTICA GENERALE
214	Come si misura la pressione in arteria polmonare?	Con il catetere di Swan-Ganz	Con il catetere di Foley	Con la sonda di Hegar	Con la sonda di Sengstaken-Blackmore	INFERMIERISTICA GENERALE
215	Per la venipuntura si utilizzano aghi butterfly per:	riduzione del rischio di perforazione venosa	nessuna delle altre risposte è corretta	minor costo	maggiore sterilità	INFERMIERISTICA GENERALE
216	Quanti atti ventilatori/minuto compie un adulto:	16-18	19-23	42281	41547	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

217	Una donna di 36 anni riferisce amenorrea negli ultimi quattro mesi. Il test di gravidanza è negativo. I livelli sierici di LH e FSH sono elevati e l'estradiolo sierico è basso. Qual è l'orientamento diagnostico?	Menopausa prematura	Somministrazione esogena di estrogeni	Panipopituitarismo	Ovaio policistico	INFERMIERISTICA GENERALE
218	Quale tra i seguenti non è un reperto anatomico-patologico specifico della tetralogia di Fallot?	Comunicazione interatriale	Ipertrafia ventricolare destra	Comunicazione interventricolare	Destroposizione dell'aorta	INFERMIERISTICA GENERALE
219	Nel trauma cranico con sindrome neurologica occorre praticare quale prima indagine:	tomografia computerizzata	angiografia	ecografia	scintigrafia	INFERMIERISTICA GENERALE
220	Quale tra queste non è causa di insufficienza renale acuta?	Pielonefriti	Presenza di versamenti abbondanti	Emorragie profuse	Gravi ustioni	INFERMIERISTICA GENERALE
221	In un paziente con angina pectoris quale dei seguenti elementi è più importante per poter prevedere la sua sopravvivenza?	Il grado di ostruzione delle coronarie	L'entità del lavoro muscolare capace di indurre l'angor	La frequenza degli episodi anginosi	La durata della sindrome anginosa	INFERMIERISTICA GENERALE
222	Accertata la diagnosi di rene cistico, su quale altro organo si dovrebbe indagare con scintigrafia o ecografia?	Fegato	Cervello	Polmone	Cuore	INFERMIERISTICA GENERALE
223	Il paziente affetto frequentemente da micosi cutanee dovrà evitare uno dei seguenti comportamenti. Quale?	Uso di saponi alcalini	Tutte le altre risposte sono corrette	Esposizione prolungata alla luce solare	Uso di saponi acidi	INFERMIERISTICA GENERALE
224	Quale fra le seguenti affermazioni sulla pancreatite cronica è falsa?	Costituisce fattore di rischio per le neoplasie del pancreas	La ipertrigliceridemia familiare rappresenta un fattore di rischio per la sua insorgenza	Si possono riscontrare calcificazioni all'esame Rx diretto dell'addome in regione pancreatica	I segni clinici di insufficienza di secrezione esocrina compaiono per distruzione di parenchima superiore al 90%	INFERMIERISTICA GENERALE
225	Qual è l'evenienza clinica che consegue più frequentemente ad un'embolia dell'arteria polmonare?	Infarto polmonare	Infarto cardiaco	Pneumotorace	Atelettasia polmonare	INFERMIERISTICA GENERALE
226	Qual è la più frequente causa di cuore polmonare acuto:	embolia polmonare	infarto miocardico anteriore	infarto miocardico posteriore	stato asmatico	INFERMIERISTICA GENERALE
227	La terapia farmacologica per lo shock anafilattico prevede l'uso di:	cortisonici e adrenalina	dopamina	diidralazina	valproato	INFERMIERISTICA GENERALE
228	Quale tra le seguenti situazioni non è provocata da stenosi mitralica?	Ipertrafia ventricolare sinistra	Fibrillazione atriale	Ipertrafia polmonare	Ipertrafia ventricolare destra	INFERMIERISTICA GENERALE
229	Qual è il sintomo che consente di fare diagnosi di paralisi progressiva sopranucleare e non di Parkinson?	Alterazione dei movimenti oculari	Tremore	Bradichinesia	Rigidità	INFERMIERISTICA GENERALE
230	Cos'è un T.I.A.?	Attacco ischemico transitorio	Turba ischemica acuta	Trombosi improvvisa acuta	Trombosi istantanea acuta	INFERMIERISTICA GENERALE
231	Il metadone è utilizzato in sostituzione di:	eroina	cannabinoidi	cocaina	etanolo	INFERMIERISTICA GENERALE
232	A quale categoria di farmaci appartengono le benzodiazepine?	Sedativi	Antiarritmici	Diuretici	Miocardiotonici	INFERMIERISTICA GENERALE
233	In quale forma fisica una sostanza è più rapidamente assorbibile a livello polmonare?	Gas	Nebulizzata	Solida	Liquida	INFERMIERISTICA GENERALE
234	Quale tra i seguenti farmaci non appartiene alla classe degli antidepressivi triciclici?	Fluoxetina	Imipramina	Amitriptilina	Doxepina	INFERMIERISTICA GENERALE
235	La mioclonia è:	una contrazione muscolare rapida seguita da rilassamento	una contrazione muscolare tonica	una forma di epilessia	una manifestazione neurodegenerativa	INFERMIERISTICA GENERALE
236	Su quale delle seguenti azioni si fonda l'aprassia ideativa?	Incapacità di eseguire nella giusta successione i movimenti che compongono un atto	Sostituire ai movimenti corretti di un gesto, gesti automatici o incompleti o amorfi	Mancato movimento voluto	Capacità di compiere un atto involontario	INFERMIERISTICA GENERALE
237	La trasmissione di quale microrganismo è facilitata dalla presenza di acque stagnanti in zona tropicale?	Schistosoma mansoni	Neisseria gonorrea	Taenia saginata	Mycobacterium tuberculosis	INFERMIERISTICA GENERALE
238	Quale malattia è stata ufficialmente eradicata a livello mondiale?	Il vaiolo	La lebbra	La tubercolosi	La brucellosi	INFERMIERISTICA GENERALE
239	Si definisce ritenzione urinaria:	la mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica	il bruciore durante la minzione	la produzione di urina < 400 ml/24 ore	la produzione di urina > 700 ml/24 ore	INFERMIERISTICA GENERALE
240	L'Amanita phalloides colpisce prevalentemente:	fegato	snc	pancreas	milza	INFERMIERISTICA GENERALE
241	Quando si considera contagioso il morbillo?	Da due giorni prima a quattro giorni dopo la comparsa dell'esantema	Durante tutta la fase esantematica	Durante la fase di incubazione	Tre giorni prima della comparsa dell'esantema	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

242	Gli agenti eziologici di meningite a liquor torbido comprendono:	S. pneumonite, N. meningitidis e H. influenzae	S. pneumoniae	N. meningitidis	M. tuberculosis	INFERMIERISTICA GENERALE
243	Gli adenovirus determinano:	tutte le altre risposte sono corrette	diarrea	sindrome pertussica	cistite emorragica	INFERMIERISTICA GENERALE
244	Quali miceti colpiscono i soggetti immunocompromessi?	Tutte le altre risposte sono corrette	Candida	Mucor	Aspergillus	INFERMIERISTICA GENERALE
245	Nella brucellosi:	l'emocultura è diagnostica nella prima settimana di malattia e la sierodiagnosi di Wright è diagnostica nella seconda settimana di malattia	l'emocultura è diagnostica nella prima settimana di malattia	la sierodiagnosi di Wright è diagnostica nella seconda settimana di malattia	la sierodiagnosi di Wright è diagnostica nella terza settimana di malattia	INFERMIERISTICA GENERALE
246	In Italia, quale delle vaccinazioni seguenti è obbligatoria?	Nessuna delle altre risposte è corretta	BCG	Vaiolo	Rabbia	INFERMIERISTICA GENERALE
247	Nella colorazione di gram risultano colorati di violetto:	i batteri gram positivi	i batteri gram negativi	i batteri sporigeni	i funghi	INFERMIERISTICA GENERALE
248	Quale dei seguenti cateteri viene maggiormente utilizzato per la vescica?	Foley	Broviac	Fleming	Hegar	INFERMIERISTICA GENERALE
249	Quant'è il volume polmonare corrente in un individuo sano, misurabile in centimetri cubici?	500 cm ³	110 cm ³	320 cm ³	430 cm ³	INFERMIERISTICA GENERALE
250	Dopo aver inserito un catetere di Foley, cosa bisogna fare per accertarsi dell'esatta posizione?	Tutte le altre risposte sono corrette	Iniettare soluzione fisiologica	Far defluire l'urina	Gonfiare il palloncino	INFERMIERISTICA GENERALE
251	Quale deve essere il ruolo svolto dall'infermiere in caso di puntura lombare?	Tutte le altre risposte sono corrette	Mantenere la testa del paziente anteroflessa	Mantenere le ginocchia del paziente vicino al torace	Far assumere al paziente un decubito laterale	INFERMIERISTICA GENERALE
252	Quale procedura si effettua prima di un intervento chirurgico all'intestino?	Tutte le altre risposte sono corrette	Somministrazione di antibiotici non assorbibili	Purganti per tre giorni prima dell'intervento	Clisteri per tre giorni prima dell'intervento	INFERMIERISTICA GENERALE
253	Quale può essere la causa di un trauma spinale?	Tutte le altre risposte sono corrette	Incidente stradale	Tuffo	Ferita da fuoco	INFERMIERISTICA GENERALE
254	In che momento deve essere fatto il prelievo ematico per emocoltura?	Nessuna delle altre risposte è corretta	Non appena compare uno stato febbrile	Dopo cinque giorni di terapia antibiotica	Appena si effettua il ricovero	INFERMIERISTICA GENERALE
255	Cosa bisogna fare, in caso di ferita con materiale infettato dal virus HIV?	Iniziare immediatamente profilassi con AZT	Iniziare immediatamente una cura antibiotica	Fare il test HIV entro 48 ore	Contattare entro 24 ore un infettivologo	INFERMIERISTICA GENERALE
256	Un pap-test falso negativo può essere dovuto a:	tutte le altre risposte sono corrette	prelievo non adeguato	fattori casuali	operatore non esperto	INFERMIERISTICA GENERALE
257	Quale dei seguenti è il sintomo più frequente dell'acidosi metabolica?	polipnea	nausea e vomito	astenia	cefalea	INFERMIERISTICA GENERALE
258	Quale tra queste non è una complicanza intestinale della malattia di Crohn?	Poliposi	Aderenze	Fistole	Fibrosi	INFERMIERISTICA GENERALE
259	Nella pancreatite acuta tutte le seguenti affermazioni sul dolore sono vere, tranne una. Quale?	Dolore non associato a nausea e vomito	Insorgenza improvvisa	Localizzazione diffusa all'epigastrio	Irradiazione al dorso	INFERMIERISTICA GENERALE
260	Cosa s'intende per insonnia?	Tutte le altre risposte sono corrette	Difficoltà ad iniziare e a mantenere il sonno	Difficoltà del sonno correlata a un disturbo fisico	Difficoltà del sonno correlata all'assunzione di sostanze psicoattive	INFERMIERISTICA GENERALE
261	In tutte le seguenti malattie si osserva eosinofilia, tranne in una. Quale?	Brucellosi	Linfoma di Hodgkin	Dermatiti allergiche	Edema di Quincke	INFERMIERISTICA GENERALE
262	La porpora si riscontra più frequentemente in caso di:	piastriopenia	vasculopatia	trombocitosi	coagulopatia congenita	INFERMIERISTICA GENERALE
263	La sintomatologia caratterizzata da dolore biliare, ittero e febbre settica si riscontra nella litiasi:	del coledoco	intraepatica	della colecisti	del dotto di Wirsung	INFERMIERISTICA GENERALE
264	Da quale delle seguenti condizioni è caratterizzato l'aumento della pressione arteriosa differenziale?	Insufficienza aortica	Iperensione nefrovascolare	Stenosi aortica	Stenosi polmonare	INFERMIERISTICA GENERALE
265	L'angina instabile per definizione è caratterizzata da:	esordio o peggioramento della sintomatologia anginosa	crisi esclusivamente a riposo	crisi associate ad aritmie	crisi con manifestazioni neurovegetative	INFERMIERISTICA GENERALE
266	In quale di queste condizioni la potassiemia risulta diminuita?	Diarrea cronica	Insufficienza renale acuta	Insufficienza surrenale cronica	Crisi emolitica acuta	INFERMIERISTICA GENERALE
267	Quale di queste sostanze oppioidi non crea un alto rischio di dipendenza?	Codeina	Eroina	Metadone	Morfina	INFERMIERISTICA GENERALE
268	La calcolosi del coledoco è caratterizzata da tutti i seguenti sintomi, tranne uno. Quale?	Ittero ingravescente	Dolore di tipo colico	Ittero intermittente	Febbre con brivido	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

269	La complicanza più frequente di una frattura esposta è:	ifezione	emorragia	formazione di ematoma	frammentazione dei monconi ossei	INFERMIERISTICA GENERALE
270	L'aumento del CEA è più caratteristico per i tumori di:	grosso intestino	cervello	polmone	prostata	INFERMIERISTICA GENERALE
271	Tutte le seguenti condizioni possono verificarsi in presenza di un aneurisma dissecante dell'aorta, tranne:	insufficienza mitralica acuta	anisofigmia a livello degli arti superiori	perdita di coscienza	insufficienza aortica	INFERMIERISTICA GENERALE
272	La leucemia mieloide cronica è:	una leucemia frequente che colpisce tutte le età	una leucemia poco frequente che colpisce l'età evolutiva	una leucemia poco frequente che colpisce i soggetti dopo i 50 anni	una leucemia poco frequente che colpisce tutte le età	INFERMIERISTICA GENERALE
273	La diagnosi di stenosi valvolare cardiaca si stabilisce con:	ecodoppler con determinazione del gradiente pressorio	angiocardiografia	emogasanalisi	cateterismo coronarico	INFERMIERISTICA GENERALE
274	Quale delle seguenti sostanze possiede una maggiore capacità oncogena?	Cloruro di vinile monomero	Solfuro di carbonio	Toluolo	Anilina	INFERMIERISTICA GENERALE
275	Sono cause di demenza non reversibile:	tutte le altre risposte sono corrette	le malattie degenerative	la malattia di Creutzfeldt-Jacob	le infezioni SNC	INFERMIERISTICA GENERALE
276	La valutazione del danno d'organo in un paziente in condizioni di ipertensione comprende:	tutte le altre risposte sono corrette	esame della retina	esame dei polsi periferici	ECG e Rx torace	INFERMIERISTICA GENERALE
277	Nell'anziano il rischio di cadute è dovuto essenzialmente a:	tutte le altre risposte sono corrette	alterazioni vestibolari	alterazioni visive	alterazioni della propriocezione	INFERMIERISTICA GENERALE
278	La valutazione della funzione piastrinica può essere effettuata attraverso:	tutte le altre risposte sono corrette	il tempo di sanguinamento	il dosaggio del fattore di von Willebrand	l'aggregometria piastrinica	INFERMIERISTICA GENERALE
279	In caso di avvelenamento l'emesi non può essere indotta se:	tutte le altre risposte sono corrette	il paziente è comatoso	il paziente è affetto da gravi malattie cardiovascolari	il paziente è sotto i sei mesi di vita	INFERMIERISTICA GENERALE
280	In un paziente in stato di decubito, la misurazione della PVC va eseguita ponendo lo stesso:	in posizione supina	in posizione laterale sx	semiortopnoico	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
281	Se si effettua una trasfusione di sangue incompatibile ad un paziente, questo manifesterà:	reazione emolitica	edema generalizzato	complicanze infettive	riduzione delle proteine plasmatiche	INFERMIERISTICA GENERALE
282	Cosa s'intende per piombemia?	Misurazione della presenza di piombo nel sangue totale	Misurazione della presenza di piombo nei globuli rossi	Misurazione della presenza di piombo nelle feci	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
283	Nella relazione con un paziente schizofrenico in generale non è opportuno:	tentare di dimostrare su basi razionali l'inesistenza del delirio	prestare attenzione ai sentimenti che stanno dietro al delirio	non pensare di dover sempre dire qualcosa e dare spazio all'ascolto attivo	essere autentici	INFERMIERISTICA GENERALE
284	Quale dei seguenti gas viene usato nell'anestesia generale inalatoria?	Protossido di azoto	Monossido di azoto	Ossido di azoto	Anidride carbonica	INFERMIERISTICA GENERALE
285	Come viene definito un polso con frequenza < 60 b/mp:	bradicardico	normale	nessuna delle altre risposte è corretta	aritmico	INFERMIERISTICA GENERALE
286	Quale tra le seguenti opzioni definisce correttamente gli effetti dell'analgia peridurale?	Allevia i dolori del parto	Diminuisce l'indice di Apgar dei neonati	Diminuisce il rischio di complicanze nel parto	Aumenta il tasso dei tagli cesarei	INFERMIERISTICA GENERALE
287	Per quale delle seguenti patologie viene usata la manovra di Giordano?	Renale	Polmonare	Epatica	Prostatica	INFERMIERISTICA GENERALE
288	Quale tra le seguenti opzioni definisce correttamente l'utilità del test di Amsler?	Le metamorfopsie	La trasformazione della pressione oculare	L'aumento della capacità visiva	La densità della cataratta	INFERMIERISTICA GENERALE
289	Primo livello di ipoacusia. L'esame indicato è:	Audiometria	Retinogramma	Nessuna delle altre risposte è corretta	Ecg	INFERMIERISTICA GENERALE
290	In caso di legionella, e per scongiurare la diffusione, l'acqua potabile deve essere mantenuta:	a temperatura di acqua fredda < 20°C e acqua calda > 60°C	a temperatura di acqua fredda < 25°C e acqua calda = 55°C	nessuna delle altre risposte è corretta	a temperatura di acqua fredda = 0°C e acqua calda > 35°C	INFERMIERISTICA GENERALE
291	Nei disturbi del linguaggio di tipo afasico, viene comunemente utilizzato il test di:	Token	Broca	Pinel	Binet	INFERMIERISTICA GENERALE
292	Test tubercolinico positivo. Si evince:	malattia da batteri gram positivi	malattia da batteri gram negativi	tutte le altre risposte sono corrette	infezione tubercolare	INFERMIERISTICA GENERALE
293	La febbre intermittente è quella febbre che:	scende sempre sotto i 37 °C	a volte scende sotto i 37 °C	si accompagna a una sudorazione profusa	non scende mai al di sotto dei 37 °C	INFERMIERISTICA GENERALE
294	La scala di valutazione OMS per il dolore muscolo-scheletrico consta di:	3 livelli	4 livelli	5 livelli	2 livelli	INFERMIERISTICA GENERALE
295	Quale tra le seguenti opzioni definisce correttamente le implicazioni del processo di fonazione?	E' predominante l'espiazione	E' predominante l'inspirazione	Possibilità di azione deglutitoria	Presenza di dinamica aerea espiratoria attiva	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

296	Quale tra le seguenti opzioni definisce correttamente lo scopo della posizione di Fowler?	Una migliore funzionalità ventilatoria	La rimozione di corpi estranei dall'esofago	L'esplorazione della prostata	L'esecuzione del clistere evacuativo	INFERMIERISTICA GENERALE
297	Alcune ore dopo un'ustione. La reidratazione viene effettuata attraverso:	soluzione di Ringer lattato	nessuna delle altre risposte è corretta	soluzione fisiologica	siero	INFERMIERISTICA GENERALE
298	Prelievo per emogasanalisi. Occorre preparare una siringa sterile da:	2 ml eparinata	nessuna delle altre risposte è corretta	5,5 ml non eparinata	insulina eparinata	INFERMIERISTICA GENERALE
299	Parlando di monitoraggio giornaliero, un paziente si definisce oligurico quando:	la diuresi oraria è inferiore a 0,5 ml/kg	la diuresi giornaliera è inferiore a 500 ml	la diuresi giornaliera è inferiore a 800 ml	la diuresi oraria è 1 ml/kg	INFERMIERISTICA GENERALE
300	In ambito infermieristico, l'acronimo ASO indica:	Accertamento Sanitario Obbligatorio	Azienda Senza Operatori	Assistenza Sanitaria Operatoria	Assistenza Socio - OSS	INFERMIERISTICA GENERALE
301	In ambito infermieristico, l'acronimo DSM indica:	Dipartimento Salute Mentale	Dispositivo Solo per Medici	Dispositivo Sanitario Medico	Dipartimento Solo Medico	INFERMIERISTICA GENERALE
302	In ambito infermieristico, l'acronimo BMI indica:	Body Mass Index	Bronco Mielite Interstiziale	Bronchite Mielite ad Intermittenza	Blood Mass Intrapheritoneal	INFERMIERISTICA GENERALE
303	In ambito infermieristico, l'acronimo BLS indica:	Basic Life Support	Blood Linear Support	Linea Base Sanitaria	Bronchite Lineare Superficiale	INFERMIERISTICA GENERALE
304	In ambito infermieristico, l'acronimo SDO indica:	Scheda di Dimissione Ospedaliera	Scheda di Diagnosi OSS	Servizio Domiciliare di Orientamento	Servizio di Diagnosi Ospedaliera	INFERMIERISTICA GENERALE
305	In ambito infermieristico, l'acronimo PA indica:	Pressione Arteriosa	Portata Atmosferica	Pressione Atmosferica	Portata Arteriosa	INFERMIERISTICA GENERALE
306	In ambito infermieristico, l'acronimo FC indica:	Frequenza Cardiaca	Fisiologia Cardiaca	Formazione Comune	Feci Compatte	INFERMIERISTICA GENERALE
307	In ambito infermieristico, l'acronimo CV indica:	Catetere Vescicale	Catetere Vetusto	Callo Valvolare	Catetere Veicolato	INFERMIERISTICA GENERALE
308	In ambito infermieristico, l'acronimo TC indica:	Temperatura Corporea	Temperatura Craniale	Temperatura Certa	Temperatura Corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
309	In ambito infermieristico, l'acronimo PS indica:	Pronto Soccorso	Primo Soccorso	Primo Salvamento	Pronto Salvamento	INFERMIERISTICA GENERALE
310	In ambito infermieristico, l'acronimo SAD indica:	Servizio Assistenza Domiciliare	Servizio Assistenza Disabili	Servizio Assistenza Demenze	Servizio Accoglienza Demenze	INFERMIERISTICA GENERALE
311	In ambito infermieristico, con l'acronimo FR si indica:	Frequenza Respiratoria	Frequenza Ritmica	Frequenza Relativa	Familiarità Relazionale	INFERMIERISTICA GENERALE
312	In ambito infermieristico, la somministrazione SC avviene:	sottocute	solo cerotto	supercerotto	sopracute	INFERMIERISTICA GENERALE
313	In ambito infermieristico, l'acronimo DPI indica:	Dispositivi di Protezione Individuale	Dispositivi Protezione Infetti	Dispositivi Protezione Inalterati	Dispositivi Protezione Inefficaci	INFERMIERISTICA GENERALE
314	In ambito infermieristico, l'acronimo NE indica:	Nutrizione Enterale	Età Neonatale	Non Estensibile	Non Eccessivo	INFERMIERISTICA GENERALE
315	In ambito infermieristico, l'acronimo ECG indica:	Elettrocardiogramma	Elettroencefalogramma	Elettrocoagulazione	Elettromiografia	INFERMIERISTICA GENERALE
316	In ambito infermieristico, l'acronimo BPCO indica:	Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva	Bronchite Cronica Ostruttiva	Bronchite Persistente Cronica Ostruttiva	Broncopolmonite Cronica Ostruttiva	INFERMIERISTICA GENERALE
317	In ambito infermieristico, l'acronimo RSD indica:	Residenza Sanitaria Disabili	Residenza Sociale Demenze	Residenza Sanitaria Demenze	Residenza Sociale Disabili	INFERMIERISTICA GENERALE
318	In ambito infermieristico, l'acronimo IMA indica:	Infarto Miocardico Acuto	Infarto Muscolare Acuto	Infarto Malato Anziano	Infarto Medio Acuto	INFERMIERISTICA GENERALE
319	In ambito infermieristico, l'acronimo RCP indica:	Rianimazione Cardiopolmonare	Respirazione Cardiopolmonare	Reazione Cardiopolmonare	Riflesso Cardiopolmonare	INFERMIERISTICA GENERALE
320	In ambito infermieristico, l'acronimo SSR indica:	Servizio sanitario regionale	Servizio sociale regionale	Servizio sanitario riservato	Servizio sociosanitario regionale	INFERMIERISTICA GENERALE
321	In ambito infermieristico, l'acronimo IM indica:	Intramuscolo	Indicazione medica	In media	In medicina	INFERMIERISTICA GENERALE
322	In ambito infermieristico, l'acronimo ICA indica:	Infezioni correlate all'assistenza	Istituti contro gli abusi	Infezioni contratte all'aperto	Infezioni contratte in ambulanza	INFERMIERISTICA GENERALE
323	In ambito infermieristico, l'acronimo ARDS indica:	Sindrome da distress respiratorio acuto	Sindrome da distress respiratorio nell'adulto	Sindrome da russamento acuto	Sensazione di disagio respiratorio all'aperto	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

324	In ambito infermieristico, l'acronimo MMG indica:	Medico di medicina generale	Medico di medicina geriatrica	Menomazione mentale generalizzata	Gestione malattia miocardica	INFERMIERISTICA GENERALE
325	In ambito infermieristico, l'acronimo EMG indica:	Elettromiografia	Elettromiocardigrafia	Elettrografia mensile	Elettromediografia	INFERMIERISTICA GENERALE
326	In ambito infermieristico, l'acronimo PEG indica:	Gastrostomia endoscopica percutanea	Progetto esterno di gestione	Portata enterale giornaliera	Pressione endogastrica	INFERMIERISTICA GENERALE
327	In ambito infermieristico, l'acronimo NPT indica:	Nutrizione parenterale totale	Necessario pasto tritato	Nutrizione pre trattamento	Nursing post traumatico	INFERMIERISTICA GENERALE
328	In ambito infermieristico, l'acronimo FANS indica:	Farmaci anti-infiammatori non steroidei	Farmaci anti-dolorifici non steroidei	Farmaci ancora non sospesi	Farmaci anti nausea sensibili	INFERMIERISTICA GENERALE
329	In ambito infermieristico, l'acronimo ADI indica:	Assistenza domiciliare integrata	Assistente domestica italiana	Assistenza domiciliare interattiva	Assistenza domiciliare intensiva	INFERMIERISTICA GENERALE
330	In ambito infermieristico, l'acronimo SNG indica:	Sondino naso gastrico	Sondino nasale gommato	Sondino nasale gonfiato	Sondino non gonfiato	INFERMIERISTICA GENERALE
331	In ambito infermieristico, l'acronimo RSA indica:	Residenza sanitaria assistenziale	Residenza sanitaria assistita	Residenza socio assistita	Residenza socio assistenziale	INFERMIERISTICA GENERALE
332	In ambito infermieristico, l'acronimo MRGE indica:	Malattia da reflusso gastro esofageo	Malattia da rigurgito gestazionale	Malattia da reflusso gastro enterico	Medicazione ricorrente con gentamicina	INFERMIERISTICA GENERALE
333	In ambito infermieristico, l'acronimo EEG indica:	Elettroencefalogramma	Ematoma esteso grave	Elettrocardiogramma esterno	Emorragia gastro/enterica	INFERMIERISTICA GENERALE
334	In ambito infermieristico, l'acronimo ADP indica:	Assistenza domiciliare programmata	Adenosintrifosfato	Assistenza domiciliare perpetua	Alterata deambulazione parziale	INFERMIERISTICA GENERALE
335	Durante la compilazione della cartella clinica, un infermiere risponde di falso ideologico quando:	attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute	si rifiuta di compilare la cartella clinica per motivi ideologici	fa compilare la cartella ad un altro operatore	esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati	INFERMIERISTICA GENERALE
336	In quale caso può essere indicata la cardioversione elettrica sincronizzata?	Flutter atriale	Tachicardia ventricolare senza polso	Dissociazione elettromeccanica	Fibrillazione elettrica	INFERMIERISTICA GENERALE
337	Da cos'è contraddistinta l'afasia espressiva?	Linguaggio limitato, articolazione rallentata e grammatica ridotta	Incapacità totale sia nel linguaggio verbale sia in quello scritto	Disturbo del linguaggio risultante da debolezza del controllo motorio, paralisi e scoordinazione	Linguaggio fluente, ben articolato e contenuti disorganizzati	INFERMIERISTICA GENERALE
338	Completare la seguente frase: "_____ non avviene l'assorbimento delle sostanze alimentari".	Nel colon	Nel duodeno	Nell'ileo	Nel digiuno	INFERMIERISTICA GENERALE
339	Con quale formula si calcola la sensibilità di un test diagnostico?	Veri positivi/totali malati	Veri positivi/totale sani	Veri negativi/totali sani	Falsi negativi/totali sani	INFERMIERISTICA GENERALE
340	Cosa prevede il trattamento della pancreatite acuta?	Il continuo svuotamento del contenuto gastrico	Interventi specifici per arrestare la flogosi e la necrosi pancreatiche	Il frazionamento dei pasti limitando il contenuto glucidico	Tutte le altre risposte sono corrette	INFERMIERISTICA GENERALE
341	La sperimentazione clinica controllata in doppio cieco si ha quando:	né il paziente né lo sperimentatore sono a conoscenza del tipo di trattamento effettuato	i gruppi di controllo sono due	né il paziente né lo statistico che elabora i dati sono a conoscenza del tipo di trattamento effettuato	né il paziente né i suoi parenti sono a conoscenza del tipo di trattamento effettuato	INFERMIERISTICA GENERALE
342	Completare la seguente frase: "Il maggior effetto di un'insulina ad azione intermedia somministrata per via sottocutanea si ottiene dopo _____ ore".	6-8	10-16	12-20	2-3	INFERMIERISTICA GENERALE
343	Quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta una complicanza precoce della tracheotomia?	L'enfisema sottocutaneo	La fistola tracheo-esofagea	L'infezione respiratoria	La stenosi tracheale	INFERMIERISTICA GENERALE
344	In ambito infermieristico, nei casi di pazienti con chetoacidosi diabetica, riveste importanza critica la reintegrazione del:	Potassio	Magnesio	Calcio	Bicarbonato	INFERMIERISTICA GENERALE
345	Completare la seguente frase: "_____ sono analgesici non oppioidi".	Acido acetilsalicilico, Ketoprofene, Naprossene	Acido acetilsalicilico, Ketoprofene, Fentanyl	Acido acetilsalicilico, Meperidina, Ketoprofene	Ibuprofene, Naprossene, Oxidone	INFERMIERISTICA GENERALE
346	La legge n. 120/2001 e s.m.i., che norma l'uso dei defibrillatori semiautomatici al personale non sanitario, consente l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera:	a tutti i cittadini non medici che abbiano ricevuto una formazione specifica nell'attività di rianimazione cardiopolmonare	a tutti i soccorritori	a tutti i soccorritori purché sia fatta a bordo delle ambulanze	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
347	Cosa si intende per "port-a-cath"?	Un accesso venoso centrale che può rimanere in sede per un più lungo periodo, pertanto è principalmente utilizzato nei pazienti oncologici	Un catetere arterioso impiantato per somministrazione di grandi quantità di farmaci	Un dispositivo di regolazione del ritmo cardiaco totalmente impiantabile	Un tipo di ago cannula utilizzato per somministrazione di antitumorali e radiofarmaci	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

348	Nell'ambito delle professioni sanitarie, essendo in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo, l'infermiere è l'operatore sanitario che è responsabile di:	assistenza generale infermieristica	elaborazione dati e ricerca in ambito sanitario	guida e supporto al profilo riabilitativo dell'utente	ricerche relative ad analisi biomediche e biotecnologiche	INFERMIERISTICA GENERALE
349	Che cosa comporta il principio etico di autonomia, in ambito sanitario?	Il diritto dell'assistito a ricevere informazioni adeguate e accurate per essere in grado di operare una scelta libera da imposizioni esterne	Il diritto a scegliere come e dove curarsi, potendo scegliere fra Servizio sanitario pubblico e Sanità privata	Il diritto ad ottenere tutti i presidi che consentono di muoversi autonomamente, in forma gratuita	Il diritto di esprimere il proprio consenso all'atto sanitario	INFERMIERISTICA GENERALE
350	Che cosa s'intende per "modello organizzativo"?	L'insieme di regole che controllano il funzionamento dell'organizzazione in relazione alla sua mission	Un prototipo di comportamento professionale	L'applicazione di un sistema di norme giuridiche e deontologiche	L'applicazione concreta della mission aziendale	INFERMIERISTICA GENERALE
351	Completare la seguente frase: "Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non provocare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di _____ giorni".	cinque	sette	due	tre	INFERMIERISTICA GENERALE
352	Quale tra le seguenti opzioni di risposta indica una competenza che non è propria dell'organizzazione infermieristica?	Stabilire la programmazione degli accessi alle strutture sanitarie	Gestire i processi, definire linee guida, protocolli, procedure assistenziali	Definire gli indicatori di fabbisogno delle risorse assistenziali	Definire standard e indicatori assistenziali professionali adeguati ai fabbisogni	INFERMIERISTICA GENERALE
353	A cosa fa riferimento il termine "carica microbica":	al quantitativo di microrganismi necessario a provocare l'infezione	alla capacità di abbattere le barriere meccaniche che difendono dall'infezione	alla capacità complessiva di penetrazione di un batterio attraverso gli orifizi naturali	alla capacità di un microrganismo di stabilirsi sulle mani e sugli strumenti sanitari, consentendo il trasferimento all'ospite suscettibile	INFERMIERISTICA GENERALE
354	Che cosa s'intende col termine "granulociti"?	Cellule della serie bianca con inclusioni citoplasmatiche	Organuli citoplasmatici dotati di peduncoli	Minuscoli granuli di tessuto specifico tubercolare	Cellule tumorali dovute a proliferazione di origine flogistica	INFERMIERISTICA GENERALE
355	[Per la risoluzione del quesito, indicare quale opzione di risposta contiene la giusta sequenza di "Vero" (V) / Falso (F)] Secondo le linee guida del CDC, per le somministrazioni sottocute la disinfezione preliminare della cute deve soddisfare i seguenti requisiti: * Cute pulita * Uso di antisettico * Uso di soluzioni a base alcolica * Strofinamento della cute per 30 secondi.	V; V; F; F	V; V; F; V	V; F; V; F	F; V; F; F	INFERMIERISTICA GENERALE
356	In ambito clinico, che cos'è la "compromissione della mobilità"?	Una diagnosi infermieristica	Una diagnosi riabilitativa	Una complicanza clinica	Un problema collaborativo	INFERMIERISTICA GENERALE
357	Con riferimento al processo di assistenza infermieristica, la valutazione NON è:	la fase in cui vengono decisi gli interventi	l'ultima fase del processo	la fase che precede una nuova raccolta dei dati	il momento della verifica degli obiettivi prefissati	INFERMIERISTICA GENERALE
358	Le misure di isolamento in ospedale, al momento, prevedono l'uso di quali precauzioni?	L'uso di precauzioni standard e aggiuntive	L'uso di precauzioni standard e per liquidi biologici	L'uso di precauzioni universali	L'uso di precauzioni per liquidi biologici	INFERMIERISTICA GENERALE
359	Per quanto riguarda la prevenzione terziaria, il suo scopo è:	la riabilitazione	la bonifica ambientale	la diagnosi precoce	la prevenzione della malattia	INFERMIERISTICA GENERALE
360	Che cosa rappresenta la cute non integra, nella "catena delle infezioni"?	La porta d'ingresso	La modalità di trasmissione	Il vettore infettivo	L'agente infettivo	INFERMIERISTICA GENERALE
361	Quante compresse da 0,25 mg deve somministrare un infermiere per ottenere 0,125 mg di dosaggio?	Mezza compressa	Una compressa più mezza	Due compresse	Secondo indicazione medica	INFERMIERISTICA GENERALE
362	Che cos'è fondamentale in un neonato con basso peso?	Un continuo riscaldamento per mantenere l'isotermia	Un'infusione endovenosa continua per evitare la disidratazione	Un continuo raffreddamento per rallentare il metabolismo	Un'alimentazione latte per evitare l'ipoglicemia	INFERMIERISTICA GENERALE
363	La "Conta Microbica Totale" è un rilievo fondamentale, in sala operatoria, poiché indica:	il numero delle unità formanti colonia che si sviluppano sulla piastra di Petri dopo 48 ore a 36° C	il numero di germi che si sviluppano sulla piastra di Petri dopo 24 ore a 36° C	il numero di germi che si sviluppano sulla piastra di Petri dopo 48 ore a 36° C	il numero delle Unità Formanti Colonie che si sviluppano sulla piastra di Petri dopo 96 ore a 36° C	INFERMIERISTICA GENERALE
364	Completare la seguente frase: "Nel caso in cui si utilizzi un deflussore che eroga 10 gocce per 1 millilitro, per regolare la velocità di infusione allo scopo di somministrare un litro di soluzione in circa otto ore, occorre regolare il deflussore in modo che si somministrino _____ al minuto".	20 gocce	30 gocce	40 gocce	10 gocce	INFERMIERISTICA GENERALE
365	Dividere mentalmente il gluteo in quattro quadranti: se l'infermiere pratica un'iniezione intramuscolare nel quadrante superiore esterno, quale sede è stata scelta?	Dorsogluteare	Rettofemorale	Deltoide	Ventrogluteare	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

366	In relazione alle forze meccaniche che influiscono in maniera negativa sulla funzione tegumentaria, la pressione può avere come effetto:	la distruzione di un'area tissutale più o meno circoscritta	lo scorrimento degli strati tissutali l'uno sull'altro	le verruche	le macerazioni	INFERMIERISTICA GENERALE
367	Somministrando 500 cc di glucosata al 5% si garantisce:	l'apporto di Kcal 100	l'apporto di Kcal 500	l'apporto di Kcal 300	l'apporto di Kcal 200	INFERMIERISTICA GENERALE
368	Secondo quanto appreso dalla letteratura in materia, le sedi consigliate per le iniezioni intramuscolari sono:	cinque	dieci	due	tre	INFERMIERISTICA GENERALE
369	Nel caso in cui un paziente iperteso in reparto ha epitassi, l'infermiera deve preoccuparsi di garantirgli una posizione:	con capo chino in avanti, posizionando sotto il mento una arcilla per valutare l'entità della perdita ematica	di Trendelenburg	con capoflesso all'indietro, tamponando con garze il naso	con capo flesso all'indietro, tamponando con garze il naso e posizionando sulla fronte una garza bagnata fredda	INFERMIERISTICA GENERALE
370	Quando deve avvenire l'applicazione delle calze elastiche, ad una persona con insufficienza circolatoria venosa degli arti inferiori?	Prima di alzarsi dal letto al mattino	Dopo aver camminato	Dopo aver effettuato l'igiene personale	Tutte le volte che sente le gambe appesantite	INFERMIERISTICA GENERALE
371	Completare la frase con l'opzione corretta: "Un infermiere sta rianimando un paziente e si sta preparando a somministrargli un farmaco che deve agire rapidamente. Il metodo _____ assicura l'effetto più rapido".	endovenoso in bolo	endovenoso a volume controllato	intramuscolare	sottocutaneo	INFERMIERISTICA GENERALE
372	Si riporta il caso di un infermiere che assiste un paziente che ha bisogno di ricevere aiuto durante i pasti. Il paziente si scusa con l'infermiere, dicendogli di sentirsi di peso, poiché non riesce neppure a mangiare da solo. La strategia più appropriata che potrebbe usare l'infermiere è di:	mostrarsi non frettoloso, sedersi accanto al letto e incoraggiare il paziente a mangiare il più possibile	offrire al paziente prima tutti i cibi solidi e poi i liquidi	ridurre al minimo la conversazione, in modo che il paziente possa mangiare più rapidamente	alimentare il paziente, in modo che egli non ritenga di sottrarre troppo tempo	INFERMIERISTICA GENERALE
373	Si riporta il caso di un infermiere che sta preparando un farmaco per la somministrazione intramuscolare contenuto in un flaconcino. Quale dei seguenti è un passaggio errato?	Aspirare il farmaco e abbandonare la siringa preparata sul carrello per rispondere a un campanello	Controllare la prescrizione medica	Detergere il tappo del flaconcino con un tampone antisettico	Identificare il paziente	INFERMIERISTICA GENERALE
374	In riferimento alla documentazione del processo di svuotamento della vescica sono accettabili tutti i termini tranne:	evacuazione	urinare	minzione	svuotamento	INFERMIERISTICA GENERALE
375	Completare la frase con l'opzione corretta: "_____ rappresenta un fattore di rischio di malnutrizione".	La compromissione della deglutizione	La compromissione della mobilità	La stipsi	L'inconsistenza fecale	INFERMIERISTICA GENERALE
376	Il lavaggio delle mani, secondo quanto stabilito dalle raccomandazioni internazionali, si esegue:	prima e dopo il contatto con il paziente, prima di una manovra asettica, dopo l'esposizione a liquidi biologici e dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente	dopo l'esposizione a liquidi biologici, prima e dopo il contatto con pazienti infetti	quando le mani sono visibilmente sporche o potenzialmente infette	quando non si indossano i guanti	INFERMIERISTICA GENERALE
377	Completare la frase con l'opzione corretta: "_____ sono considerati fattori predittivi del rischio caduta".	I problemi cognitivi, problemi nella deambulazione, contenzione, dolore	Il non corretto utilizzo ausili deambulazione, dolore, nicturia, presenza cannula venosa	L'abuso alcolico, contenzioso, calzature inadeguate, stipsi	L'incontinenza urinaria, disfagia, terapia farmacologica, deficit della vista	INFERMIERISTICA GENERALE
378	Quale alternativa di risposta contiene un'affermazione corretta riguardo il governo clinico e la gestione del rischio?	La gestione del rischio clinico è un elemento del governo clinico	Il governo clinico è una conseguenza delle attività di gestione del rischio clinico	Il governo clinico viene attuato dalle Direzioni Sanitarie, il rischio clinico viene gestito da tutti i Servizi	Il governo clinico e la gestione del rischio sono sinonimi	INFERMIERISTICA GENERALE
379	Considerare il caso in cui un paziente riferisce la presenza di dolore di intensità 6 con riferimento alla scala numerica 0-10. Viene prescritto dal medico un farmaco analgesico e qualche minuto dopo l'infermiere si appresta a somministrarlo. Nella stanza di degenza il paziente parla con i propri familiari e apparentemente non manifesta alcun sintomo legato al dolore. Quale affermazione è corretta, in riferimento al caso esposto?	Somministra il farmaco ugualmente anche se la distrazione ha avuto un ruolo importante sulla percezione del dolore	Non somministra il farmaco perché non essendoci alcun segno esteriore sicuramente il dolore è assente	Conserva il farmaco per quando il paziente riferirà un livello di dolore più intenso	Somministra il farmaco dopo aver verificato nuovamente l'intensità del dolore con i familiari	INFERMIERISTICA GENERALE
380	Cosa si esegue, per esprimere la prevalenza delle Lesioni da Decubito (LdD)?	Numero di pazienti con LdD/totale pazienti presenti x 100	Numero di pazienti con LdD acquisita in ospedale/totale pazienti presenti	Numero totale di LdD/ totale giornate di degenza x 100	Numero di pazienti con LdD/totale pazienti presenti	INFERMIERISTICA GENERALE
381	Si espone il caso di un paziente collaborante di 24 anni, con diabete di tipo I di nuovo riscontro. Tra gli altri obiettivi, vi è quello di educarlo alla corretta auto somministrazione dell'insulina, per via sottocutanea. Nella fase di valutazione dell'apprendimento, la tecnica più efficace è:	data dalle dimostrazioni ripetute della tecnica da parte del paziente	il questionario scritto per avere traccia dell'apprendimento	la check list da utilizzare durante una proiezione della procedura corretta	la simulazione di una situazione tipo da parte dell'infermiere	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

382	Il concetto di assistenza infermieristica definito dall'American Nursing Association (ANA) è:	la diagnosi e il trattamento delle risposte umane dei pazienti alla malattia	il trattamento delle diagnosi infermieristiche e dei problemi collaborativi	la risposta umana del paziente ai problemi dell'esistenza	la diagnosi e il trattamento delle malattie e delle reazioni psicologiche	INFERMIERISTICA GENERALE
383	Cosa descrive la seguente affermazione: " _____ consiste nell'aiutare il paziente e la sua famiglia a comprendere la malattia ed il trattamento, a collaborare alle cure, a farsi carico del proprio stato di salute ed a conservare e migliorare la propria qualità di vita".	La definizione che l'OMS dà all'educazione terapeutica	La definizione di assistenza infermieristica secondo la teorica H. Peplau	La definizione che l'OMS dà all'assistenza territoriale	La definizione che il Consiglio europeo dà all'assistenza psichica	INFERMIERISTICA GENERALE
384	Completare la frase con l'opzione corretta: "L'infermiere sta accogliendo in pronto soccorso una paziente di 66 anni, con scompenso cardiaco congestizio. Oltre ad altri sintomi, presenta ipokaliemia $k^+=2,9$. Potrebbe aver contribuito a determinare l'ipokaliemia il farmaco _____ assunto a domicilio dalla paziente".	Furosemide 50 mg / 2 cp die	Digossina 0.125 mg / 1 cp die	Pantoprazolo 20 mg / cp die	Clopidogrel 75 mg / 1 cp die	INFERMIERISTICA GENERALE
385	Che cosa richiede la randomizzazione, negli studi sperimentali?	L'assegnazione dei pazienti al gruppo degli esposti o al gruppo di controllo in modo occasionale, attraverso tavole	L'individuazione di un follow up che controlla gli effetti del trattamento (ad esempio uso del materasso ad acqua) a distanza di tempo	La precisa identificazione di criteri di inclusione e di esclusione del campione applicati a random sul campione selezionato	L'esecuzione dello studio in cieco: i pazienti non possono essere informati sull'intervento	INFERMIERISTICA GENERALE
386	Quale tra le seguenti azioni indica un comportamento errato durante un trattamento emotrasfusionale?	In caso di reazione trasfusionale cercare e avvertire immediatamente il medico e sospendere la trasfusione togliendo la sacca e l'ago cannula	Verificare che cognome e nome del paziente riportati sulla unità di emocomponente corrispondano all'identità del paziente da trasfondere, come da cartella clinica, consenso informato e richiesta	Verificare che il gruppo sanguigno del ricevente, come riportato nella documentazione rilasciata dalla struttura trasfusionale, sia compatibile con il gruppo sanguigno indicato sull'etichetta dell'emocomponente da trasfondere	Per i primi 15 minuti infondere il sangue lentamente e monitorare costantemente i parametri vitali, di seguito continuare il monitoraggio ogni 20 minuti	INFERMIERISTICA GENERALE
387	Quale tra quelli proposti NON sono sintomi caratteristici dell'ipoglicemia?	Ipertermia e diarrea	Polso frequente, vista sfocata o sdoppiata, debolezza	Sudorazione, fame, tremore	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
388	In riferimento al processo di trasferimento delle consegne, quale opzione di risposta contiene il gruppo di raccomandazioni da trasferire che risulta più esaustivo nel garantire la sicurezza del paziente?	Frequenza monitoraggio, cardiovascolare, presenza infezioni, livello di rischio lesioni, livello di rischio caduta, rischio malnutrizione	Alterazioni della comunicazione, presidi utilizzati, diagnosi medica, risultati esami di laboratorio, prenotazione esami diagnostici	Presenza infezioni, diagnosi medica, frequenza monitoraggio cardiovascolare, livello di rischio caduta, risultati esami di laboratorio	Diagnosi medica, frequenza monitoraggio cardiovascolare, presenza infezioni, livello di rischio lesioni, livello di rischio caduta	INFERMIERISTICA GENERALE
389	Si espone il caso in cui, in casa di riposo, viene riammesso un ospite che ha subito un intervento ortopedico a seguito di una caduta accidentale. La lettera di trasferimento prevede un regime terapeutico analgesico che è confermato dal medico della struttura. Nel garantire la corretta esecuzione del trattamento, quale opzione di risposta è errata?	E' importante somministrare la minor quantità di farmaco possibile al fine di conservarne per quando il dolore sarà maggiore	E' meglio somministrare il farmaco analgesico ad intervalli regolari, prestabiliti da una scheda piuttosto che al bisogno	I trattamenti non farmacologici (massaggi, caldo/freddo, rilassamento) possono ridurre efficacemente il dolore per brevi periodi di tempo	E' importante rilevare il dolore del paziente ad intervalli prestabiliti usando strumenti per l'oggettivazione dello stesso (scala numerica, scala visiva, ...)	INFERMIERISTICA GENERALE
390	Nel caso in cui un infermiere sia in dubbio se il prelievo capillare per stick glicemico possa essere affidato all'operatore socio sanitario, quale fonte può trovare di utile riferimento per un chiarimento?	Conferenza Stato-Regioni, seduta del 22 febbraio 2001	DPR n. 225/1974 Titolo V	DPR n. 1310/1940 e legge n. 42/1999, art. 6	DM n. 739/1994	INFERMIERISTICA GENERALE
391	Se sfogliando il manuale della qualità del reparto si legge la frase "Riconoscimento pubblico del possesso dei requisiti previsti dagli standard nazionali/regionali per i potenziali erogatori di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale/regionale" si tratta di:	accreditamento istituzionale	certificazione ISO 9000	accreditamento volontario	accreditamento JACHO	INFERMIERISTICA GENERALE
392	"professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'art. 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270": Questa affermazione corrisponde:	a un estratto della legge n. 43/2006	a un estratto della legge n. 42/1999	a due commi del d.m. n. 739/1994	a un estratto del Codice deontologico	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

393	"Sono infermiere della stroke unit e lavoro in questo modo: accolgo i bisogni dei pazienti affidati. Alle 7.00 inizio le terapie, mentre l'OSS distribuisce la colazione ai 10 pazienti. Poi l'OSS assieme ad un collega effettuano l'igiene dei pazienti mentre io procedo con il giro visita del medico": in base a questa affermazione, quale modello organizzativo adotta l'infermiere nella sua pratica?	Per funzioni	Per case management	Per team leader	Per primary nurse	INFERMIERISTICA GENERALE
394	Completare la frase con l'opzione corretta: "Tra le seguenti condizioni il _____ espone maggiormente un paziente allo sviluppo di Lesioni da Decubito".	BMI 15, disidratazione, incontinenza, immobilità	BMI 25, immobilità, incontinenza	BMI 26, anemia, immobilità, incontinenza	BMI 22, immobilità, stipsi	INFERMIERISTICA GENERALE
395	Completare la frase con l'opzione corretta: "_____ non appartiene alla categoria delle soluzioni di elettroliti concentrati".	Il cloruro di sodio (NaCl) 0,9%	Il cloruro di potassio (KCl) 2 mEq/ml	Il fosfato di potassio (K ₃ PO ₄) 1 mEq/ml	Il fosfato di potassio (K ₃ PO ₄) 2 mEq/ml	INFERMIERISTICA GENERALE
396	La guarigione per seconda intenzione delle ferite:	È il processo di guarigione in cui comincerà dal fondo della ferita con un tessuto di granulazione che procederà risalendo verso l'alto fino a raggiungere lentamente la superficie	È un processo tipico delle ferite chirurgiche, molto lento e suscettibile di infezioni	È una caratteristica che può interessare le ferite lacero contuse e raramente si complica in processi infettivi	Interessa prevalentemente le ferite da ustione ed esita in una cicatrice minima	INFERMIERISTICA GENERALE
397	In una persona non cosciente se le vie aeree sembrano ostruite dopo il primo tentativo di ventilazione, il soccorritore deve:	Riposizionare il capo e provare a ventilare	Iniziare le compressioni toraciche	Posizionare il paziente in posizione laterale	Proseguire nella sequenza con la ventilazione	INFERMIERISTICA GENERALE
398	Quando si pianifica una sessione di educazione ad un paziente vi sono diversi fattori da prendere in considerazione. La paziente ha 65 anni e verrà dimessa con ilostomia, il decorso post-intervento è nella norma. Indicare la situazione maggiormente appropriata:	L'assistita è sveglia da 2 ore, sono le 17.00, è in poltrona da 10 minuti. Informo che la durata della sessione è di 20 minuti, la dimissione è programmata tra 2 giorni, è presente il marito	L'assistita è sveglia da 2 ore, sono le 17.00, è in poltrona da 10 minuti. Informo che la durata della sessione è di 20 minuti, è stata informata che dovrà fare una TAC di controllo tra 40 minuti. La dimissione è programmata tra 2 giorni, sono presenti il marito e la figlia	L'assistita è sveglia da 2 ore, sono le 17.00, è in poltrona da 10 minuti. Informo che la durata della sessione è di 20 minuti, la dimissione è programmata tra 2 giorni. Il familiare si è dovuto assentare	L'assistita è sveglia da 15 minuti, solo le 17.00, verrà messa in poltrona. Informo che la durata della sessione è di 50 minuti, la dimissione è programmata tra 2 ore, è presente un amico che non vive con la signora	INFERMIERISTICA GENERALE
399	Il Piano Sanitario Nazionale ha durata:	Triennale	Biennale	Quadriennale	Quinquennale	INFERMIERISTICA GENERALE
400	Di norma il primo segno di disidratazione nel paziente anziano è :	La secchezza della bocca	La secchezza delle mucose comprese quelle dell'occhio	L'affaticamento	Il mal di testa	INFERMIERISTICA GENERALE
401	La più importante conseguenza a seguito della somministrazione di un unico dosaggio eccessivo di benzodiazepine può essere:	Depressione del respiro	Dipendenza psicologica	Ipertonia muscolare	Tutte le precedenti	INFERMIERISTICA GENERALE
402	Indicare la descrizione più completa e corretta nel definire le caratteristiche della Lesione da Decubito di 3° stadio.	Sede: sacrale. Dimensioni: 20 nmm x 35mm. Fondo: granulazione. Essudato: scarso. Bordo: arrossato. Cute circostante macerata. Fistole: assenti. Segni di infezione: assenti. Lesione non maleodorante. Ferita a tutto spessore che implica danno o necrosi del tessuto sottocutaneo che può estendersi fino alla fascia muscolare senza attraversarla; la lesione si presenta clinicamente come una profonda cavità che può presentare dei tratti sotto minati	Sede: sacrale. Dimensioni: 2 mm x 35mm. Fondo: granulazione. Essudato: scarso. Bordo: arrossato. Cute circostante macerata. Fistole: assenti. Segni di infezione: assenti. Lesione non maleodorante. Ferita a tutto spessore che implica danno o necrosi del tessuto sottocutaneo che può estendersi fino alla fascia muscolare senza attraversarla; la lesione si presenta clinicamente come una profonda cavità che può presentare dei tratti sotto minati	Sede: trocantere sinistro. Dimensioni: 20 mm x 35mm. Fondo: granulazione. Essudato: scarso. Bordo: arrossato. Cute circostante integra. Fistole: assenti. Segni di infezione: assenti. Lesione non maleodorante. Ferita a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma (abrasione, vescicola o cratere)	Sede: sacrale. Dimensioni: 20 nmm x 35mm. Fondo: fiuttente. Essudato: abbondante. Bordo: lineare. Cute circostante macerata. Fistole: assenti. Segni di infezione: assenti. Lesione non maleodorante. Ferita a tutto spessore che implica danno o necrosi del tessuto sottocutaneo che può estendersi fino alla fascia muscolare senza attraversarla; la lesione si presenta clinicamente come una profonda cavità che può presentare dei tratti sotto minati	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

403	Nella fase di accertamento infermieristico al paziente che all'atto del ricovero è valutato come potenzialmente disfagico, si applica lo screening della deglutizione. Per valutare la deglutizione si somministrano piccole quantità di acqua gel. In seguito, si riscontra nel paziente l'alterazione della qualità della voce e la comparsa di tosse. Indicare l'intervento più adeguato.	Non somministrare nulla per bocca e richiedere il consulto del medico per considerare il supporto nutrizionale artificiale	Attendere che il sintomo passi a ripetersi la valutazione della deglutizione	Eseguire un ulteriore test di deglutizione con piccole quantità di acqua di rubinetto	Mettere il paziente in posizione di sicurezza e avvisare tempestivamente il servizio di Rianimazione	INFERMIERISTICA GENERALE
404	Se si utilizza l'operazione booleano OR nel seguente modo "lesione OR ferita" si ottiene:	Una lista di pagine che contengono la parola lesione o la parola ferita o entrambe	Una lista di pagine che contengono la parola lesione e non la parola ferita	Una lista di pagine che contengono la parola ferita e non la parola lesione	Una lista di pagine che non contengono entrambe le parole	INFERMIERISTICA GENERALE
405	In presenza di una persona con ipoglicemia grave con perdita di conoscenza, quale dei seguenti farmaci bisogna preparare perché con ogni probabilità verrà prescritto:	Glucagone per via intramuscolare	Furosemide per via endovenosa	Atropina per via sottocutanea	Adrenalina per via endoverosa	INFERMIERISTICA GENERALE
406	Nell'ambito della valutazione della qualità, il confronto tra gli obiettivi prestabiliti e i risultati effettivamente raggiunti esprime:	L'efficacia	L'economicità	L'efficienza	L'appropriatezza	INFERMIERISTICA GENERALE
407	La formulazione completa della diagnosi infermieristica comprende:	Il titolo diagnostico, il fattore correlato e le caratteristiche definenti	Il titolo diagnostico, il fattore correlato ed i sintomi soggettivi	Il titolo diagnostico, la diagnosi medica e i dati delle indagini strumentali	Il problema di salute percepito dal paziente, la causa ed i sintomi	INFERMIERISTICA GENERALE
408	"Il paziente ha una dipendenza totale nelle Activities of Daily Living (ADL); i parametri sono buoni. È in fase di dimissione e presso il suo domicilio è previsto il mantenimento dell'ossigeno terapia con occhiali e bombola". In base ai dati disponibili:	L'igiene a letto può essere attribuita all'OSS	L'igiene a letto deve essere effettuata da un infermiere ed un OSS	L'igiene a letto deve essere effettuata dall'infermiere	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
409	Completare la frase con l'opzione corretta: "_____ attribuisce valore giuridico al Codice Deontologico"	La legge n. 42/1999	La legge n. 1/2002	Il D.P.R. n. 255/1974	Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro	INFERMIERISTICA GENERALE
410	Indicare i segni e sintomi più corretti da valutare nella fase di accertamento in un paziente affetto da cirrosi epatica scompensata.	Valutazione aspetto cognitivo (orientamento temporo-spaziale, difficoltà di concentrazione); presenza di edemi declivi; ascite; presenza di emorragia (ematemesi/melena); stato della cute (ittero, poliangectasie); livello di compromissione sistema nervoso (tremori)	Valutazione aspetto cognitivo (orientamento temporo-spaziale, difficoltà di concentrazione); presenza di edemi declivi; ascite; valutazione stato nutrizionale e idratazione; stato della cute (ittero, poliangectasie); livello di compromissione sistema nervoso (tremori)	Valutazione aspetto cognitivo (orientamento temporo-spaziale, difficoltà di concentrazione); pressione venosa centrale, ascite; presenza di emorragia (ematemesi/melena); stato della cute (ittero, poliangectasie); livello di compromissione sistema nervoso (tremori)	Valutazione dei parametri vitali (pressione, frequenza); presenza di edemi declivi; ascite; presenza di emorragia (ematemesi/melena); stato della cute (ittero, poliangectasie); livello di compromissione sistema nervoso (tremori)	INFERMIERISTICA GENERALE
411	La segnalazione degli eventi avversi (Incident Reporting) prevede l'indicazione dei fattori che possono aver contribuito all'evento. Indicare il gruppo di fattori più corretto.	Mancata adesione del paziente al progetto terapeutico, inadeguate conoscenze del personale, inadeguato funzionamento attrezzature	Mancata adesione del paziente al progetto terapeutico, variazione improvvisa dei parametri vitali del paziente, attrezzature eccessivamente sofisticate	Complessità della terapia, personale non qualificato, inadeguato funzionamento attrezzature	Barriere linguistiche del paziente, gruppo multidisciplinare, attrezzature eccessivamente sofisticate	INFERMIERISTICA GENERALE
412	Viene ricoverato dal pronto soccorso un paziente maschio di 18 anni, presente sudorazione, tremore, palpitazioni, debolezza generale, glicemia 65 mg/dl, riferisce nelle ultime due settimane polidipsia e poliuria, aumento dell'appetito e perdita peso > 20% negli ultimi 2 mesi. Il sospetto diagnostico potrebbe essere:	Diabete di tipo I	Diabete di tipo II	Diabete insipido tipo I e II	Probabilmente è affaticato da un'intensa attività fisica	INFERMIERISTICA GENERALE
413	Completare la frase con l'opzione corretta: "La _____ non è un parametro incluso nella Glasgow Coma Scale"	Termoregolazione	Risposta verbale	Apertura occhi	Risposta motoria	INFERMIERISTICA GENERALE
414	In una struttura residenziale, si vuole progettare uno strumento di monitoraggio della disidratazione negli anziani da attivare nel periodo estivo. Per individuare in letteratura i segni/sintomi maggiormente predittivi di disidratazione, quale tra i seguenti quesiti riflette in maniera più corretta la metodologia PICO per ricercare la letteratura su MedLine:	Nella popolazione anziana istituzionalizzata, quali sono i segni/sintomi predittivi di disidratazione?	In casa di riposo, quali strumenti sono più efficaci per il monitoraggio della disidratazione?	È più a rischio di disidratazione la popolazione anziana istituzionalizzata o quella gestita a domicilio da un infermiere di comunità?	È più efficace la somministrazione di infusioni per via intradermica o per via endovenosa nella prevenzione della disidratazione degli anziani?	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

415	Le principali complicanze croniche del diabete mellito sono:	Neuropatia diabetica, nefropatia diabetica, retinopatia diabetica, malattie cario vascolari, piede diabetico, complicanze in gravidanza	Coma ipoglicemico, neuropatia diabetica, nefropatia diabetica, glaucoma	Infarto, scompenso cardiaco, ictus, piede diabetico, coma chetoacidotico	Coma ipoglicemico, glaucoma, infarto, scompenso cardiaco	INFERMIERISTICA GENERALE
416	Le cure palliative sono rivolte:	Sia alla persona malata che alla sua famiglia per la cura attiva e totale, quando la malattia di base è contraddistinta da una inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta che non risponde più a trattamenti specifici	Esclusivamente a pazienti con patologie nefrologiche	Esclusivamente a pazienti con patologie oncologiche	Esclusivamente a pazienti oncologici che hanno terminato la chemioterapia	INFERMIERISTICA GENERALE
417	Con l'allattamento materno esclusivo si intende:	Solo latte materno senza alcuna aggiunta	Solo latte materno e acqua	Solo latte materno e soluzione glucosata	Solo latte materno ed elettrolitica	INFERMIERISTICA GENERALE
418	Per screening si intende:	Un percorso (con test e/o esami strumentali) condotto a tappeto su una fascia più o meno ampia della popolazione, allo scopo di individuare una patologia o ancora meglio i suoi prodromi, prima che si manifesti con i sintomi	Un percorso (con test ed esami strumentali) condotto su una fascia di popolazione particolarmente a rischio per una determinata patologia	Un test per valutare il quoziente intellettivo	Un percorso (con test e/o esami strumentali) condotto su tutta la popolazione che presenta lo stesso sintomo, riconducibile ad una particolare patologia	INFERMIERISTICA GENERALE
419	Il respiro di Cheyne-Stokes è contraddistinto da:	Respiri profondi alternati a brevi periodi di apnea	Frequenza cardiaca a 80 atti al minuto	Frequenza respiratoria inferiore a 20 atti al minuto	Frequenza respiratoria superiore a 12 atti al minuto e respiro profondo	INFERMIERISTICA GENERALE
420	Completare la frase con l'opzione corretta: " Il _____ può configurare ipotesi di responsabilità professionale colposa"	Comportamento negligente, imprudente, imperito	Mancato rispetto dei regolamenti e delle procedure aziendali	Mancato rispetto del codice deontologico	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
421	Nella valutazione dello screening nutrizionale può essere applicata la scala:	MNA (Mini nutritional assessment)	Di Barthel	Di Painad	Di Tinetti	INFERMIERISTICA GENERALE
422	In caso di ostruzione parziale delle vie aeree la manovra di Heimlich:	Non deve essere praticata	Deve essere praticata solo se la vittima è priva di coscienza	Deve essere praticata solo se la vittima è ancora cosciente	Deve essere praticata sempre	INFERMIERISTICA GENERALE
423	Completare la frase con l'opzione corretta: " _____ riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere"	Il lavaggio delle mani	La dotazione di antibiotici	Il ricambio quotidiano della biancheria del letto	La dotazione di disinfettanti	INFERMIERISTICA GENERALE
424	Le norme d'uso del registro di carico-scarico delle sostanze stupefacenti identificano nel Coordinatore Infermieristico:	Il responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e reale delle sostanze stupefacenti	Colui che accerta, attraverso periodiche ispezioni, la corretta tenuta del registro di carico e scarico del reparto	L'incaricato della buona conservazione del registro	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
425	Completare la frase con l'opzione corretta: " _____ causano l'insufficienza renale cronica (IRC)"	Tutte le altre risposte sono corrette	Le malattie nefrovascolari	Le glomerulonefriti	Il diabete	INFERMIERISTICA GENERALE
426	Al fine della preparazione dei set chirurgici, i ferri chirurgici devono essere sottoposti alle fasi del processo seguenti:	Decontaminazione-disinfezione-sterilizzazione	Sterilizzazione-disinfezione-sanificazione	Disinfezione-decontaminazione-sterilizzazione	Sterilizzazione-decontaminazione-disinfezione	INFERMIERISTICA GENERALE
427	Per sterilizzazione si intende:	Un processo atto alla distruzione di tutti i microorganismi patogeni, non patogeni e spore comprese	Un processo atto all'abbassamento della carica microbica da oggetti e superfici	Un processo atto alla distruzione dei soli microorganismi patogeni	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
428	Il rilievo della pressione dell'arteria polmonare è possibile soltanto:	Attraverso il catetere di Swan Ganz o similari	Negli interventi di cardiocirurgia e chirurgia toracica	Con una particolare apparecchiatura denominata IABP	Attraverso la sonda Sengstaken-Blakemore	INFERMIERISTICA GENERALE
429	Il Caregiver è:	Colui che fornisce assistenza e si prende cura di una persona non in grado di prendersi cura di sé	L'infermiere che si prende cura del paziente durante il periodo di degenza	Il medico di Medicina generale che si prende cura del suo assistito	Il fisioterapista che ha in carico l'assistito	INFERMIERISTICA GENERALE
430	La raccomandazione n.8 del Ministero della salute per la prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari ricorda che tali episodi sono favoriti da:	Lunghe attese nelle zone di emergenza e accettazione che favoriscono sensazioni di frustrazione nell'utenza	Assenza di linee guida	Continuo ricambio del personale sanitario	Assenza di procedure professionali	INFERMIERISTICA GENERALE
431	Le fiali di KCL devono essere conservate:	In un apposito contenitore, esclusivo, riportante la scritta "Farmaco pericoloso"	Chiuse a chiave nella cassaforte degli "stupefacenti"	Assieme ai farmaci per uso parentale	Assieme ai farmaci per uso orale	INFERMIERISTICA GENERALE
432	Completare la frase con l'opzione corretta: "L'infermiere si aspetta di trovare il batterio _____ alle analisi di laboratorio per un paziente in cui si sospetta la patologia dell'ulcera peptica"	Helicobacter pylori	Micrococcus	Corynebacterium	Staphylococcus Aureus	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

433	Un paziente riferisce bruciore durante la minzione e aumentata frequenza minzionale. L'infermiere nota che un campione di urina sterile è torbida. Questi segni e sintomi sono dovuti a:	Cistite	Calcolo renale	Emorragia	Incontinenza	INFERMIERISTICA GENERALE
434	Tenere un sacchetto di drenaggio per catetere di tipo Foley in una posizione più bassa rispetto alla vescica previene:	Il reflusso urinario	La ritenzione urinaria	L'incontinenza riflessa	L'incontinenza urinaria	INFERMIERISTICA GENERALE
435	La quantità di sangue da prelevare per ogni campione di emocoltura è di:	20 cc	1 cc	3-4 cc	5-10 cc	INFERMIERISTICA GENERALE
436	Durante la notte un paziente presenta uno stato confusionale acuto e tenta di rimuoversi più volte la cannula tracheostomica. Il medico di guardia è impegnato per un'urgenza. L'infermiere:	Applica e documenta in cartella infermieristica la contenzione fisica, in quanto sussiste un reale pericolo per il paziente. Quindi lo monitora e attende l'arrivo del medico di guardia per discutere il caso	Contatta il parente più prossimo da cui acquisisce il consenso telefonico per la contenzione fisica	Attende il medico di guardia, sperando che il paziente non si rimuova la cannula. Non può intraprendere alcuna decisione in autonomia	Applica la contenzione farmacologica a basse dosi secondo il protocollo previsto dalla unità operativa	INFERMIERISTICA GENERALE
437	Per effettuare un'iniezione intramuscolare in un bambino di 10 mesi, l'infermiere sceglie la:	Sede del vasto laterale	Sede ventrogluteale	Sede dorsogluteale	Sede deltoidea	INFERMIERISTICA GENERALE
438	Nell'aspirazione di un farmaco da flacone, l'infermiere inietta aria all'interno:	In quanto crea pressione positiva rendendo più facile l'aspirazione	In nessun caso per l'elevato rischio di contaminazione	Solo per i farmaci viscosi	In nessun caso in quanto si crea pressione negativa e risulterebbe più difficoltoso aspirare	INFERMIERISTICA GENERALE
439	Il medico, durante la visita, prescrive il posizionamento di gambaletti elastocompressivi antitrombo di I° a un paziente. Per ottenere la giusta misura delle calze l'infermiere rileva la:	Misura della lunghezza di entrambe le gambe, dal tallone alla zona poplitea, e misura della circonferenza del polpaccio nel punto più largo	Misura della lunghezza della gamba destra dal tallone alla zona poplitea e misura della circonferenza del polpaccio nel punto più ampio	Misura della lunghezza di entrambe le gambe dal tallone alla zona poplitea	Misura della circonferenza del polpaccio nel punto più largo	INFERMIERISTICA GENERALE
440	Per la ricerca del sangue occulto fecale sono necessari:	1 campione	4 campioni, uno per ogni diversa evacuazione	3 campioni prelevati dalla stessa defecazione	2 campioni, uno per ogni diversa defecazione	INFERMIERISTICA GENERALE
441	È in preparazione il trasferimento di un paziente presso il reparto di Malattie infettive per tubercolosi polmonare in fase attiva. Cosa bisogna predisporre:	Camera di isolamento respiratorio a pressione negativa continua	Camera di isolamento respiratorio a pressione positiva intermittente	Camera di isolamento respiratorio a pressione positiva continua	Camera di isolamento respiratorio a pressione negativa intermittente	INFERMIERISTICA GENERALE
442	All'ingresso della stanza di degenza di un paziente con tubercolosi polmonare in fase attiva si dovranno predisporre:	Guanti, sovracamici, mascherine chirurgiche, scermeri facciali, maschere filtranti	Maschere filtranti	Maschere chirurgiche e guanti	Maschere filtranti e mascherine chirurgiche	INFERMIERISTICA GENERALE
443	In reparto due pazienti ricoverati nella stessa stanza risultano positivi al C. Difficilis. L'infermiere:	Predisporre le misure di isolamento funzionale, mantenendo i pazienti nella stessa stanza	Predisporre le misure di isolamento funzionale e spostare i pazienti in due stanze diverse	Mantiene i pazienti nella stessa stanza senza predisporre i DPI	Sposta i pazienti in due diverse stanze con bagno in comune	INFERMIERISTICA GENERALE
444	L'infermiere deve somministrare soluzione fisiologica 2.000 ml in 24 ore. Bisogna impostare il dispositivo di gocciolamento controllato alla velocità di quanti ml/h?	83	104	62	50	INFERMIERISTICA GENERALE
445	In caso di richiesta medica per "Indici di flogosi", vengono prescritti i seguenti esami ematici, eccetto:	Proteinuria	VES	PCR	Emocromo con formula	INFERMIERISTICA GENERALE
446	In un paziente con ileostomia, le feci fuoriescono:	Liquide	Solide	Acoliche	Miste a muco	INFERMIERISTICA GENERALE
447	Il digiuno nelle 6-8 ore precedenti deve essere predisposto nella procedura diagnostica:	TC torace con mezzo di contrasto	RX torace	EGA	MOC	INFERMIERISTICA GENERALE
448	Per la detersione di una colostomia si utilizza:	Soluzione fisiologica 0,9%	Acqua e sapone neutro	Iodio Povidone	Clorexidina 0,2%	INFERMIERISTICA GENERALE
449	Completare la frase con l'opzione corretta: "_____ è opportuno effettuarlo al mattino"	Lo Scotch test	L'indice di flogosi	L'EGA	Il prelievo per l'emocoltura	INFERMIERISTICA GENERALE
450	Per ridurre l'edema in un arto superiore si deve posizionare la:	Mano più alta del gomito, il gomito più alto della spalla	Mano più alta del gomito	Mano più alta del polso	Mano più alta del gomito in posizione semiseduta	INFERMIERISTICA GENERALE
451	Un paziente cade dal letto mentre tenta di spostarsi in autonomia sulla sedia, non riportando danni evidenti. L'infermiere:	Avverte il medico, e invia la segnalazione alla Direzione sanitaria/Gestione del rischio clinico, documentando l'accaduto in cartella	Non avverte il medico e accompagna il paziente nuovamente a letto, alzando le spondine	Non avverte il medico, ma posiziona una pettorina contenitiva per il periodo in cui il paziente rimane seduto sulla sedia	Avverte il medico, ma non invia la segnalazione alla Direzione sanitaria/Gestione del rischio clinico	INFERMIERISTICA GENERALE
452	Un paziente ricoverato presenta abbondante essudato giallastro maleodorante nella lesione cutanea. L'infermiere applica:	Una medicazione all'argento più prelievo tampone da inviare in microbiologia	Una garza betadinata	Una medicazione idrocolloide	Una garza betadinata più prelievo tampone da inviare in microbiologia	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

453	Nel reparto di Terapia intensiva sono aumentati i casi di infezione delle vie respiratorie nei pazienti ricoverati. L'infermiere deve:	Porre maggiore attenzione all'igiene del cavo orale	Porre maggiore attenzione all'igiene personale	Broncoaspirare tutti i pazienti almeno due volte per turno	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
454	Completare la frase con l'opzione corretta: " In caso di dimissione difficile, è utile somministrare la _____ per agevolare l'équipe multidisciplinare nella pianificazione di una continuità assistenziale di cura sul territorio"	Scala BRASS	Scala di Conley	Scala ReTos	Scala di Barthel	INFERMIERISTICA GENERALE
455	Completare la frase con l'opzione corretta: "La figura del _____ non fa parte del Servizio di igiene e sanità pubblica"	Infermiere generico	Tecnico	Medico igienista	Assistente sanitario	INFERMIERISTICA GENERALE
456	L'elettroshock può essere somministrato con:	Consenso scritto del paziente e presenza di indicazioni terapeutiche	Consenso della famiglia e assenza di controindicazioni	Richiesta espressa del tutore e presenza di indicazioni terapeutiche	Fallimento di altre terapie e pericolosità sociale del paziente	INFERMIERISTICA GENERALE
457	La tossina prodotta dal clostridium botulinum provoca manifestazioni a carico del:	Sistema nervoso	Sistema linfatico	Fegato	Rene	INFERMIERISTICA GENERALE
458	L'agopuntura e la fitoterapia possono essere esercitate:	Solo da medici abilitati	Solo da operatori abilitati con corsi professionali	Anche da infermieri e ostetriche specializzati	Anche da terapisti di varie categorie	INFERMIERISTICA GENERALE
459	Il campo proprio di esercizio e responsabilità di un professionista è descritto nel:	Profilo professionale	Codice deontologico	Contratto di lavoro	Codice civile dell'impiegato	INFERMIERISTICA GENERALE
460	In base alla legge n. 180/1978 le persone affette da malattia mentale:	Devono essere ricoverate in un ospedale generale, in servizi specifici	Devono essere seguite da personale appositamente preparato	Devono essere ricoverate in un ospedale specializzato	Possono essere ricoverate per non meno di venti giorni	INFERMIERISTICA GENERALE
461	L'attività dei disinfettanti chimici è in genere ridotta:	Dalla presenza di materiale organico	Dalla presenza di spore	Dalla bassa temperatura ambientale	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
462	Completare la frase con l'opzione corretta: " _____ può essere utilizzato per gli strumenti endoscopici"	La glutaraldeide	La paraformaldeide	Il sale di ammonio quaternario	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
463	Indicare l'affermazione errata rispetto alla sedazione terminale e palliativa (SICP,2006):	Comprende anche un approccio con terapia ansiolitica	Consiste nella riduzione della vigilanza con mezzi farmacologici per il controllo del sintomo refrattario	Non comprende la sedazione occasionale	La perdita di coscienza non è l'aspetto primario, ma solo l'effetto collaterale del farmaco	INFERMIERISTICA GENERALE
464	Una persona, stando in piedi su una base instabile, migliora le sue condizioni di equilibrio quando:	Flette e allarga le gambe	Tiene le gambe strette	Flette le gambe	Allarga le gambe	INFERMIERISTICA GENERALE
465	Completare la frase con l'opzione corretta: " _____ costituisce un rischio specifico da considerare in caso si fibrillazione atriale, anche se sottoposta a cardioversione"	La tromboembolia arteriosa	L'arresto cardiaco improvviso	L'extrasistolia notturna	L'ustione da scarica elettrica	INFERMIERISTICA GENERALE
466	Per uniformare le procedure relative ad una tecnica (es. cateterismo vescicale) all'interno dell'équipe è opportuno utilizzare:	Protocolli assistenziali	Consegna	Cartella Infermieristica	Passaparola	INFERMIERISTICA GENERALE
467	Quali sono tutte le fasi del processo assistenziale?	Informativa, organizzativa, esecutiva, valutativa	Informativa, organizzativa, esclusiva	Informativa, di complicità, organizzativa	Informativa, dissociativa, inclusiva, contestativa	INFERMIERISTICA GENERALE
468	Qual è la prima fase del processo assistenziale?	La fase informativa	La fase organizzativa	La fase valutativa	La fase dissociativa di intervento	INFERMIERISTICA GENERALE
469	Nell'ambito del nursing, secondo Florence Nightingale:	Intervenire sull'ambiente e sull'igiene contribuisce al benessere dell'uomo	L'ambiente non ha nessuna correlazione con il benessere dell'uomo	gli antibiotici sono gli unici elementi che possono contribuire al benessere dell'uomo	il lavoro di équipe è controproducente	INFERMIERISTICA GENERALE
470	L'empiema è una raccolta di:	Pus in una cavità preformata	Pus in una cavità neoformata	Sangue in una cavità preformata	Sangue in una cavità neoformata	INFERMIERISTICA GENERALE
471	La FIVET è:	Una tecnica di riproduzione assistita	Una malattia esantematica	Una tecnica di biologia molecolare	Una malformazione cardiaca congenita	INFERMIERISTICA GENERALE
472	Le scale EWS (Early Warning Score) misurano:	L'instabilità/ degrado dei parametri vitali del paziente	Il rischio di infezione catetere venoso correlato	La complessità assistenziale	Il grado di dispnea nel paziente BPCO	INFERMIERISTICA GENERALE
473	Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza?	Trombosi	Setticemia	Pneumotorace	Flebite	INFERMIERISTICA GENERALE
474	Nel suo testo "From Novice to Expert" è stata trattata l'analisi della socializzazione e l'acquisizione delle abilità della professione infermieristica. Questa affermazione si riferisce a:	Patricia Benner	Callista Roy	Nancy Roper	Martha Roger	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

475	Quale tra i seguenti antibiotici appartiene alla famiglia di macroliti?	Eritromicina	Amikacina	Gentamicina	Tobramicina	INFERMIERISTICA GENERALE
476	Quale tra i seguenti farmaci è generalmente indicato per indurre il parto a termine?	Ossitocina	Combinazione di ergonovina e indometacina e molta acqua	Ergonovina	Indometacina	INFERMIERISTICA GENERALE
477	La minzione avviene quando:	I muscoli pelvici si rilassano e i muscoli addominali si contraggono	Il sistema simpatico attivato stimola lo sfintere interno	Il filtrato glomerulare entra nei tubuli	L'aumento della pressione stende il muscolo detrusore	INFERMIERISTICA GENERALE
478	L'iperplasia di un organo o di un tessuto consiste nell'aumento:	Del numero di cellule	Del contenuto idrico cellulare	Del volume cellulare	Del contenuto ematico cellulare	INFERMIERISTICA GENERALE
479	Cosa sono i farmaci LASA?	Farmaci che possono essere confusi con altri	Farmaci equivalenti	Farmaci per uso compassionevole	Farmaci galenici	INFERMIERISTICA GENERALE
480	La "regola delle 7 G" nella somministrazione di un farmaco NON prevede:	Giusta trascrizione	Giusto dosaggio	Giusta prescrizione	Giusta registrazione	INFERMIERISTICA GENERALE
481	Cosa si intende per infezioni crociate ospedaliere?	Infezioni che si originano e si diffondono all'interno di un singolo ospedale	Infezioni per le quali è necessario il ricovero ospedaliero	Infezioni che non si sviluppano in ospedale	Infezioni che si verificano in più ospedali di una stessa città contemporaneamente	INFERMIERISTICA GENERALE
482	La sincope causata da sforzi estremi o paura è classificata come:	Sincope vasovagale	Sincope da ipotensione ortostatica	Sincope cardiaca	Sincope del seno carotideo	INFERMIERISTICA GENERALE
483	Per la stratificazione della severità del quadro clinico di quale patologia è utilizzata la classificazione NYHA?	Insufficienza cardiaca	BPCO	Infarto miocardico	Cirrosi epatica	INFERMIERISTICA GENERALE
484	L'atteggiamento di caring è:	Proprio dei professionisti che operano in campo socio sanitario e in altri campi	Esclusivo della professione infermieristica	Esclusivo degli psicologi	Esclusivo dei professionisti che operano in campo socio sanitario	INFERMIERISTICA GENERALE
485	Quale delle seguenti condizioni di per sé NON rappresenta un'indicazione sufficiente ad orientare la decisione per l'adozione di un cateterismo vescicale a permanenza?	Mobilità compromessa	Ricorrente ritenzione urinaria	Incontinenza in presenza di lesioni da pressione	Interventi chirurgici con anestesia generale	INFERMIERISTICA GENERALE
486	Per eminegligenza si intende una condizione dovuta a:	Una compromissione delle risposta sensoriale e motoria, della rappresentazione mentale e dell'attenzione spaziale corporea e dell'ambiente caratterizzata da una inattenzione verso una parte del corpo e una iperattenzione verso l'altra	Nessuna delle altre risposte è corretta	Una compromissione delle motoria e dell'attenzione spaziale corporea e dell'ambiente caratterizzata da una maggiore attenzione verso una parte del corpo rispetto all'altra	Una compromissione delle risposta sensoriale e motoria di un emisoma	INFERMIERISTICA GENERALE
487	La causa di danno più frequente nei pazienti ospedalizzati sono:	le terapie farmacologiche	gli interventi chirurgici	le procedure ostetriche e ginecologiche	le procedure mini invasive	INFERMIERISTICA GENERALE
488	L'intubazione orotracheale rispetto a quella nasotracheale:	presenta un minor rischio di infezione dei seni paranasali	presenta maggiore tollerabilità	nessuna delle altre risposte è corretta	garantisce maggiore stabilità	INFERMIERISTICA GENERALE
489	L'accertamento di morte cerebrale prevede un periodo di osservazione pari a:	6 ore	12 ore	20 minuti con ECG	6 ore negli adulti, 12 ore nei bambini tra 1 e 5 anni e 24 ore nei bambini < 1 anno	INFERMIERISTICA GENERALE
490	Per favorire la cicatrizzazione del moncone ombelicale è necessario tenere:	il moncone rivolto verso l'alto, fuori dal pannolino, avvolto in una garza sterile e fissato con rete elastica	il moncone al di sotto del pannolino rivolto verso il basso e non esposto all'aria	il moncone imbevuto di soluzione fisiologica per evitare la disidratazione che ritarda la cicatrizzazione	avvolto in garza sterile, imbevuto di soluzione iodata per facilitare l'essiccazione	INFERMIERISTICA GENERALE
491	Devi predisporre il bilancio idrico in un paziente con scompenso cardiaco a domicilio, quali sono gli interventi più completi e pertinenti:	Controllo del peso giornaliero, controllo dei parametri vitali, registrazione dei liquidi in entrata ed uscita	Controllo nutrizionale metabolico e registrazione dei liquidi in entrata ed uscita	Nessuna delle altre risposte è corretta	Somministrazione dieta iposodica e controllo del peso corporeo due volte a settimana	INFERMIERISTICA GENERALE
492	Devi procedere nella medicazione di una ferita chirurgica settica. Quale delle seguenti è la procedura corretta:	Procedere dalla parte più pulita alla parte più sporca della ferita mantenendosi sopra la ferita stessa. Cambiare tampone per disinfettare altre zone della cute	Procedere dalla parte più sporca alla parte più pulita della ferita mantenendosi sopra la ferita stessa. Disinfettare altre zone della cute	Disinfettare prioritariamente le altre zone della cute circostante procedendo poi dalla parte più pulita a quella più sporca	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
493	Come si effettua la tosse efficace per la persona operata?	Porre le mani sul punto di incisione, assumere un posizione leggermente flessa in avanti, inspirare profondamente con la bocca leggermente aperta e dare 3-4 colpi di tosse	Porre le mani sul sito di incisione, assumere la posizione eretta, inspirare profondamente, dare 3-4 colpi di tosse, ed espellere le secrezioni	Nessuna delle altre risposte è corretta	Porre un cuscino sul sito di incisione, assumere la posizione di Fowler, inspirare lentamente, dare 6-8 colpi di tosse, ed espellere le secrezioni	INFERMIERISTICA GENERALE
494	Quale tra le seguenti è una metodica di somministrazione dell'aerosolterapia?	Tutte le altre risposte sono corrette	Spray con distanziatore	Apparecchio pneumatico	Apparecchio ad ultrasuoni	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

495	Un paziente ricoverato nel tuo reparto viene sottoposto a paracentesi, delle seguenti azioni quale è quella corretta?	Misuri e registri il volume e le caratteristiche del liquido raccolto	Posizioni il paziente durante la procedura in Trendellemburg anteriore	Durante la procedura misuri costantemente la temperatura corporea	Tutte le altre risposte sono corrette	INFERMIERISTICA GENERALE
496	Individua l'azione NON corretta nell'esecuzione di un esame urine con strisce reagenti:	Fornire alla persona un contenitore sterile per la raccolta delle urine	Accertare e segnalare le presenza di fattori che possono influenzare il campione	Immergere la striscia reagente nel campione delle urine per il tempo indicato dalle istruzioni	Confrontare i cambiamenti di colore con la tabella colorimetrica presente sul contenitore	INFERMIERISTICA GENERALE
497	Cos'è la scala di Norton:	uno strumento di valutazione utile ad individuare pazienti a rischio di lesione cutanea da pressione	una scala analogico visuale per la autovalutazione del dolore	uno strumento di rilevazione del danno sensoriale	uno strumento di valutazione per individuare il grado di dipendenza del paziente	INFERMIERISTICA GENERALE
498	In caso di vene varicose agli arti inferiori, quale delle seguenti raccomandazioni non è indicata?	Mantenere più a lungo possibile la posizione sdraiata	Evitare di mantenere per lungo tempo la posizione eretta	Usare calze elastiche	Tenere gli arti sollevati	INFERMIERISTICA GENERALE
499	Se un paziente deve subire un intervento chirurgico d'urgenza, quale tra i seguenti interventi deve essere effettuato per primo dall'infermiere?	Incannulare una vena ed effettuare i prelievi ematici	Somministrare la pre anestesia	Avvisare i familiari	Posizionare un catetere vescicale	INFERMIERISTICA GENERALE
500	Nell'istillazione di gocce oculari, l'infermiere deve:	Tirare delicatamente verso il basso la palpebra inferiore	Tirare delicatamente verso l'alto la palpebra superiore	Chiedere al paziente di guardare verso il pavimento	Appoggiare delicatamente il contagocce alle ciglia	INFERMIERISTICA GENERALE
501	Per pollachiuria si intende:	L'elevata frequenza delle minzioni	La perdita involontaria di urine	L'eccessiva quantità di urina prodotta	La minzione difficoltosa e dolorosa	INFERMIERISTICA GENERALE
502	In caso di pneumotorace, il catetere inserito in cavità pleurica deve:	Essere collegato a valvola ad acqua	Essere collegato a sacchetto sterile a caduta	Restare clampato in prima giornata	Essere lasciato aperto ma sotto medicazione occlusiva	INFERMIERISTICA GENERALE
503	In un paziente con pneumotorace che viene portato in pronto soccorso, l'infermiere deve accertare:	Cianosi, dispnea, possibile spostamento tracheale, tachicardia	Sudorazione, midriasi, bradicardie, ipotensione	tutte le altre risposte sono corrette	Bradipnea, ipotensione	INFERMIERISTICA GENERALE
504	Per accertare una persona che presenta insufficienza cardiaca destra un infermiere deve:	controllare se sono presenti giugulari distese quando il letto è inclinato di 45 gradi	auscultare uno sfregamento pericardico	controllare l'irradiazione della sensazione opprimente sotto lo sterno	auscultare suoni cardiaci S1 e S2 cupi	INFERMIERISTICA GENERALE
505	La scala di EXTON-SMITH si usa per:	valutare il rischio di insorgenza di lesioni da decubito	valutare il rischio di infezione di una ferita chirurgica	valutare lo stato nutrizionale	valutare lo stato mentale	INFERMIERISTICA GENERALE
506	La scala di braden identifica i pazienti a rischio ed ha un valore soglia di:	16	17	23	15	INFERMIERISTICA GENERALE
507	Se un infermiere riporta in cartella infermieristica un valore calcolato con l'utilizzo della scala ASEPSIS, significa che ha effettuato una valutazione:	Sul processo di guarigione di una ferita chirurgica	Sul processo di sterilizzazione	Sul rischio di contrarre infezioni, stimato nella fase precedente l'intervento chirurgico	Sul rischio di contrarre infezioni, rilevato dopo l'intervento chirurgico	INFERMIERISTICA GENERALE
508	Cosa valuta la scala di Maslow?	Le necessità e i bisogni dell'uomo	Lo stato di coscienza	Il rischio infettivo	Il rischio professionale	INFERMIERISTICA GENERALE
509	Quali sono le componenti fondamentali della pratica infermieristica?	Tutte le altre risposte sono corrette	L'olismo, la difesa e il sostegno della persona	L'assistenza e l'educazione dell'utente	La promozione, il mantenimento ed il ripristino della salute	INFERMIERISTICA GENERALE
510	Con il termine anuria si intende la:	mancata produzione di urina	produzione di urina > a 500 ml/24 ore	mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica	produzione di urina < a 500 ml/24 ore	INFERMIERISTICA GENERALE
511	Interrogando una banca dati mediante la striscia di ricerca "emicrania AND cefalea", si ottengono:	Solo gli articoli che contengono entrambi i termini "emicrania" e "cefalea"	Solo gli articoli che contengono "emicrania", "AND" e "cefalea"	Qualsiasi articolo che contenga il termine "emicrania" o in alternativa "cefalea"	Gli articoli dove i termini "emicrania" e "cefalea" sono utilizzati dagli autori come sinonimi	INFERMIERISTICA GENERALE
512	Le infezioni ospedaliere maggiormente riscontrate nei nosocomi italiani secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute sono le:	infezioni del tratto urinario	nessuna delle altre risposte è corretta	infezioni della ferita chirurgica	infezioni delle vie respiratorie	INFERMIERISTICA GENERALE
513	La principale azione della digitale nel trattamento della insufficienza cardiaca è:	l'aumento della forza contrattile del cuore	diminuzione della cronotropia	la riduzione della frequenza cardiaca	il controllo della diuresi	INFERMIERISTICA GENERALE
514	Completare la seguente frase con l'opzione corretta: "Per tachicardia si intende una frequenza _____ battiti al minuto".	superiore a 100	tra 60 e 70	tra 80 e 90	tra 70 e 80	INFERMIERISTICA GENERALE
515	Un ago 22 gauge rispetto a un ago 18 gauge è:	Più piccolo	Delle stesse dimensioni ma con filettatura diversa	Di materiale diverso	Più grande	INFERMIERISTICA GENERALE
516	Le teorie e modelli infermieristici, per quanto diversi tra loro, hanno in comune alcuni concetti fondamentali; quali?	Uomo, ambiente, salute - malattia, assistenza infermieristica	Diagnosi infermieristica, processo di assistenza e piano di assistenza	Raccolta e analisi dei dati, individuazione del problema del paziente, pianificazione dell'assistenza infermieristica, attuazione e valutazione	Bisogno, autonomia e problema	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

517	L'incapacità del paziente di evacuare feci normali, la presenza di liquame fecale, lo stimolo continuo a defecare sono condizioni anomale che fanno ipotizzare la presenza di:	un fecaloma	una fistola anorettale	di una fistola urogenitale	emorroidi del terzo stadio	INFERMIERISTICA GENERALE
518	La disuria è una minzione:	dolorosa	dolorosa ed ematica	che avviene senza stimolo di urinare	frequente, di poche gocce di urina	INFERMIERISTICA GENERALE
519	Nella fase dell'accertamento, l'ispezione è riferita:	Al solo esame visivo	All'esame visivo, alla palpazione, all'auscultazione e alla percussione	All'esame fisico e psichico	All'esame visivo, alla palpazione, all'auscultazione, alla percussione e all'intervista	INFERMIERISTICA GENERALE
520	L'Unita Internazionale è la:	Centesima parte di 1 ml	Centesima parte di 10 ml	Decima parte di 1 ml	Cinquantesima parte di 1 ml	INFERMIERISTICA GENERALE
521	Il parenchima renale è suddiviso in:	corticale e midollare	capsula e surreni	calici e nefroni	nefroni e tubuli	INFERMIERISTICA GENERALE
522	Una ghiandola si definisce endocrina quando:	Il prodotto di secrezione viene riversato direttamente nel sangue	È situata all'interno della cavità addominale	Il prodotto di secrezione viene riversato nel sistema linfatico	È situata nell'apparato digerente	INFERMIERISTICA GENERALE
523	Tra i fattori di rischio cardiovascolare elencati NON viene normalmente incluso:	L'esercizio fisico	Il peso	La familiarità	Il diabete mellito	INFERMIERISTICA GENERALE
524	La professione infermieristica è orientata:	all'uomo nella sua globalità	all'uomo nel suo ambiente	ai bisogni fisici dell'uomo	ai bisogni psicologici dell'uomo	INFERMIERISTICA GENERALE
525	La diaforesi è:	una profusa sudorazione	una sudorazione normale	la stimolazione elettrica di una miocellula	il trattamento preventivo del plasma per la somministrazione umana	INFERMIERISTICA GENERALE
526	L'infusione continua di Dopamina a basse dosi può determinare:	Vasodilatazione nel letto vascolare renale	Vasocostrizione nel letto vascolare mesenterico	Vasocostrizione nel letto vascolare intracerebrale	Moderato aumento della frequenza cardiaca e della forza contrattile del cuore	INFERMIERISTICA GENERALE
527	Per assorbimento di un farmaco si intende il passaggio di un farmaco:	dal punto di somministrazione al circolo ematico sistemico	dal sistema arterioso a sistema venoso	nessuna delle altre risposte è corretta	dallo stomaco all'intestino	INFERMIERISTICA GENERALE
528	L'ipoglosso è un nervo:	motorio	misto	sensitivo	sensoriale	INFERMIERISTICA GENERALE
529	L'organo del Corti si trova:	Nell'orecchio	Nell'occhio	Nel fegato	Nel pancreas	INFERMIERISTICA GENERALE
530	Tra quelle elencate, indicare quale non è una raccomandazione di buona pratica per la corretta gestione del drenaggio chirurgico:	sono tutte raccomandazioni di buona pratica assistenziale	controllare periodicamente la posizione delle varie clamp e valvole	in presenza di cambiamento qualitativo del drenato rispetto agli standard per tipologia d'intervento informare il chirurgo che valuterà la manovra più opportuna da effettuarsi	mantenere il circuito chiuso (asettico) per tutto il periodo di permanenza del dispositivo	INFERMIERISTICA GENERALE
531	Nelle emorragie dovute a rottura delle varici esofagee è utile:	introdurre una sonda di Sengstaken - Blakemore	usare anticoagulanti	introdurre una sonda di Dormia	procedere con una fundo-plicatio secondo Nissen	INFERMIERISTICA GENERALE
532	Il polso paradossale è caratteristico di:	tamponamento cardiaco	pneumotorace	stenosi mitralica post reumatica	stenosi valvolare aortica	INFERMIERISTICA GENERALE
533	Esaminando la capacità di un paziente nello svolgere correttamente e autonomamente le IADL all'interno di una valutazione multidimensionale, quale delle seguenti attività NON dovrà essere analizzata:	usare i servizi igienici in modo appropriato	usare mezzi di trasporto	utilizzare il telefono	fare acquisti	INFERMIERISTICA GENERALE
534	Quali sono i cateteri vescicali temporanei:	Nelaton, Tieneman, Mercier	Nessuna delle altre risposte è corretta	Levin, Einhors, Faucher	Foley, Pezzer, Couvelier	INFERMIERISTICA GENERALE
535	La Protamina solfato è usato come antidoto:	Dell'eparina	Dei benzodiazepinici	Dei farmaci stupefacenti oppioidi	Dei farmaci non steroidei	INFERMIERISTICA GENERALE
536	La tolleranza farmacologica è:	la necessità di aumentare progressivamente le dosi per ottenere lo stesso effetto che all'inizio del trattamento si osserva con dosi minori di farmaco	la necessità di diminuire progressivamente le dosi per avere effetti minori	la possibilità di non dovere diminuire le dosi per ottenere un determinato effetto	la necessità di mantenere le stesse dosi per avere sempre lo stesso effetto	INFERMIERISTICA GENERALE
537	Il monossido di carbonio è letale perché:	compete con O2 nel legame con Hb	inibisce la citocromo ossidasi	modifica la struttura della Hb	produce metaemoglobina	INFERMIERISTICA GENERALE
538	Il tempo impiegato dall'operatore sanitario per comunicare con la persona assistita:	È tempo di cura	È tempo da impiegare a discrezione dell'operatore	È tempo sprecato	È tempo deciso dalla persona assistita	INFERMIERISTICA GENERALE
539	Quale opzione di risposta riporta la definizione di emottisi?	L'emottisi è emissione di sangue proveniente dalle vie respiratorie	L'emottisi è emissione di sangue con le feci	L'emottisi è emissione di sangue dall'apparato urinario	L'emottisi è emissione di sangue proveniente dalle vie digestive	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

540	Con il termine disfagia si intende:	difficoltà alla deglutizione	assunzione di quantità abnormi di cibo	l'avversione ai cibi	senso di fame insaziabile	INFERMIERISTICA GENERALE
541	La diarrea ad acqua di riso è un segno tipico:	Del colera	Della shigellosi	Della colite pseudomembranosa	Del tifo	INFERMIERISTICA GENERALE
542	L'istamina è immagazzinata nei granuli di:	Mastociti	Fibroblasti	Linfociti	Macrofagi	INFERMIERISTICA GENERALE
543	L'omeostasi è il mantenimento:	Dell'equilibrio biologico dell'organismo	Del circolo capillare	Della posizione corporea	Della stazione eretta	INFERMIERISTICA GENERALE
544	P.D.C.A. è l'acronimo che indica:	il ciclo di Deming	la pianificazione assistenziale	il ciclo formativo	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
545	Nella gradazione dei tumori il grado IV definisce i tumori costituiti da cellule:	Indifferenziate	Con differenziazione di medio grado	Il cui grado di differenziazione non è definibile	Molto differenziate	INFERMIERISTICA GENERALE
546	L'aumento della frequenza respiratoria si definisce come:	tachipnea	dispnea	iperpnea	polipnea	INFERMIERISTICA GENERALE
547	L'entità di un'emorragia digestiva si valuta mediante la diminuzione del valore ematico di:	Emoglobina	Ematocrito	Emazie	Piastrine	INFERMIERISTICA GENERALE
548	I seguenti sono tutti segni e sintomi dell'infezione di una ferita chirurgica, eccetto:	cute circostante la ferita fredda e pallida	secrezioni aumentate e purulente	aumento della tumefazione in sede di ferita	eventuale presenza di febbre	INFERMIERISTICA GENERALE
549	Il concetto di ambiente secondo il modello concettuale di F. Nightingale è:	inteso in senso globale	essenzialmente fisico	legato al ruolo dell'infermiere	essenzialmente psicosociale	INFERMIERISTICA GENERALE
550	Con il termine "spazio morto" si fa riferimento a:	Zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi	Zone cicatriziali dalla sensibilità limitata	Zone muscolari non attraversate da fasci nervosi	Parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti	INFERMIERISTICA GENERALE
551	Il più comune effetto di una dose tossica di paracetamolo è:	la necrosi epatocellulare	il sanguinamento gastrointestinale	l'agranulocitosi	l'iperpiressia	INFERMIERISTICA GENERALE
552	La sieroprofilassi:	Conferisce una immunità immediata ma temporanea	Conferisce una immunità naturale e attiva	Attiva una risposta immunitaria duratura nel tempo	In Italia è obbligatoria per patologie come il tetano	INFERMIERISTICA GENERALE
553	La parte del cuore che riceve il sangue dalla periferia è:	l'atrio destro	il ventricolo sinistro	l'atrio sinistro	il ventricolo destro	INFERMIERISTICA GENERALE
554	Quale tra questi ormoni è deputato al controllo dei meccanismi immunitari?	Timosina	Aldosterone	Glucagone	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
555	La chiusura di una ferita utilizzando mezzi di sutura è definita:	chiusura per prima intenzione	chiusura per granulazione	chiusura per emostasi	chiusura per seconda intenzione	INFERMIERISTICA GENERALE
556	Dove è tipicamente localizzato in sede, il dolore anginoso:	retrosternale	mesogastrico	emitorace destro	fosse iliaca sinistra	INFERMIERISTICA GENERALE
557	Il termine "anosmia" definisce:	Una riduzione o perdita dell'olfatto	Un'alterazione dell'osmolarità del sangue	Una riduzione o perdita del gusto	Una perdita temporanea del visus	INFERMIERISTICA GENERALE
558	Il modello concettuale delle attività di vita è stato elaborato da:	N.Roper	D. Orem	V. Henderson	F. Nightingale	INFERMIERISTICA GENERALE
559	La febbre remittente è un tipo di febbre in cui:	la temperatura subisce variazioni superiori o inferiori a 1°C senza però raggiungere la defervescenza	si alternano giorni di apiressia a giorni di febbre	la temperatura iniziale tende ad alzarsi al mattino fino al picco massimo nelle ore pomeridiane, per poi scendere e normalizzarsi nelle ore serali, fino al mattino seguente, quando comincerà ad alzarsi di nuovo	la temperatura si mantiene elevata con oscillazioni inferiori a 1°C	INFERMIERISTICA GENERALE
560	Gli indicatori della scala di Braden sono:	percezione sensoriale, umidità, attività motoria, nutrizione, frizione e scivolamento	secchezza cutanea, percezione sensoriale, stato funzionale, nutrizione, frizione e scivolamento	umidità, autonomia, nutrizione, stato funzionale, frizione e scivolamento	incontinenza, secchezza cutanea, umidità cutanea, frizione e scivolamento	INFERMIERISTICA GENERALE
561	Il valore di "cut off" in una scala di valutazione dell'assistenza è detto anche:	valore soglia	valore liminale	valore di specificità	valore massimale	INFERMIERISTICA GENERALE
562	L'effetto dromotropo negativo di un farmaco è la capacità di:	Ridurre la velocità di conduzione dei nodi senoatriale e atrioventricolare	Diminuire la frequenza cardiaca	Aumentare la forza contrattile del cuore	Aumentare la frequenza cardiaca	INFERMIERISTICA GENERALE
563	Quale tra le seguenti è la definizione corretta di bronchiectasie?	Dilatazioni abnormi ed irreversibili di un tratto dell'albero bronchiale	Dilatazioni reversibili di un tratto dell'albero bronchiale	Restringimenti irreversibili del lume dei bronchi	Di infezioni croniche o ricorrenti dell'apparato respiratorio	INFERMIERISTICA GENERALE
564	Gli scambi respiratori avvengono:	negli alveoli	nei bronchioli respiratori	nei bronchi	nella trachea	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

565	Lo sfintere pilorico è un anello muscolare che separa:	lo stomaco dall' intestino tenue	l'intestino tenue dal crasso	lo stomaco dall' intestino crasso	l'esofago dallo stomaco	INFERMIERISTICA GENERALE
566	I pazienti affetti da patologia cronica necessitano di:	informazioni, follow up regolari, sostegno non solo a livello personale ma anche dei caregiver	prestazioni specialistiche monoprofessionali	gestire solo le riacutizzazioni della patologia cronica	assistenza occasionale	INFERMIERISTICA GENERALE
567	In una persona disfagica, durante il pasto, è indicato controllare la comparsa di:	tosse	tachicardia	voce gorgogliante	pallore	INFERMIERISTICA GENERALE
568	E'/sono la causa più frequente di emorragia gastro-intestinale:	L'ulcera duodenale	La gastrite erosiva	Le varici esofagee	La gastrite atrofica	INFERMIERISTICA GENERALE
569	Le dimensioni del bracciale dello sfigmomanometro devono essere commisurate:	Alla costituzione fisica del paziente	Alla statura del paziente	Al sesso del paziente	Alla costituzione fisica del paziente	INFERMIERISTICA GENERALE
570	La scala di valutazione dell'indice di Brass è utilizzata per:	valutare l'indice di rischio di dimissione difficile	valutare la autonomia dello stato funzionale	tutte le altre risposte sono corrette	valutare il rischio di lesioni da pressione	INFERMIERISTICA GENERALE
571	Il ferro per via orale va assunto:	A stomaco pieno	Con molta acqua	Secondo le preferenze del paziente	Lontano dai pasti	INFERMIERISTICA GENERALE
572	L'aorta nasce:	dal ventricolo sinistro del cuore	dall'atrio sinistro del cuore	dal tronco dell'arteria polmonare	dal ventricolo destro del cuore	INFERMIERISTICA GENERALE
573	Le valvole a nido di rondine si trovano:	nelle vene	nell'aorta ascendente	tra atri e ventricoli	nelle arterie degli arti inferiori	INFERMIERISTICA GENERALE
574	In un test di screening la specificità è del 95%. La percentuale di falsi positivi che esso potrà mostrare:	Sarà del 5%	Dipenderà dall'accuratezza dell'esecuzione	Sarà del 95%	Sarà variabile in relazione alla patologia	INFERMIERISTICA GENERALE
575	L'aumento considerevole del marcatore CEA può essere indice della presenza di neoplasia:	Tutte le altre risposte sono corrette	All'intestino	Al polmone	Alla mammella	INFERMIERISTICA GENERALE
576	Il massaggio cardiaco esterno va continuato finché vi è:	ricomparsa del polso carotideo	ricomparsa del ritmo stabilmente sinusale	ricomparsa del respiro spontaneo	esecuzione della defibrillazione	INFERMIERISTICA GENERALE
577	Costituisce un rischio specifico da considerare in caso di fibrillazione atriale, anche se sottoposta a cardioversione.	Si tratta della tromboembolia arteriosa	Si tratta dell'ustione da scarica elettrica	Si tratta dell'arresto cardiaco improvviso	Si tratta dell'extrasistolia notturna	INFERMIERISTICA GENERALE
578	La peristalsi non è presente:	nella vena cava	nello stomaco	nell'esofago	nelle tube uterine	INFERMIERISTICA GENERALE
579	In riferimento alla cateterizzazione vescicale a permanenza, è indicato scegliere cateteri:	Vescicali in silicone o in siliconato in caso di cateterizzazioni per lunghi periodi	Vescicali a tre vie per eseguire lavaggi vescicali in casi di infezioni	Vescicali a tre vie per eseguire esami uro dinamici e colturali in sicurezza	Vescicali in lattice in caso di cateterizzazioni per lunghi periodi	INFERMIERISTICA GENERALE
580	Secondo la classificazione EPUAP/NPUAP in una lesione da decubito al 3° stadio si assiste a degenerazione e necrosi del tessuto:	Cutaneo e sottocutaneo fino alla fascia muscolare	Del tessuto cutaneo	Del tessuto cutaneo, sottocutaneo e di tutta la fascia muscolare	Muscolare e osseo	INFERMIERISTICA GENERALE
581	Il Barthel Index valuta:	Attività di vita quotidiana	Disturbi comportamentali	Stato cognitivo	Rischio di cadute	INFERMIERISTICA GENERALE
582	La scala di Braden per valutare il rischio di lesione da pressione, prende in considerazione:	Il grado di esposizione della pelle all'umidità	La presenza di disturbi psichiatrici maggiori	L'idratazione	Le abitudini urinarie	INFERMIERISTICA GENERALE
583	Quale tra queste scale di valutazione del dolore può essere utilizzata per la valutazione del dolore in un bambino di 6 anni?	Face pain scale	Scala analogico visiva	Verbal rating scale	Numeric rating scale	INFERMIERISTICA GENERALE
584	Il valore di Body Max Index pari a 28, corrisponde a:	sovrappeso	obeso	sottopeso	normopeso	INFERMIERISTICA GENERALE
585	Nella posizione di Sims la persona è posta sul fianco:	sinistro semiprona	destro prona	destro semiprona	sinistro prona	INFERMIERISTICA GENERALE
586	Il sollevatore è uno strumento:	meccanico che permette il sollevamento del paziente compromesso dal punto di vista motorio	meccanico che permette la rotazione del paziente dal letto alla sedia a rotelle	che facilita la rotazione del paziente che è in grado di stare in piedi ma ha difficoltà a fare piccoli passi	meccanico che permette all'infermiere di eseguire una manovra di spostamento del paziente in breve tempo	INFERMIERISTICA GENERALE
587	Nel respiro di Cheyne-Stokes:	la frequenza e la profondità respiratoria aumentano gradualmente al di sopra della norma, per poi decrescere fino ad arrivare ad una breve apnea	la frequenza e la profondità respiratoria risultano costantemente aumentati al di sopra della norma	gli atti respiratori sono poco profondi e vengono intervallati da periodi di apnea	la frequenza respiratoria è regolare per profondità ma ridotta per numero di atti al minuto	INFERMIERISTICA GENERALE
588	Se un paziente è sonnolento ma risvegliabile ed ha una reazione ritardata agli stimoli, si dice che è:	soporoso	comatoso	vigile	stuporoso	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

589	Per quale tipologia di pazienti è frequentemente utilizzata la rilevazione della temperatura corporea per via rettale?	Bambino	Anziano	Soggetto in coma	Non esistono controindicazioni a questo tipo di rilevazione	INFERMIERISTICA GENERALE
590	Se si chiede ad un paziente "Chi è l'attuale Presidente della Repubblica", quale tipo di accertamento si sta attuando?	Stato mentale	Dati culturali	Dati sensoriali	Dati generali	INFERMIERISTICA GENERALE
591	In caso di ematochezia occorre valutare le caratteristiche organolettiche di:	feci	espettorato	vomito	urina	INFERMIERISTICA GENERALE
592	Per quale motivo l'infermiere incoraggia il paziente a riferire la comparsa e la frequenza del vomito?	Per evitare complicanze quali disidratazione e squilibri elettrolitici	Per evitare faringiti	Per evitare congiuntiviti	Per evitare il rischio di caduta e di lesione	INFERMIERISTICA GENERALE
593	In caso di diaforesi eccessiva l'intervento PRIMARIO tra quelli elencati è:	aumentare l'introito di liquidi	effettuare l'igiene	diminuire l'introduzione di cibi ricchi di fibre	indossare indumenti di cotone	INFERMIERISTICA GENERALE
594	Qualora la tosse si accompagni ad espettorato è importante registrare la:	quantità e i cambiamenti delle caratteristiche delle secrezioni	comparsa di rossore al viso e alle estremità degli arti	presenza di incontinenza durante i colpi di tosse	difficoltà di assumere liquidi durante le ore notturne	INFERMIERISTICA GENERALE
595	Nel posizionamento del condom urinario l'infermiere deve avere l'accuratezza di:	posizionare senza stringere eccessivamente la fascetta adesiva	stringere la fascetta adesiva per evitare la perdita di urina	utilizzare il dispositivo esclusivamente per le persone con infezioni del tratto urinario	applicare il dispositivo esclusivamente in lattice	INFERMIERISTICA GENERALE
596	Indicare con chi si effettua la scelta dei pannoloni adatti per il tipo di incontinenza della persona assistita:	Con la persona stessa, cercando di ridurre l'impatto dell'incontinenza sulla qualità di vita	Con il medico curante responsabile della prescrizione	Con l'OSS per ridurre la quantità dei presidi utilizzabili	Con il familiare cercando la collaborazione del paziente	INFERMIERISTICA GENERALE
597	Durante l'esecuzione del prelievo venoso la pressione esercitata dal laccio emostatico deve essere:	moderata, pari o poco superiore a quella diastolica del paziente	moderata, pari o poco inferiore a quella sistolica del paziente	tale da non causare dolore eccessivo al paziente, superiore alla pressione sistolica	tale da non provocare fastidio eccessivo al paziente	INFERMIERISTICA GENERALE
598	Dovete eseguire un prelievo capillare per la determinazione della glicemia su sangue capillare, prima di pungere il polpastrello eseguite un lavaggio delle mani con:	acqua e sapone detergente e indossate i guanti puliti	soluzione idroalcolica e non indossate i guanti	soluzione alcolica e indossate i guanti sterili	acqua e sapone antisettico e indossate i guanti	INFERMIERISTICA GENERALE
599	L'isolamento protettivo consiste nella separazione da altri assistiti del paziente:	con neutropenia severa	per il periodo di contagiosità della malattia	per malattie infettive respiratorie	con modalità di isolamento a coorte	INFERMIERISTICA GENERALE
600	La modalità più efficace per interrompere la catena dell'infezione è:	il lavaggio delle mani	l'utilizzo dei guanti	l'uso di dispositivi di protezione individuale	l'uso dei disinfettanti	INFERMIERISTICA GENERALE
601	La flora batterica transitoria di solito:	è associata con le infezioni correlate alla pratica assistenziale	è associata ad infezioni delle vie urinarie e dell'apparato respiratorio	non è associata ad infezioni ma ha una funzione di antagonismo microbico	non è associata ad infezione ma sono i batteri acquisiti dall'operatore durante le manovre assistenziali	INFERMIERISTICA GENERALE
602	Durante la misurazione della pressione arteriosa, per quale motivo devo sorreggere il braccio del paziente?	Per inibire la contrazione isometrica muscolare	Per favorire la gittata cardiaca ed il volume di eiezione in aorta	Per migliorare il ritorno venoso al cuore	Per aumentare il comfort del paziente	INFERMIERISTICA GENERALE
603	Durante lo svuotamento del pappagallo del Sig L.S. l'infermiere osserva una variazione del colore delle urine. Tra i seguenti qual è il primo intervento che attua?	Effettua esame delle urine con striscia reagente	Applica un condom	Rileva la saturazione di ossigeno	Posiziona la traversa salvaletto	INFERMIERISTICA GENERALE
604	In caso di dolore, si possono riscontrare segni di aumento della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, della frequenza respiratoria, dilatazione delle pupille e diaforesi. Questo accade se si tratta di dolore:	acuto	che perdura da diversi giorni	cronico	trattato farmacologicamente	INFERMIERISTICA GENERALE
605	L'accertamento della signora Laura riporta frequente diuresi e incontinenza quando tossisce. Come indichereste questa condizione?	Incontinenza urinaria da stress	Incontinenza urinaria funzionale	Incontinenza urinaria da urgenza	Incontinenza urinaria riflessa	INFERMIERISTICA GENERALE
606	La scala di Conley è uno strumento utilizzato per valutare il rischio di caduta del paziente (età >= 65 anni), pertanto è una scala che:	aiuta a scegliere gli interventi preventivi	deve essere compilata dall'operatore socio-sanitario	consiglia gli interventi curativi	consiglia l'approccio diagnostico terapeutico al medico	INFERMIERISTICA GENERALE
607	Il signor G. di 70 anni è ricoverato in oncologia, è vigile, orientato e autosufficiente nelle attività di vita quotidiana. Presenta un problema di nutrizione inferiore al fabbisogno. Cosa consigliereste al signor G?	Consumare pasti piccoli e frequenti	Utilizzare spezie per migliorare il gusto e l'aroma dei cibi	Favorire l'assunzione di pasti caldi ad alto contenuto calorico	Effettuare spuntini con cracker negli intervalli tra un pasto e l'altro	INFERMIERISTICA GENERALE
608	Con il termine fecaloma si intendono feci:	dure, stipate nel retto che non si riescono a espellere	dure, stipate nel retto che vengono espulse con difficoltà	caprine che vengono espulse a seguito di somministrazione di un lassativo	di consistenza dura con presenza di strie sangue	INFERMIERISTICA GENERALE
609	Per raccogliere un campione di urina sterile nell'adulto è bene consigliare di:	eseguire l'igiene intima prima del prelievo e raccogliere l'urina del mitto intermedio	eseguire l'igiene intima dopo ogni minzione e prelevare un campione dal contenitore di raccolta	mescolare le urine nel contenitore delle urine delle 24 ore e prelevare un campione successivamente	urinare nella padella e prelevare un campione in una provetta sterile	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

610	Il signor G., presenta due apparecchi gessati a entrambi gli arti superiori. Dovete procedere con la rilevazione della frequenza cardiaca, quali sedi indagate:	Poplitea	Ulnare	Carotidea	Femorale	INFERMIERISTICA GENERALE
611	La signora G., portatrice di catetere vescicale, vi chiama per comunicarvi che sente la necessità di urinare. Come procedete?	Controllate la presenza di globo vescicale	Controllate la diuresi delle ultime 24 ore	Controllate che ci sia presenza di urine nella sacca di raccolta	La rassicurate che avendo il catetere vescicale ciò non è possibile, è solo una sensazione	INFERMIERISTICA GENERALE
612	Una lesione da pressione classificata al secondo stadio (NPUAP) è caratterizzata da:	parziale perdita di spessore cutaneo	perdita completa dello strato cutaneo	eritema persistente non sbiancabile	perdita piena di spessore tissutale	INFERMIERISTICA GENERALE
613	State assistendo il signor R. che è stato sottoposto a intervento chirurgico per la sintesi di frattura del femore conseguente a caduta accidentale. Dovendo eseguire la medicazione della ferita chirurgica con tecnica asettica per la detersione del sito utilizzate:	soluzione fisiologica	soluzione antisettica a base di iodio	soluzione a base di clorexidina	soluzione fisiologica e acqua ossigenata	INFERMIERISTICA GENERALE
614	Stai effettuando l'igiene intima-perineale a letto al signor G. Al termine dell'operazione ti assicuri che il prepuzio sia correttamente posizionato sul glande perché non vuoi causare:	edema del glande	imbarazzo della persona	difficoltà nella minzione	orchite	INFERMIERISTICA GENERALE
615	Nella valutazione del dolore la scala VAS è rappresentata da una retta con:	due estremità che corrispondono a "nessun dolore" e "massimo dolore possibile"	aree di diverso colore, dove l'intensità del colore corrisponde all'intensità del dolore	una serie di numeri progressivi, da 1 a 10, dove 1 corrisponde a nessun dolore e 10 al massimo dolore	la presenza di aggettivi che quantificano il dolore da "nessuno" a "molto forte"	INFERMIERISTICA GENERALE
616	Dovete eseguire un prelievo venoso alla signora Francesca, la quale presenta linfostasi al braccio destro. Francesca è mancina. Quale sede scegliereste per effettuare il prelievo?	Il braccio sinistro	Il braccio destro senza l'utilizzo del laccio emostatico	La mano destra senza l'utilizzo del laccio emostatico	Optate per un prelievo capillare	INFERMIERISTICA GENERALE
617	La scala di Norton prende in considerazione i fattori di seguito elencati:	Mobilità, deambulazione, incontinenza, livello di autonomia nelle ADL, condizioni mentali	Incontinenza, condizioni psichiche, mobilità, allettamento, integrità cutanea	Condizioni mentali, condizioni fisiche, incontinenza, alimentazione, mobilità	Incontinenza, mobilità, condizioni mentali, allettamento, nutrizione	INFERMIERISTICA GENERALE
618	Le normali sedi di rilevazione della frequenza cardiaca di un adulto sono:	Temporale, Carotideo, Brachiale, Radiale, Ulnare, Femorale, Tibiale posteriore, Dorsale del piede	Temporale, Carotideo, Brachiale, Radiale. Femorale, posteriore del piede	Temporale, Carotideo, Brachiale, Radiale, Ulnare, Femorale, posteriore del piede	Temporale, Carotideo, Brachiale, Radiale, Femorale	INFERMIERISTICA GENERALE
619	Per disfagia esofagea si intende:	rallentamento del passaggio del cibo dall'esofago allo stomaco	difficoltà ad iniziare la deglutizione	incapacità di trasferire il cibo dalla cavità orale all'esofago	difficoltà nella digestione e reflusso esofageo	INFERMIERISTICA GENERALE
620	Con il termine "melena" si intende l'emissione dal retto di feci:	Nere, aspetto picco e maleodoranti	Chiare e maleodoranti	Con striature di sangue rosso vivo	Con intenso sangue rosso vivo	INFERMIERISTICA GENERALE
621	Le principali complicanze che possono verificarsi durante la nutrizione entrale con sondino naso gastrico sono:	Vomito, diarrea, stipsi e reflusso gastro-esofageo	Vomito, malnutrizione glucidico calorica, diarrea e cacchessia	Stipsi, ileo paralitico, malnutrizione proteica calorica e vomito	Diarrea, malnutrizione proteica calorica, stipsi e disfagia	INFERMIERISTICA GENERALE
622	Nell'accertamento infermieristico del dolore, l'infermiere può utilizzare le seguenti scale:	VAS, VNS, CHEOPS	GCS, GPCS, AIS	TINETTI, BRASS, BRISTOL	BARTHEL, GOS, KATS	INFERMIERISTICA GENERALE
623	La Glasgow Coma Scale (GCS) è una scala basata su tre parametri:	Apertura degli occhi, risposta verbale, risposta motoria	Apertura della bocca, risposta motoria, risposta palpebrale	Apertura degli occhi, risposta motoria, risposta non verbale	Apertura degli occhi, risposta verbale, risposta corneale	INFERMIERISTICA GENERALE
624	Nell'assistenza al pasto del Sig. Aldo, affetto da disfagia, quale comportamento messo in atto dall'Infermiere NON è da ritenersi corretto?	Conversare con l'assistito e cercare di distrarlo	Incoraggiare i colpi di tosse e la deglutizione della saliva dopo la tosse	Introdurre una quantità di cibo equivalente a un cucchiaino da caffè per volta	Ispezionare il cavo orale regolarmente e se si rileva la presenza di residui alimentari rimuoverli	INFERMIERISTICA GENERALE
625	I farmaci stupefacenti in reparto devono essere conservati:	In una cassetta con serratura, in armadi chiusi a chiave	Nell'armadio dei farmaci	Nello studio della caposala	Nello studio medico, in un armadio con etichetta identificativa	INFERMIERISTICA GENERALE
626	Nell'assistere una persona cui si somministra l'alimentazione tramite PEG, per prevenire la complicanza "aspirazione", l'infermiere misura il ristagno gastrico:	Prima dell'inizio dell'alimentazione, posizionando la persona a 30 - 45 GRADI	Prima dell'inizio dell'alimentazione, posizionando la persona in decubito prono	Al termine dell'alimentazione, posizionando la persona supina	Durante l'alimentazione, posizionando la persona supina ogni 20 minuti	INFERMIERISTICA GENERALE
627	Nella diarrea severa la dieta deve essere:	Povera di scorie, di cibi grassi e derivati del latte e di bevande nervine	Ipoproteica, ricca di fibre e derivati del latte, ma priva di grassi	Iposodica e ricca di frutta acida e astringente (ad es. succo di limone)	Povera di sodio e magnesio, ricca di legumi	INFERMIERISTICA GENERALE
628	Nella fase preoperatoria, l'infermiere deve accertarsi, prima della somministrazione di premedicazioni psicoattive, che il modulo di consenso sia firmato. In quali delle circostanze indicate, il consenso informato è necessario?	Tutte le altre risposte sono corrette	Procedure invasive, come un'incisione chirurgica, una biopsia o una paracentesi	Procedure non chirurgiche, come un'arteriografia, che determini un rischio medio per la persona	Procedure che utilizzano radiazioni	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

629	Quali consigli si forniscono al paziente portatore di fistola artero/venosa per dialisi, al fine di promuoverne il corretto funzionamento?	Sul braccio in cui è stata confezionata la fistola, non si misura la Pressione Arteriosa e non si applicano lacci emostatici	L'accesso può essere utilizzato routinariamente per i prelievi ematici (venosi e arteriosi) e per la rilevazione della pressione arteriosa	Il braccio su cui è allestita la fistola è fasciato stretto per proteggerlo da urti e tagli e può essere utilizzato routinariamente per i prelievi arteriosi	La fistola non richiede particolare protezione. Si può consigliare al paziente di eseguire bagni molto caldi per vasodilatare la fistola	INFERMIERISTICA GENERALE
630	Secondo le "raccomandazioni del ministero della salute per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO", di chi deve essere la firma per le prove crociate?	Di chi effettua il prelievo	Del medico richiedente	Del Coordinatore Infermieristico dipartimentale	Del direttore responsabile del servizio	INFERMIERISTICA GENERALE
631	Nell'assistere la persona con scompenso cardiaco, nel piano educativo alla dimissione, rispetto alla terapia farmacologica, l'infermiere tratterà i seguenti argomenti:	Gli effetti dei farmaci, la dose e l'orario di somministrazione, l'autogestione, i segni di tossicità, gli effetti collaterali e avversi, cosa fare in caso si dimentichi l'assunzione del farmaco	Come assumere tutti farmaci prescritti in una sola somministrazione giornaliera, l'autogestione della malattia	Come modificare il dosaggio dei farmaci cardioattivi secondo le proprie percezioni	Gli effetti collaterali dei farmaci autosomministrati per via endovenosa, l'autogestione della malattia	INFERMIERISTICA GENERALE
632	Per valutare il rischio di cadute di un paziente, l'infermiere utilizza la scala:	Tinetti	Indice di Barthel	Measure FIM	CIRS	INFERMIERISTICA GENERALE
633	La sostituzione delle linee infusionali (deflussori e raccordi) su Catetere Venoso Periferico e su Catetere Venoso Centrale deve essere effettuata:	ogni 96 ore in caso di infusioni continue non contenenti lipidi, sangue o derivati	ogni 6 ore in caso di infusioni continue contenenti lipidi	a discrezione dell'infermiere che si sta occupando della gestione del catetere vascolare dopo aver sentito il parere medico	ogni ora in caso di infusione di sangue ed emoderivati	INFERMIERISTICA GENERALE
634	Le principali complicanze che possono verificarsi durante la nutrizione enterale con sondino naso gastrico sono:	Vomito, diarrea, stipsi, nausea, aspirazione	Vomito, cachessia, reflusso gastro-esofageo	Vomito, diarrea, ileo paralitico, malnutrizione glucidico calorica	Vomito, diarrea, stipsi, malnutrizione proteica calorica	INFERMIERISTICA GENERALE
635	Le complicanze immediate dell'aspirazione delle secrezioni nasoro-tracheali sono:	Ipossiemia, ipotensione, aritmie	Polmonite, bradicardia, ipotensione	Atelettasia, ipertensione, dolore precordiale	Tracheite, ipertensione, costipazione	INFERMIERISTICA GENERALE
636	Nell'assistenza ad una persona sottoposta a rachicentesi occorre:	consigliare l'assunzione di liquidi per ridurre il rischio di emicrania post-procedurale	consigliare rapidamente la ripresa dell'alimentazione	consigliare di rimanere a letto almeno per 48 ore	consigliare di non assumere liquidi per ridurre il rischio di tenesmo post-procedurale	INFERMIERISTICA GENERALE
637	Quali sono gli interventi che il paziente con Insufficienza Renale Cronica dovrebbe eseguire al fine di evitare il sovraccarico di liquidi?	Controlli giornalieri del peso, della Pressione Arteriosa (PA), del turgore delle giugulari, restrizione idrica, igiene del cavo orale	Controlli giornaliero del peso, della Pressione venosa., della circonferenza addominale	Controlli settimanali del peso, dell'alvo e della circonferenza addominale	Controlli giornalieri del peso, della P.A., del turgore delle giugulari, iperidratazione, igiene del cavo orale	INFERMIERISTICA GENERALE
638	La maschera facciale per la somministrazione di ossigeno è controindicata:	nelle persone con grave distress respiratorio e con ritenzione di anidride carbonica	per concentrazioni di ossigeno dal 35% al 45%	nell'ossigeno terapia a breve termine	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
639	Prima di eseguire un prelievo ematico dal catetere venoso centrale, l'infermiere deve eseguire:	Lavaggio antisettico delle mani in qualsiasi caso	Lavaggio sociale delle mani se Catetere Venoso Centrale tunnellizzato	Frizione delle mani con base alcolica se il paziente è a domicilio	Lavaggio chirurgico delle mani se il paziente è in aplasia midollare	INFERMIERISTICA GENERALE
640	Per poter valutare se la persona, in prima giornata postoperatoria, può essere mobilizzata precocemente occorre considerare:	il tipo di intervento, le condizioni dell'assistito, il tipo di anestesia	solo la presenza di drenaggi e di terapia antalgica	le preferenze dell'assistito, il colore dei liquidi raccolti nei drenaggi	le condizioni della ferita, la volontà del paziente	INFERMIERISTICA GENERALE
641	Qualora fosse necessario posizionare il SNG (sondino nasogastrico) e/o il CV (catetere vescicale) per la durata dell'intervento, si procede alla loro applicazione:	in seguito alla somministrazione dell'anestesia	all'inizio del ricovero	dipende dalla tecnica chirurgica utilizzata durante l'intervento e dalla disponibilità di personale in reparto o in sala operatoria	prima della somministrazione dell'anestesia per ottenere il coinvolgimento della persona assistita	INFERMIERISTICA GENERALE
642	Per consentire l'identificazione precoce di una reazione trasfusionale:	la trasfusione deve iniziare lentamente (circa 2 ml/min) e il paziente deve essere controllato attentamente i primi 15 min	occorre regolare la velocità d'infusione e monitorare la comparsa di effetti collaterali dopo 60 min	la trasfusione deve essere effettuata nel più breve tempo possibile (circa 20 min)	la trasfusione deve iniziare ad una velocità di circa 30 ml/min e il paziente deve essere controllato attentamente i primi 15 min	INFERMIERISTICA GENERALE
643	E' necessario valutare il deficit cognitivo del signor Antonio. Lo strumento che può essere utilizzato è:	MMSE	NIHSS	CPSS	MNA	INFERMIERISTICA GENERALE
644	Nel paziente portatore di ileostomia, l'emissione di feci molto liquide può portare alla formazione di calcoli urinari, disidratazione e deficit di elettroliti. Quali segni e sintomi si potrebbero riscontrare in questo caso?	Dolore intenso all'addome inferiore, ematuria, tachicardia, cute secca	Dolore intenso all'addome superiore, pollachiuria, tachicardia, cute secca, ritenzione urinaria	Dolore diffuso all'addome, cute sudata, poliuria, vertigini	Sudorazione profusa, bradicardia, confusione mentale	INFERMIERISTICA GENERALE
645	A una persona anziana in trattamento con farmaci diuretici e senza restrizioni dietetiche, sono consigliabili alimenti:	Ricchi di potassio	Poveri di potassio	Poveri di carboidrati	Poveri di proteine	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

646	Quali tra quelli segnalati, sono segni e sintomi di tamponamento cardiaco che l'infermiere deve saper riconoscere?	Aumento PVC, distensione vene giugulari, caduta PA, tachipnea e polso paradossale, oliguria	Diminuzione PVC, aumento PA, tachipnea, tachicardia, diaforesi, oliguria	Tosse, aumento PA, bradipnea e polso paradossale, poliuria	Diminuzione della pressione venosa centrale (PVC), caduta della pressione arteriosa (PA), bradipnea, diaforesi e polso paradossale, anuria	INFERMIERISTICA GENERALE
647	Durante il trattamento radioterapico quali sono i disturbi che insorgono generalmente nei pazienti indipendentemente dal distretto trattato?	Affaticamento e perdita dell'appetito	Nausea e vomito biliare	Mucositi	Disgeusia	INFERMIERISTICA GENERALE
648	Nell'aspirazione delle secrezioni naso-oro tracheale la pre-ossigenazione va effettuata:	Nei pazienti con documentata desaturazione	Nei pazienti in cui lo stimolo del respiro dipende dall'ipossia (BPCO)	Nei pazienti che assumono broncodilatatori e cardiocinetici	Sempre	INFERMIERISTICA GENERALE
649	In una persona sottoposta a domicilio ad ossigeno terapia a lungo termine, quali interventi infermieristici specifici occorre pianificare?	Educare la persona alla cura dell'igiene orale e ad un adeguato apporto di acqua	Educare la persona alla cura dell'igiene personale e ad un adeguato apporto di vitamine	Educare la persona ad assumere molto sale alimentare per evitare la disidratazione	Educare la persona a sostituire i presidi almeno due volte al giorno	INFERMIERISTICA GENERALE
650	Un paziente con un'emorragia postoperatoria in atto manifesta dei segni e dei sintomi di ipovolemia. Quali tra i seguenti segni e sintomi l'infermiere deve ricercare?	Tachipnea, tachicardia, ipotensione e oliguria	Polso tachicardico, cute secca, viso arrossato e tachipnea	Ipotensione posturale, occhi infossati, debolezza e viso arrossato	Confusione mentale, secchezza delle fauci, insonnia e irritabilità	INFERMIERISTICA GENERALE
651	Gli interventi più importanti di riduzione di stasi venosa agli arti inferiori e/o per l'incremento del ritorno venoso sono: (indicare la risposta ERRATA)	Posizionamento con le gambe giù dal letto	Compressione graduata pneumatica intermittente o con apparecchi ad impulsi per i piedi	Posizionamento di calze elastiche lunghe a compressione graduata	Esecuzione di esercizi agli arti inferiori e deambulazione precoce	INFERMIERISTICA GENERALE
652	Nel prelievo per emocoltura, con sistema chiuso Vacutainer, occorre riempire:	Prima il flacone per aerobi e poi quello per anaerobi	Per primo il flacone per cui è stata effettuata la richiesta dell'esame	E' indifferente quale flacone riempire per primo, l'importante è segnalarlo	Prima il flacone per anaerobi e poi quello per aerobi	INFERMIERISTICA GENERALE
653	In previsione dell'intervento chirurgico gli elementi del consenso informato sono rappresentati da:	Informazione, comprensione, volontarietà	Consenso del medico curante, accettazione dell'anestesia, consenso agli esami del pre - ricovero e consenso alla preparazione del sito chirurgico	Presenza visione dei presidi, comprensione del tipo di anestesia, competenza e consenso alla tricotomia	Scelta del ricovero e consenso del parente	INFERMIERISTICA GENERALE
654	Devi recarti da un paziente posto in isolamento per Tubercolosi per rilevare la pressione arteriosa. Prima della procedura:	Esegui il lavaggio sociale delle mani o la frizione delle mani a base alcolica	Non è necessario lavarsi le mani in quanto è una procedura non invasiva	Esegui il lavaggio chirurgico delle mani	Per evitare il rischio di contagio, la rilevazione della Pressione Arteriosa sarà esclusivamente elettronica	INFERMIERISTICA GENERALE
655	Nella gestione del drenaggio pleurico, l'infermiere deve:	assicurarsi che i tubi siano pervi, controllare il materiale drenato, mantenere il sistema al di sotto del torace della persona	assicurarsi che il sistema sia aperto durante le manovre di riabilitazione respiratoria e sospendere l'aspirazione centralizzata	assicurarsi che tutto il sistema sia collegato all'aspirazione centralizzata, mantenere il sistema al di sopra del torace della persona	assicurarsi che tutti i tubi siano pervi, chiudere il drenaggio toracico e mantenerlo al di sopra del torace della persona	INFERMIERISTICA GENERALE
656	Quale tra le seguenti è da ritenere un'indicazione al confezionamento di una PEG?	Necessità di nutrizione enterale superiore alle quattro (4) settimane	Necessità di nutrizione enterale forzata superiore a cinque (5) giorni	Necessità di correggere squilibri idro-elettrolitici	Necessità di una dieta ipercalorica	INFERMIERISTICA GENERALE
657	Per prevenire sintomatologia gastro-intestinale in un paziente con nutrizione enterale si deve:	Somministrare la formula a temperatura ambiente	Somministrare la formula a una temperatura compresa tra i -4° e -8°C	Aumentare la frequenza dei lavaggi del sondino	Aumentare il volume di infusione formula	INFERMIERISTICA GENERALE
658	Il breakthrough pain o dolore episodico, in letteratura viene descritto con tre sottotipi (identificare la risposta sbagliata):	Dolore acuto	Dolore incidentale correlato a fattori precipitanti	Dolore spontaneo	Dolore di fine dose	INFERMIERISTICA GENERALE
659	Nello strumento per la misurazione del dolore Pain Assessment in Advanced Dementia Scale (PAINAD), di quale comportamento non viene richiesta la valutazione:	Cambiamenti nelle attività usuali	Espressioni facciali	Livello di consolazione del paziente	Respirazione	INFERMIERISTICA GENERALE
660	Non tutti i farmaci per os (= bocca) possono essere frantumati o divisi. Quali tra le seguenti compresse possono essere frantumate o divise:	Compresse con linea di pre-rottura	Compresse enteriche o formulazioni retard	Compresse a rilascio temporizzato	Compresse gastroresistenti e/o solubili solo in ambiente alcalino intestinale	INFERMIERISTICA GENERALE
661	Tra le seguenti sedi per l'iniezione intramuscolare quale permette di iniettare un quantitativo massimo di solo 1-2 ml:	Delfoidea	Dorsoglutea	Vastolaterale	Ventroglutea	INFERMIERISTICA GENERALE
662	Quale tra le seguenti NON è una strategia per la prevenzione delle infezioni del tratto urinario associate a catetere (CA-UTI):	Clampare il catetere prima della rimozione ed eseguire la ginnastica vescicale	Evitare l'esecuzione di irrigazioni vescicali	Evitare movimenti o trazioni uretrali tramite fissaggio del catetere alla coscia del paziente	Mantenere il sistema di drenaggio a circuito chiuso e non scollegare mai il catetere dal sistema di drenaggio	INFERMIERISTICA GENERALE
663	Ad un paziente con urostomia, quale tra le seguenti indicazioni dietetiche è consigliabile:	Bere almeno 2 litri di acqua al giorno	Evitare di assumere frutta e verdura	Assumere cibi ricchi di spezie e sale	Assumere cibi che contengono poca fibra, ma molti legumi	INFERMIERISTICA GENERALE
664	Rispetto a quale tipo di stomia le feci appaiono più formate e le defecazioni sono più regolari:	Sigmoidostomia	Ciecostomia	Ileostomia	Trasversostomia	INFERMIERISTICA GENERALE
665	Al fine di prevenire le infezioni del sito chirurgico il drenaggio deve:	Rimanere chiuso e unidirezionale	Essere dotato di un sistema aspirante	Creare una pressione positiva che assicura la raccolta del drenato senza che si contaminino	Rimanere aperto e rimosso più tardi possibile	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

666	La sede principale di trasformazione dei farmaci è il:	fegato	cuore	polmone	rene	INFERMIERISTICA GENERALE
667	L'uso di ossigenoterapia iperbarica è indispensabile:	nelle embolie gassose	nell' infarto del miocardio	nella polmonite	nell'asma	INFERMIERISTICA GENERALE
668	Il massaggio cardiaco esterno si effettua:	sulla metà inferiore dello sterno	sulla metà superiore dello sterno	a livello dell'emitorace sinistro	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
669	Quale organo viene maggiormente colpito dopo l'impiego di emocomponenti?	Polmone	Reni	Cervello	Fegato	INFERMIERISTICA GENERALE
670	Nella misurazione della temperatura timpanica, qual'è la variabile che non può modificare l'attendibilità del risultato?	Ambiente esterno molto freddo	Presenza di cerume	Nessuna delle variabili presenti nelle altre opzioni di risposta modifica il risultato della misurazione della temperatura timpanica	Ambiente esterno molto caldo	INFERMIERISTICA GENERALE
671	Il glucagone iniettabile deve essere somministrato nei pazienti con:	Ipoglicemia grave, in stato di incoscienza	Ipoglicemia superiore a 200 mg/dl, in stato di incoscienza	Diabete tipo 1, con glicemia inferiore a 80 mg/dl	Ipoglicemia superiore a 300 mg/dl, indipendentemente dallo stato di coscienza	INFERMIERISTICA GENERALE
672	In caso di liberazione inefficace delle vie aeree correlate ad una aumentata produzione di muco e secrezioni dense, è necessario:	Insegnare esercizi di respirazione profonda e tosse efficace	Somministrare per via endovenosa farmaci antibiotici ad ampio spettro	Ridurre al minimo il tasso di umidità ambientale	Far assumere un litro di acqua al giorno	INFERMIERISTICA GENERALE
673	La produttività può essere definita come:	Il risultato sia della razionalizzazione e dell'automazione del lavoro, che della scelta di un'organizzazione operativo-funzionale, di buona distribuzione di responsabilità e di opportune articolazioni di controllo	Il risultato di una maggior produzione in presenza di modifiche dei contratti collettivi di lavoro con prolungamento degli orari lavorativi	Il rapporto fra il costo annuo di funzionamento di una struttura e la qualità del servizio che produce	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
674	Il pioglitazone:	È un insulino-sensibilizzante per pazienti diabetici tipo2	Nessuna delle altre risposte è corretta	Non può essere associato a metformina e sulfaniluree	Non è somministrabile per via orale	INFERMIERISTICA GENERALE
675	La medicazione idrocolloidale:	Se nella ferita sono presenti microrganismi, questo tipo di medicazione può facilitarne la crescita	Può rimanere in sito per non più di due giorni e non si modella facilmente né alla ferita né alla zona del corpo interessata	Nessuna delle altre risposte è corretta	Aderisce alla superficie della ferita	INFERMIERISTICA GENERALE
676	È nota come morbo della mucca pazza:	Bse	Streptococcus suis	Trichinellosi	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
677	La Tachicardia sopraventricolare:	Non è immediatamente pericolosa per la vita, ma può influire sulla qualità di vita e dovrebbe essere valutata	Sono battiti cardiaci aggiuntivi occasionali, che possono originare dagli atri e a volte anche dai ventricoli	Nessuna delle altre risposte è corretta	È una situazione di emergenza perché porta nel breve a un arresto cardiovascolare	INFERMIERISTICA GENERALE
678	Le Extrasistoli:	Sono battiti cardiaci aggiuntivi occasionali, che possono originare dagli atri e a volte anche dai ventricoli	Si manifestano con un ritmo cardiaco rallentato	Si manifestano con un ritmo cardiaco rapido che spesso si manifesta sotto forma di crisi, con palpitazioni o battiti molto accelerati	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
679	Quale di queste affermazioni sul glicogeno è falsa?	Non può essere somministrato per via parenterale	È somministrata nelle crisi ipoglicemiche	Nessuna delle altre risposte è corretta	È sintetizzato tramite la tecnica del DNA ricombinante	INFERMIERISTICA GENERALE
680	In caso di rimozione accidentale della PEG (gastrostomia percutanea endoscopica) l'infermiere deve:	Mantenere pervio lo stoma applicando una sonda tipo Foley del calibro più simile a quello della sonda PEG e avvisare il medico di riferimento	Applicare una medicazione a piatto e inviare immediatamente l'assistito in pronto soccorso	Reinserire la stessa sonda entro 5/6 ore avendo cura di gonfiare bene il palloncino di ancoraggio	Applicare una medicazione a piatto e inviare l'assistito al servizio di endoscopia	INFERMIERISTICA GENERALE
681	La principale fra le iniziali manifestazioni della sindrome nefrosica è:	La proteinuria massiva	L'incremento dell'azoto ureico	L'ematuria microscopica o macroscopica	L'ipertensione arteriosa	INFERMIERISTICA GENERALE
682	In presenza di nitriti nelle urine, è opportuno eseguire:	Urinocoltura	Esame citologico delle urine	Raccolta delle urine delle 24 ore	Campione di urine standard	INFERMIERISTICA GENERALE
683	Quale tra i seguenti segni e sintomi non è tipico delle infezioni delle vie urinarie superiori?	Cefalea	Stranguria	Pollachiuria	Febbre	INFERMIERISTICA GENERALE
684	Per assistiti sottoposti a clistere evacuativo che non tollerano elevati volumi di liquidi, è opportuno utilizzare:	Soluzione ipertonica	Acqua di rubinetto	Soluzione fisiologica	Soluzione carminativa	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

685	Riguardo l'assistenza nella cura di sé di una persona che presenta ulcere degli arti inferiori, indicare la corretta sequenza di vero (V) e falso (F) per le seguenti affermazioni: - Valutare e registrare le caratteristiche dell'ulcera prima degli interventi assistenziali - L'irrigazione dell'ulcera, quando necessaria, può essere effettuata con acqua di rubinetto - L'asepsi non è necessaria - Le ulcere possono essere arteriose, diabetiche, reumatoidi o maligne.	V,V,V,V	V, F, V,V	V, F,F,V	F,F,F,F	INFERMIERISTICA GENERALE
686	Quali indicatori prende in esame la scala di Braden per la valutazione del rischio di ulcere da pressione?	Percezione sensoriale, umidità, attività, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento	Percezione sensoriale, esposizione all'umidità, grado di attività fisica, assunzione usuale di cibo	Corporatura, aspetto della cute, sesso ed età, continenza, mobilità, tipo di nutrizione, particolari elementi di rischio	Condizioni fisiche, stato mentale, deambulazione, mobilitazione, incontinenza	INFERMIERISTICA GENERALE
687	In caso di caduta accidentale di un anziano, l'infermiere:	Valuta lo stato di coscienza ed effettua una valutazione testa piedi	Alza l'anziano e chiede come si sente per accertarsi delle sue condizioni	Mette l'anziano in posizione laterale di sicurezza	Allerta sempre la rete dell'emergenza urgenza	INFERMIERISTICA GENERALE
688	Quanti ml di farmaco si possono somministrare al massimo con una iniezione intradermica?	2,5 ml	0,5 ml	3 ml	1 ml	INFERMIERISTICA GENERALE
689	L'alimentazione in un paziente disabile:	È correlata ai fabbisogni nutrizionali dell'ospite	Necessità sempre del coinvolgimento dell'ospite nella preparazione	Necessità di tempi stabiliti e precisi	Necessità di attenzioni come nella primissima infanzia	INFERMIERISTICA GENERALE
690	Quale tra le seguenti è un'alterazione della minzione?	Disuria	Oliguria	Poliuria	Anuria	INFERMIERISTICA GENERALE
691	Nelle manovre di primo soccorso, qual è la sequenza della valutazione del soggetto incosciente?	Coscienza - vie aeree - respirazione - circolazione	Circolazione - coscienza- respiro - traumi del rachide	Vie aeree - respirazione - circolazione- coscienza	Coscienza- circolazione - vie aeree - respirazione	INFERMIERISTICA GENERALE
692	L'ematemesi è:	Emissione di sangue attraverso la bocca proveniente dalle vie digerenti	Emissione di sangue attraverso la bocca proveniente dalla trachea	Emissione dalla bocca di vomito fecaloide	Emissione di espettorato denso attraverso la bocca proveniente dalle vie respiratorie	INFERMIERISTICA GENERALE
693	La contenzione fisica:	E' un trattamento terapeutico a cui ricorrere in ultima istanza	E' un trattamento riabilitativo che limita le scelte decisionali dell'assistito	Tutte le alternative sono corrette	E' un trattamento preventivo, che mira a limitare i danni potenzialmente arrecabili ad altri da parte dell'assistito	INFERMIERISTICA GENERALE
694	Il bilancio idrico si fa:	Per calcolare la quantità dei liquidi introdotti ed espulsi nelle 24 ore	Per calcolare la quantità di liquidi introdotti per via orale e parenterale	Esclusivamente per valutare la diuresi	Per valutare lo stato di idratazione del paziente	INFERMIERISTICA GENERALE
695	I seguenti sono tutti fattori di rischio connessi alla disidratazione, tranne uno: quale?	Ipercolesterolemia	Iperpiressia	Ridotta mobilità e ridotta abilità funzionale	Deterioramento cognitivo	INFERMIERISTICA GENERALE
696	Le parestesie sono:	Sensazioni abnormi in assenza di stimolazione periferica generalmente sotto forma di formicolio o di punture	Un sintomo caratterizzato da assenza della contrazione riflessa	Contrazioni rapide di un gruppo di fibre muscolari, causati dall'attività spontanea di una o diverse unità motorie conseguenti a danni di vario tipo del motoneurone spinale	Un sintomo che esprime la difficoltà al rilassamento muscolare dopo la contrazione volontaria	INFERMIERISTICA GENERALE
697	Avendo a disposizione compresse da 0,25 mg, quante ne devono essere somministrate per ottenere un dosaggio da 0,125 mg?	Mezza	Una e mezza	3/4	Una	INFERMIERISTICA GENERALE
698	Con il termine ittero si intende l'aumento della concentrazione di:	Bilirubina nel sangue al quale consegue un caratteristico sintomo osservabile che è la colorazione giallastra delle sclere e/o dell'intera superficie cutanea	Urea nel sangue al quale consegue un caratteristico sintomo osservabile che è il prurito	Ammonio nel sangue al quale consegue un caratteristico stato di agitazione psicomotoria	Colesterolo nel sangue al quale consegue un caratteristico sintomo osservabile che è la colorazione giallastra delle sclere e/o dell'intera superficie cutanea	INFERMIERISTICA GENERALE
699	Nell'ipertensione ortostatica si osserva la riduzione della pressione sistolica, rispetto alla pressione in posizione supina o seduta, di almeno:	30 mmHg	10 mmHg	20 mmHg	40 mmHg	INFERMIERISTICA GENERALE
700	Indicare quale tra le seguenti non è una corretta azione da compiere, in caso di procedura di massaggio cardiaco esterno con un solo soccorritore.	Posizionare il paziente supino su di una superficie morbida	Nessuna delle altre risposte è corretta	Se l'individuo non risponde, seguire i protocolli per la gestione delle emergenze previsti dalla struttura. Se è presente una persona, mandarla a chiedere aiuto	Assicurare un'adeguata ventilazione	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

701	Quale tra le seguenti non rappresenta una possibile complicanza iniziale di una frattura?	Necrosi vascolare dell'osso	Sindrome compartimentale	Embolia grassosa	CID	INFERMIERISTICA GENERALE
702	Le seguenti sono tutte attenzioni che l'infermiere deve rivolgere all'assistito con disfagia, tranne una: quale?	Posizionamento del collare cervicale durante l'aiuto all'assunzione dei pasti	Effettuare l'igiene del cavo orale	Dopo il pasto, mantenere l'assistito in ortostatismo per 30-60 minuti	Somministrare la terapia farmacologica in corrispondenza dei pasti	INFERMIERISTICA GENERALE
703	Quali tra i seguenti è un sintomo dell'infiammazione:	Tutti quanti	Calore	Dolore	Rossore	INFERMIERISTICA GENERALE
704	La scala di Braden:	È uno strumento di valutazione del rischio lesioni da pressione	È uno strumento di valutazione della prognosi in pazienti gravemente debilitati	È uno strumento di valutazione del rischio cadute nell'anziano	È uno strumento di valutazione del rischio di cadute	INFERMIERISTICA GENERALE
705	Con riferimento alle lesioni cutanee secondarie, la crosta:	È la conseguenza di una lesione cutanea e del suo processo di riparazione, per il quale non andrebbe tolta troppo velocemente	È una zona della pelle che si assottiglia e in cui si ha perdita di elasticità e di colore	Nessuna delle altre risposte è corretta	È il risultato di un ammassamento di cellule morte che si sfaldano e che spesso lasciano sotto di sé uno strato eritematoso irritato tipico della psoriasi o della forfora	INFERMIERISTICA GENERALE
706	Qual è la manifestazione più immediata di un effetto tossico sulla gonade femminile?	Alterazioni del ciclo mestruale	Nessuna delle altre risposte è corretta	Mancata ovulazione	Perdite vaginali	INFERMIERISTICA GENERALE
707	L'articolazione dell'anca è:	Un'entrosi	Una condiloartrosi	Un'articolazione a sella	Una diartrosi	INFERMIERISTICA GENERALE
708	L'aumento di intensità del colore delle urine (urine ipercromiche) è provocato da:	Presenza di pigmenti biliari	Presenza di sangue	Disfunzionalità cardiocircolatorie	Elevata presenza di batteri	INFERMIERISTICA GENERALE
709	Quali fra i seguenti segni/sintomi non è osservabile in una persona depressa:	Logorrea	Aumento dell'affaticabilità	Alterazione del ritmo sonno/veglia	Ideazione rallentata e difficoltà nella concentrazione	INFERMIERISTICA GENERALE
710	L'approccio tecnico di terapia del dolore, può essere applicato nelle case residenza:	Solo se è aperto un percorso di fine vita	Solo per i pazienti terminali	Solo se vi è il consenso dei familiari	Per alleviare il dolore fisico e psichico dei pazienti	INFERMIERISTICA GENERALE
711	Riguardo l'assistenza nell'igiene perineale di un uomo, quale tra le seguenti affermazioni non è corretta?	Procedere a partire dalla base del pene con movimento circolare dalla periferia al centro fino al meato urinario	Scoprire delicatamente il prepuzio prima di effettuare la pulizia del glande	Al termine dell'igiene, il prepuzio deve essere riportato sul glande	Pulire lo scroto e il perineo per ultimi	INFERMIERISTICA GENERALE
712	La contenzione è uno strumento che:	Si può applicare previo prescrizione medica, salvo urgenze e dandone comunicazione tempestivamente al medico	Si può applicare solo previo prescrizione medica	Si può sempre applicare ai pazienti che ne abbiano necessità	È una estrema ratio che gli operatori socio sanitari possono sempre usare	INFERMIERISTICA GENERALE
713	Il test di Allen serve a:	Valutare la presenza del circolo arterioso collaterale	Valutare la presenza del circolo venoso collaterale	Nessuna delle altre risposte è corretta	Valutare la presenza del circolo artero venoso collaterale	INFERMIERISTICA GENERALE
714	Completare la seguente frase con l'opzione corretta: " Si definisce _____ l'arrossamento della pelle determinato dall'aumentato apporto di sangue ai vasi sanguigni del derma superficiale. "	Iperemia	Abrasioni	Eczema	Erisipela	INFERMIERISTICA GENERALE
715	"Lesione a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma e i tessuti sottocutanei": questa è la definizione di una lesione da pressione di stadio:	III	IV	II	I	INFERMIERISTICA GENERALE
716	Una persona asintomatica affetta da covid 19 può trasmettere l'infezione?	Sì, le persone infette possono trasmettere il virus sia quando sono sintomatiche sia quando sono asintomatiche con lo stesso livello di trasmissibilità	Sì, ma solo dopo 72/96 ore dal contagio	Sì, ma solo se affetta anche da immunodepressione	Sì, ma solo se ha sviluppato immunoglobuline di tipo G	INFERMIERISTICA GENERALE
717	In caso di vene varicose agli arti inferiori, non è indicato:	permanere troppo a lungo in posizione sdraiata	posizionarsi con gli arti inferiori sollevati	evitare di mantenere per lungo tempo la posizione eretta	usare le calze elastiche	INFERMIERISTICA GENERALE
718	Nella gestione di un paziente che presenta disturbi d'ansia le strategie assistenziali di tipo relazionale più adeguate sono:	Stare vicino al paziente, favorire il contatto anche fisico, confortarlo e mostrarsi disponibili all'ascolto	Fare compagnia individuale	Assecondare ogni richiesta espressa dall'anziano	Proporre attività occupazionali	INFERMIERISTICA GENERALE
719	La somministrazione di un anestetico locale in forma di carbonato anziché cloridrato:	Migliora la durata d'azione anestetica	Causa tossicità sistemica	Peggiora la durata d'azione anestetica	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
720	Per il trattamento della stipsi l'uso dei lassativi favorenti la massa deve:	Essere supportato da un adeguato apporto di liquidi	Essere effettuato solo dopo la riduzione o sospensione della terapia sedativa	Tutte le alternative sono corrette	Essere supportato da una dieta ricca di proteine	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

721	Devi somministrare 15 milliequivalenti di Calcio gluconato hai a disposizione fiale da 10 ml contenenti 10 milliequivalenti. Quante fiale di farmaco devi aspirare?	Una e mezzo	Due	Una	Mezza	INFERMIERISTICA GENERALE
722	In quale dei seguenti eventi patologici il paziente deve essere posto in posizione laterale di sicurezza:	Perdita di coscienza atraumatica	Infarto miocardico acuto	Paziente gravemente ipoteso	Frattura della colonna	INFERMIERISTICA GENERALE
723	In caso di sindrome compartimentale, il tempo di reflusso capillare è superiore a:	3 secondi	7 secondi	1 secondo	5 secondi	INFERMIERISTICA GENERALE
724	Lo stato funzionale, valutato secondo le ADL, descrive la capacità di alimentarsi in modo autonomo. Quale tra le seguenti azioni è inclusa?	Porta il cibo dal piatto alla bocca	Taglia la carne	Organizza, prepara e serve i pasti in modo adeguato e senza aiuto	Scalda e serve pasti preparati	INFERMIERISTICA GENERALE
725	Il sonno non REM è suddiviso in:	4 stadi	2 stadi	3 stadi	5 stadi	INFERMIERISTICA GENERALE
726	Il Barthel index è:	Uno degli strumenti più utilizzati per accertare le attività di base della vita quotidiana di una persona e quindi la sua autosufficienza	Uno strumento per valutare la performance dell'operatore nell'assistere la persona nelle attività quotidiane	Uno strumento in disuso per il calcolo delle capacità funzionali dell'anziano	Un indice per determinare il rischio di disabilità in seguito ad ictus cerebrale	INFERMIERISTICA GENERALE
727	Indicare quale, tra le seguenti, è una possibile complicanza del Morbo di Parkinson:	Stipsi	Stearrea	Diarrea	Melena	INFERMIERISTICA GENERALE
728	In ambito infermieristico, la contenzione è uno strumento che:	Si può applicare previo prescrizione medica, salvo urgenze	Si può applicare solo previo prescrizione medica	Si può sempre applicare ai pazienti che ne abbiano necessità	È una estrema ratio che gli operatori socio sanitari possono sempre usare	INFERMIERISTICA GENERALE
729	Qual è la sede di elezione per l'iniezione intramuscolare?	Vasto laterale	Deltoidea	Dorsoglutea	Ventroglutea	INFERMIERISTICA GENERALE
730	Le lesioni cutanee secondarie sono quelle che non compaiono inizialmente, ma derivano da modificazioni delle lesioni primarie. Ne costituisce esemplificazione:	Erosione	Papula	Placca	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
731	In quale fase febbrile il paziente presenta diaforesi?	Defervescenza	Insorgenza	In tutte le fasi	In nessuna delle fasi	INFERMIERISTICA GENERALE
732	Quale dei seguenti comportamenti non deve attuare un paziente sottoposto ad intervento di protesi totale d'anca:	Addurre la gamba	Mantenere le ginocchia separate	Posizionare un cuscino tra le gambe durante il sonno	Non flettere l'anca con angolazione maggiore di 90 gradi	INFERMIERISTICA GENERALE
733	I pazienti a rischio di alterazione della funzione cognitiva dovrebbero essere:	Incoraggiati a muoversi	Incoraggiati al riposo e alla riflessione	Sovrastimolati	Esclusi dal contatto con altre persone	INFERMIERISTICA GENERALE
734	La disinfezione come fase della medicazione delle lesioni da pressione:	Deve essere limitata ai casi di infezione o contaminazione critica	Ha un effetto completo se eseguita prima e dopo la detersione	Deve essere sempre adottata	Ha un effetto completo se le soluzioni utilizzate non vengono rimosse dopo l'applicazione	INFERMIERISTICA GENERALE
735	E' più corretto detergere la stomia con:	Acqua potabile	Soluzioni isotoniche	Nessuna delle altre risposte è corretta	Soluzione fisiologica sterile	INFERMIERISTICA GENERALE
736	La nutrizione parenterale una volta preparata:	Deve essere somministrata subito	Deve essere somministrata entro 12 ore	Deve essere somministrata entro 24 ore appena tolta dal frigorifero	Deve essere somministrata entro 24 ore e deve essere conservata in frigorifero	INFERMIERISTICA GENERALE
737	In riferimento alla tecnica del prelievo capillare per l'emogluco-test è indicato:	Eliminare la prima goccia di sangue ed utilizzare la seconda per l'analisi	Utilizzare la prima goccia di sangue disponibile per l'analisi	Pungere nella parte anteriore del polpastrello del dito	Pungere dopo aver accuratamente disinfettato con iodopovidone la zona da pungero	INFERMIERISTICA GENERALE
738	Che cosa indica esattamente il termine bradicinesia?	Lentezza di movimento	Assenza di movimento	Nessuna delle altre risposte è corretta	Incapacità di programmazione motoria	INFERMIERISTICA GENERALE
739	Lo shock ipovolemico si accompagna:	A diminuzione della pressione arteriosa	Nessuna delle altre risposte è corretta	A dolore precordiale	Ad aumento della pressione arteriosa	INFERMIERISTICA GENERALE
740	In un malato che presenta dispnea occorre:	Posizionare in decubito semiortopnoico, tranquillizzarlo ed applicare ossigenoterapia 2L/min	Metterlo a riposo supino ed applicare ossigenoterapia con maschera di venturi	Tranquillizzare il malato e provvedere subito per l'Emogasanalisi (prelievo arterioso)	Valutare il tipo di dispnea e invitarlo a restare sdraiato per non affaticarsi	INFERMIERISTICA GENERALE
741	Come ti aspetti di trovare la frequenza cardiaca, in caso di repentino abbassamento pressorio?	Aumentata rispetto alla norma	Diminuita rispetto alla norma	Nei range di normalità	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
742	Se somministri un farmaco tramite peg è necessario:	Lavare il sondino prima e dopo la somministrazione con acqua	Mettere il farmaco all'interno della sacca d'alimentazione	Valutare prima il ristagno	Sospendere l'infusione almeno 15 minuti prima della somministrazione della terapia	INFERMIERISTICA GENERALE
743	Tra le raccomandazioni generali nella gestione del catetere vescicale è importante:	Non sraccordare mai il circuito	Effettuare frequenti lavaggi del sistema attraverso l'uso di una siringa cono catetere (schizzettone)	Posizionare il catetere sempre più in alto della vescica	Effettuare frequenti indagini diagnostiche su campioni di urina prelevati dalla borsina di raccolta	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

744	Devo somministrare Levodopa 62,5 mg ad un paziente. Ho a disposizione compresse divisibili da 250 mg. Quanto ne dovrò somministrare al paziente?	1/4 compressa	2 + 1/2 compressa	1/2 compressa	1 compressa	INFERMIERISTICA GENERALE
745	Il peridon:	Causa iperprolattinemia	Non causa iperprolattinemia	Non causa ginecomastia	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
746	Quale tra i seguenti interventi per la dispersione del calore utilizza la conduzione:	Applicare ghiaccio in corrispondenza dei grandi vasi arteriosi	Aerare la stanza	Eseguire spugnature al paziente	Scoprire il paziente	INFERMIERISTICA GENERALE
747	La prevenzione di lesione da pressione si svolge con:	Movimentazione frequente dell'ospite	Uscite all'aria aperta	Frequenti bagni caldi	Dieta iperproteica	INFERMIERISTICA GENERALE
748	Per disartria si intende:	Un disturbo del linguaggio di tipo motorio: consiste nella difficoltà ad effettuare movimenti necessari per l' articolazione della parola	L'incapacità di compiere gesti coordinati e diretti ad un determinato fine sebbene siano mantenute inalterate la volontà del soggetto e le sue capacità motorie	Un disturbo della deambulazione: il soggetto compie movimenti lenti ed imprecisi	L' incapacità di costruire frasi di senso compiuto	INFERMIERISTICA GENERALE
749	Se noti feci miste a grassi si tratta di:	Feci steatorroiche	Feci colliquate	Melena	Feci ematiche	INFERMIERISTICA GENERALE
750	Un paziente ti chiama perché avverte un forte stimolo ad evacuare ma non riesce ad espellere nulla. Che fai?	Verifico se presenta addome teso e globoso, effettuo esplorazione rettale per verificare la presenza di feci molli in ampolla e se presenti effettuo un clistere evacuante	Verifico se presenta addome teso e globoso, controllo da quanto tempo non evacua, gli suggerisco di sforzarsi a spingere e se non riesce comunque ad evacuare effettuo clistere evacuante a grande volume	Lo accompagno in bagno e lo lascio sul water incitandolo a provare a spingere	Gli somministro lassativo per bocca	INFERMIERISTICA GENERALE
751	Quale tra i seguenti dati è indicativo di sindrome da immobilizzazione:	Edemi	Poliuria	Ipertermia	Iperensione	INFERMIERISTICA GENERALE
752	Se un paziente portatore di catetere vescicale presenta 300 ml di diuresi / 24 ore di quale alterazione si tratta?	Oliguria	Disuria	Anuria	Pollachiuria	INFERMIERISTICA GENERALE
753	Quando nell'espettorato trovi piccole quantità di sangue sei di fronte a:	Emoftoe	Espettorato mucopurulento	Emottisi	Espettorato sieroso	INFERMIERISTICA GENERALE
754	A cosa serve rilevare la saturazione?	Riconoscere precocemente l'ipossia rispetto alla condizione di cianosi	Tutte le alternative sono corrette	Valutare il tipo di dispnea che presenta il paziente	Riconoscere un'insufficienza cardiaca grave	INFERMIERISTICA GENERALE
755	Un paziente in trattamento con anticoagulante orale presenta un tp con INR di 6,2, cosa fai?	Avviso immediatamente il medico in quanto il paziente è ad alto rischio di emorragia	Nulla in quanto il valore è nei range di normalità	Avviso immediatamente il medico in quanto il paziente è ad alto rischio di tvp	Favorisco la somministrazione di alimenti ricchi di ferro	INFERMIERISTICA GENERALE
756	Quali sono le sedi di rilevazione del polso che sceglieresti in caso di grave ipotensione?	Carotideo	Radiale e carotideo	Nessuna delle altre risposte è corretta	Radiale, temporale	INFERMIERISTICA GENERALE
757	Un paziente presenta un arto inferiore freddo e pallido, tenti di rilevare il polso pedidio, ma è assente: cosa potrebbe essere successo?	Ostruzione acuta del flusso arterioso	Probabile frattura del terzo metatarso	Ostruzione acuta del flusso venoso	Nevrite acuta del nervo sciatico	INFERMIERISTICA GENERALE
758	La rifampicina:	È un antibiotico battericida	Non è assorbita nell'intestino	Nessuna delle altre risposte è corretta	Non è usato per la tubercolosi	INFERMIERISTICA GENERALE
759	Quali tra questi non è un effetto del progesterone?	Riduzione della risposta insulinica al glucosio	Modifiche a livello della mucosa endometriale	Inibizione dell'attività contrattile dell'utero	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
760	Indicare la corretta sequenza di azioni da compiere per la somministrazione della nutrizione enterale (NE): 1. raccordare il set al SNG 2. impostare la velocità di infusione nel sistema scelto 3. controllare la scadenza del prodotto e agitare il flacone 4. effettuare il lavaggio del SNG al termine dell'infusione con 30-50 cc di acqua 5. applicare il set alla pompa 6. raccordare il set infusione al flacone, evitando di trasferire i prodotti in altri flaconi	3,6,5,1,2,4	2,6,3,5,4,2	1,4,3,2,6,5	3,5,4,1,2,6	INFERMIERISTICA GENERALE
761	Matteo, 13 mesi, è ricoverato per diarrea acuta, vomito e febbre, calo ponderale 10%. Si diagnostica una gastroenterite da Rotavirus. Il candidato indichi quali dei seguenti dati rileva con priorità.	Peso, turgore della cute, dolore addominale, diuresi	Nessuna delle altre risposte è corretta	Ultimo pasto assunto	Altri famigliari con episodi recenti di febbre	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

762	I sali di litio:	Sono usati nel disturbo bipolare	Sono usati nella disfunzione erettile	Sono usati come antivirali	Sono usati per la pulizia degli strumenti impiegati per la preparazione dei pasti	INFERMIERISTICA GENERALE
763	Quale di questi è più utile nella diagnosi di iper o ipotiroidismo?	Dosaggio diretto del TSH	Dosaggio del TRH	Dosaggio dell'ACTH	Dosaggio differenziato	INFERMIERISTICA GENERALE
764	La scopolamina è:	Un farmaco ad attività neurotrofa con azione anti-vertigine	Un farmaco che aumenta l'attività sintetica dei neuroni dei nuclei vestibolari	Nessuna delle altre risposte è corretta	Un farmaco ad azione vasotropa con azione anti-vertigine	INFERMIERISTICA GENERALE
765	Il mifepristone è:	Un antagonista del progesterone	Un eccitante della crescita	Un agonista del progesterone	Un beta bloccante	INFERMIERISTICA GENERALE
766	Un soggetto viene accompagnato al Pronto Soccorso a seguito di un incidente. L'esame neurologico è: apertura degli occhi agli stimoli verbali, risposta verbale confusa, risposta motoria localizza gli stimoli dolorosi. Secondo la scala di Glasgow (GCS) lo score è:	Punti 12; risposta oculare (punti 3), risposta verbale (punti 4), risposta motoria allo stimolo doloroso (punti 5)	Punti 11; risposta oculare (punti 4), risposta verbale (punti 4), risposta motoria allo stimolo doloroso (punti 3)	Nessuna delle altre risposte è corretta	Punti 15; risposta oculare (punti 5), risposta verbale (punti 5), risposta motoria allo stimolo doloroso (punti 5)	INFERMIERISTICA GENERALE
767	In area critica TAH significa:	Heart	Hedge	High	Hedge	INFERMIERISTICA GENERALE
768	Quale azione non deve essere compiuta durante la procedura di "applicazione di una trazione trans-scheletrica"?	Non posizionare il paziente in allineamento	Fornire assistenza ai punti di inserzione dei fili trans-scheletrici. Fornire assistenza ai punti di inserzione dei fili trans-scheletrici	Garantire la privacy del paziente	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
769	Il termine diuresi indica:	Urina prodotta in un determinato periodo di tempo	Minzione difficoltosa	Nessuna delle altre risposte è corretta	Presidio utilizzato per rimuovere (fare uscire) liquidi	INFERMIERISTICA GENERALE
770	Quale sistema si attiva iniziando un'attività motoria dispendiosa correlata alla necessità di ridurre il coinvolgimento dell'apparato digerente?	Sistema Simpatico	Sistema Differenziale Nervoso	Sistema Parasimpatico	Sistema Nervoso Somatico	INFERMIERISTICA GENERALE
771	Il test della coagulasi è utilizzato per la differenziazione di:	Stafilococchi	Streptococchi	Nessuna delle altre risposte è corretta	Lieviti	INFERMIERISTICA GENERALE
772	L'angina:	Si manifesta quando l'ossigeno fornito al miocardio è insufficiente	Nessuna delle altre risposte è corretta	Quando si manifesta provoca un dolore che non riguarda il petto	Si manifesta quando l'ossigeno fornito al miocardio è sufficiente	INFERMIERISTICA GENERALE
773	Un soggetto viene accompagnato al Pronto Soccorso a seguito di un incidente. L'esame neurologico è: risposta oculare spontanea, risposta verbale orientata/appropriata, risposta motoria obbedisce al comando. Secondo la scala di Glasgow (GCS) lo score è:	Punti 15; risposta oculare (punti 4), risposta verbale (punti 5), risposta motoria (punti 6)	Punti 13; risposta oculare (punti 3), risposta verbale (punti 5), risposta motoria (punti 5)	Nessuna delle altre risposte è corretta	Punti 12; risposta oculare (punti 3), risposta verbale (punti 4), risposta motoria (punti 5)	INFERMIERISTICA GENERALE
774	Quale infestazione cutanea causata dall'acaro Sarcoptes scabiei, si basa sull'esame obiettivo e sulla scarificazione e prevede come trattamento l'uso di scabicidi topici o, talvolta, di ivermectina orale?	Scabbia	Rosolia	Meningite	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
775	Come deve avvenire il massaggio cardiaco esterno?	Comprimendo lo sterno contro il rachide, la linea di pressione deve essere verticale	Nessuna delle altre risposte è corretta	Comprimendo la colonna vertebrale, posteriormente all'altezza del cuore, la linea di pressione deve essere diagonale	Comprimendo la faringe con due dita, la linea di pressione deve essere verticale	INFERMIERISTICA GENERALE
776	L'isoflurano:	Può essere associato all'adrenalina	Causa epatotossicità maggiore rispetto ad altri	Non irrita la mucosa	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
777	Quale tra questi termini definisce un aumento della variabilità delle dimensioni dei Globuli Rossi?	Anisocitosi	Schistocitosi	Poichilocitosi	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
778	Gli effetti teratogeni da sostanze chimiche sono:	Dipendenti dalla dose	Dipendenti dall'ambiente	Indipendenti dalla dose	Indipendenti dalla specie	INFERMIERISTICA GENERALE
779	Indicare l'enzima il cui aumento è più indicativo di danno epatico acuto:	ALT (alanina aminotransferasi)	CPK (creatin fosfochinasi)	Enzima H+	ALP (fosfatasi alcalina)	INFERMIERISTICA GENERALE
780	Con riferimento alla procedura di "assistenza al paziente che manifesta convulsioni", indicare quale azione, fra le seguenti, deve essere effettuata per prima.	Se il paziente non è a letto assisterlo, sul pavimento, proteggendo la testa nel proprio grembo o su un cuscino		Aprire i vestiti intorno al collo e al torace	Osservare l'andamento dell'attacco convulsivo, annotare la sequenza e il tipo di movimento degli arti. Osservare il colore della cute. Quando l'attacco finisce, controllare la frequenza del polso e del respiro	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

781	Il tempo indicato per la trasfusione di una sacca di piastrine (80 cc.) è:	Circa 5 - 10 minuti	Circa 200 ml / h	Maggiore di un'ora	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
782	Qual è la caratteristica delle enterotossine da stafilococchi aureus:	Termo-resistenza	Crio-resistenza	Crio-labilità	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
783	Il ph del succo gastrico è compreso tra:	1 e 2	7 e 8	10 e 20	5 e 6	INFERMIERISTICA GENERALE
784	Quali caratteristiche funzionali deve presentare un anestetico locale per essere utilizzato?	Avere bassa tossicità	Causare sonnolenza	Essere irritante per il sito in cui viene applicato	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
785	L'insulina:	È rilasciata dalle cellule beta del pancreas	Nessuna delle altre risposte è corretta	È rilasciata dalle cellule alfa del pancreas	È rilasciata dalle cellule delta del pancreas	INFERMIERISTICA GENERALE
786	Lo stato di anestesia ideale prevede:	Perdita di tutte le sensazioni compresa analgesia e rilassamento muscolare	Attivazione dei neuroni del sistema nervoso	Nessuna delle altre risposte è corretta	Perdita di tutte le sensazioni tranne analgesia	INFERMIERISTICA GENERALE
787	Quale dei seguenti bendaggi può essere delegato all'operatore socio sanitario?	Semplice	Semplice e complesso	Complesso	Incrociato a doppio nodo	INFERMIERISTICA GENERALE
788	Le lesioni cutanee primarie sono quelle che compaiono inizialmente in risposta ad alcuni cambiamenti nell'ambiente esterno o interno della cute. Ne costituisce esemplificazione:	Pustola	Linfonodo	Erosione	Cicatrice	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

Id	Quesito	Risp_esatta	Risp_errata_1	Risp_errata_2	Risp_errata_3	Materia
789	Le ghiandole piloriche dello stomaco sono:	ramificate a secrezione mucosa	acinose composte a secrezione mista	acinose composte a secrezione sierosa	tubulo-acinose a secrezione mista	INFERMIERISTICA SPECIFICA
790	Cardiopatia ischemica: una delle seguenti affermazioni è vera. Quale?	Restringimento delle coronarie, che provoca un insufficiente apporto di sangue al cuore	Morte di un'area del tessuto cardiaco in seguito ad interruzione prolungata dell'apporto sanguigno	Malattia che colpisce i reni	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
791	Una delle seguenti è la definizione di arteriosclerosi. Quale?	Forme di indurimento, ispessimento e perdita di elasticità della parete arteriosa	Deficit neurologici determinati dall'insufficiente apporto di sangue a un'area più o meno estesa del cervello	Componente delle membrane cellulari, di cui regola fluidità e permeabilità	Condizione in cui il flusso del sangue spinto dalla contrazione del muscolo cardiaco perde la normale e caratteristica silenziosità	INFERMIERISTICA SPECIFICA
792	Che cos'è la cataratta?	L'opacizzazione del cristallino	Lente che riveste la parte anteriore dell'occhio	Lente biconcava situata dietro l'iride	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
793	Cos'è la proctorragia?	Un'emorragia rettale	Una melena	Un'enterorragia	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
794	Nell'antro pilorico è prodotta:	la gastrina	la ptialina	la secretina	la mucina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
795	Che cos'è la piorrea?	Una periodontite cronica	La pellicola che si deposita sullo smalto dei denti	La struttura di sostegno del dente	Un agente inibente la crescita batterica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
796	La ERCP viene eseguita per studiare:	i dotti pancreatici e biliari	le vene	il colon	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
797	Cos'è la malattia di Fournier?	La cancrena acuta dei genitali	Un carcinoma del pancreas	Un tumore benigno	Una malattia allergica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
798	Nell'ulcera gastrica si può osservare:	melena	ematuria	diarrea	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
799	Il primo segmento epatico drena direttamente:	nella vena cava	nella vena porta	nella vena giugulare	nella vena femorale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
800	Per ascite si intende:	una raccolta liquida in cavo peritoneale	una raccolta saccata, infetta, in cavo peritoneale	la presenza di versamento liquido in cavità pleurica	un processo infiammatorio a carico del cavo ascellare	INFERMIERISTICA SPECIFICA
801	In caso di vomito violento, qual è il rischio maggiore per il paziente?	Rottura spontanea dell'esofago	Ernia diaframmatica	Iperensione portale	Varici esofagee	INFERMIERISTICA SPECIFICA
802	Quali ormoni vengono prodotti dalle ghiandole surrenali?	Cortisolo, aldosterone	Testosterone, aldosterone	ACTH, TRH	Prolattina, LTH	INFERMIERISTICA SPECIFICA
803	Gli acidi grassi vengono assorbiti da quali cellule?	Intestinali	Epatiche	Pancreatiche	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
804	La fibrillazione è :	un'alterazione della normale contrattilità dei muscoli	un arresto cardiaco	un'alterazione del ritmo respiratorio ad intervalli rapidi e non coordinati	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
805	Dove sono distribuite le ghiandole sebacee?	Su tutta la superficie cutanea	Nella pianta del piede	Sulla cute	Nel palmo della mano	INFERMIERISTICA SPECIFICA
806	Che cos'è un aneurisma?	Una dilatazione patologica permanente di un tratto più o meno circoscritto di un'arteria dovuto a indebolimento della parete del vaso	Una dilatazione di un'arteria con versamento emorragico	Un restringimento di un'arteria	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
807	I traumi cranici possono essere distinti in:	chiusi e aperti	aperti e primari	primari e secondari	secondari e aperti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
808	Le peritoniti possono essere:	da propagazione e da perforazione	da perforazione e da occlusione	primarie e secondarie	naturali e anomale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
809	In quale arteria si manifesta più frequentemente l'aneurisma dissecante?	Aorta	Succlavia	Femorale	Iliaca	INFERMIERISTICA SPECIFICA
810	Il termine anorchia indica:	mancanza congenita dei testicoli	mancanza congenita della tiroide	mancanza congenita delle ovaie	mancanza congenita della milza	INFERMIERISTICA SPECIFICA
811	Il termine emospermia indica:	piccola quantità di sangue nello sperma	piccola quantità di sangue nelle urine	piccola quantità di sangue nelle feci	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
812	L'indagine spirometrica (spirometria) serve a:	registrare la velocità di espirazione del paziente e il volume totale di aria inspirata	valutare la dimensione polmonare	determinare la presenza di enfisema polmonare	diagnosticare una pneumopatia ostruttiva	INFERMIERISTICA SPECIFICA
813	L'acalasia coinvolge i muscoli della parete:	dell'esofago	del retto addominale e obliquo esterno	del grande pettorale	del deltoide	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

814	Il termine acolia indica mancanza di:	secrezione biliare	urina	feci	sudore	INFERMIERISTICA SPECIFICA
815	L'ACTH è necessaria per il mantenimento e la crescita di quali cellule?	Quelle della corteccia surrenale	Quelle del pancreas	Quelle dello stomaco	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
816	Dov'è posta l'iride?	Tra cornea e cristallino	Tra congiuntiva e cornea	Tra cristallino e pupilla	Tra retina e congiuntiva	INFERMIERISTICA SPECIFICA
817	Cosa sono le ranule?	Cisti da ritenzione di saliva	Formazioni peduncolate provocate da un accrescimento eccessivo di tessuto sottomucoso	Neoplasie della bocca	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
818	Quale minerale ha effetto oncogeno?	Asbesto	Berillio	Ferro	Alluminio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
819	Che tipo di muscolo è il tensore della fascia lata?	Muscolo fusiforme situato nella regione antero-laterale della coscia	Muscolo superficiale situato nella regione anteriore della coscia	Muscolo sottile e gracile posto in profondità sulla regione posteriore dell'articolazione del ginocchio	Muscolo profondo della regione posteriore della coscia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
820	Completare la seguente frase con l'opzione corretta: "Il muscolo trasverso dell'addome "	aumenta la pressione addominale	flette e inclina lateralmente il tronco	aumenta la pressione intraddominale	contraendosi tende la fascia iliaca	INFERMIERISTICA SPECIFICA
821	Il principale compito dei leucociti (globuli bianchi) è :	la difesa dell'organismo	fermare la perdita di sangue nelle ferite	trasportare l'ossigeno	trasportare sostanze nutritive ai tessuti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
822	Il calcagno:	è provvisto di una tuberosità sulla faccia postero-inferiore	è in rapporto articolare diretto con tibia e perone	è posto al di sopra dell'astragalo	è la più voluminosa delle ossa brevi del corpo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
823	Cos'è l'emofilia?	Una malattia della coagulazione del sangue	Una malattia che colpisce i muscoli	Tutte le altre risposte sono corrette	Una malattia che colpisce il pancreas	INFERMIERISTICA SPECIFICA
824	Quale ormone viene sintetizzato nel duodeno?	Secretina	Glucagone	Nessuna delle altre risposte è corretta	Progesterone	INFERMIERISTICA SPECIFICA
825	Il digiuno è il tratto di intestino deputato al maggior assorbimento di:	grassi	vitamine	tutte le altre risposte sono corrette	acqua	INFERMIERISTICA SPECIFICA
826	Si definisce pancreatite acuta:	un'inflammatione acuta del pancreas	una patologia a carattere autoimmune	una degenerazione ereditaria del pancreas	una neoplasia del pancreas	INFERMIERISTICA SPECIFICA
827	Che cos'è l'embolia?	Un'ostruzione vascolare	Una terapia d'urto	Nessuna delle altre risposte è corretta	Una virosi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
828	La sede più frequente di origine del carcinoma gastrico è :	l'antro	il fondo	nessuna delle altre risposte è corretta	il corpo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
829	Qual è il sintomo più frequente in caso di fibroma uterino?	Metrorragia	Amenorrea	Incontinenza urinaria	Nessun disturbo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
830	La fibrinogenemia indica:	la percentuale di fibrinogeno presente nel sangue	l'eccesso di creatinina nel sangue	la quantità di ferro presente nel sangue	la concentrazione di piastrine nel sangue	INFERMIERISTICA SPECIFICA
831	L'epistassi indica il fenomeno del sanguinamento da:	naso	bocca	genitali	orecchio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
832	Cos'è la glossectomia?	Asportazione di parte o di tutta la lingua	Cicatizzazione di una lesione della lingua	Piccolo rigonfiamento sulla lingua	Infiammazione della lingua	INFERMIERISTICA SPECIFICA
833	La parte della laringe formata dalle corde vocali e dalla fessura posta tra esse si chiama:	glottide	gotta	nessuna delle altre risposte è corretta	glioma	INFERMIERISTICA SPECIFICA
834	Cos'è un broncospasmo?	Una contrazione delle fibre muscolari che circondano la parete dei bronchi	Un impedimento dell'attività respiratoria	Un flusso espiratorio forzato calcolato tra il 25 e il 75% della capacità vitale	Una sostanza derivante dall'oppio che dà effetti analgesici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
835	Le ghiandole di Meibomio si trovano:	nell'occhio (palpebre)	nel pancreas	nella bocca	nella tiroide	INFERMIERISTICA SPECIFICA
836	Con il termine amastia cosa si indica?	La mancanza congenita della mammella	L'incapacità di parlare	Il timore ossessivo degli spazi aperti	Una massa benigna, simile a un tumore	INFERMIERISTICA SPECIFICA
837	La piuria indica:	presenza di leucociti e pus nelle urine	presenza di bilirubina nelle urine	presenza di blu di metilene nelle urine	presenza di sangue nelle urine	INFERMIERISTICA SPECIFICA
838	Quanti stadi si riconoscono nella polmonite franca lobare non trattata?	4	3	2	5	INFERMIERISTICA SPECIFICA
839	Quante sono le categorie principali dei muscoli della respirazione?	2	3	4	5	INFERMIERISTICA SPECIFICA
840	L'arteria coronaria destra origina:	in corrispondenza del seno aortico destro	dall'ostio venoso del ventricolo sinistro	in corrispondenza del seno aortico anteriore destro	in corrispondenza del seno aortico posteriore	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

841	Quale delle seguenti affermazioni sulle radici del plesso lombare è errata?	Si dividono ciascuna in due rami	Tutte le altre risposte sono corrette	Passano fra le inserzioni del muscolo psoas sulla colonna vertebrale	Sono accompagnate dalle arterie lombari	INFERMIERISTICA SPECIFICA
842	Nei traumi chiusi addominali qual è l'organo più frequentemente interessato?	La milza	Il pancreas	Il fegato	Lo stomaco	INFERMIERISTICA SPECIFICA
843	Una diarrea associata a febbre orienta verso una patologia:	infettiva	psicosomatica	renale	epatica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
844	Il carcinoma a cellule squamose del polmone è più frequente in pazienti:	fumatori	ipotesi	ipertesi	diabetici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
845	Cosa si intende per oschioccele?	Ernia scrotale	Nessuna delle altre risposte è corretta	Punta d'ernia	Bubonocele	INFERMIERISTICA SPECIFICA
846	La chetonuria indica la presenza nelle urine di:	corpi chetonici	glucosio	acidi grassi	trigliceridi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
847	Lo spessore della cute varia a seconda delle regioni del corpo; in quale punto è molto sottile?	Sulle palpebre	Sulla pancia	Sul palmo della mano	Sotto la pianta dei piedi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
848	Un'ustione con un profondo interessamento del derma è definita:	di III grado	profonda	di I grado	di II grado	INFERMIERISTICA SPECIFICA
849	Che cosa si intende per lussazione?	Perdita di contatto tra i capi articolari	Anomalia congenita dell'anca	Rottura della capsula articolare	Stiramento di un muscolo degli arti superiori	INFERMIERISTICA SPECIFICA
850	Che cosa significa litiasi?	Presenza di concrezioni calcaree in un organo secrotore	Accumulo di sali di litio	Ostacolo al deflusso della bile	Formazione di calcoli renali	INFERMIERISTICA SPECIFICA
851	Al passaggio della corrente elettrica quale dei seguenti tessuti è più resistente?	Ossa	Sangue	Pelle	Nervi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
852	Cos'è l'arteriosclerosi?	Una progressiva degenerazione delle pareti delle arterie che ne causa l'indurimento, la perdita di elasticità e il restringimento	Nessuna delle altre risposte è corretta	Un deficit neurologico acuto	Una ridotta funzionalità cardiaca	INFERMIERISTICA SPECIFICA
853	La doccia radiale si trova:	nell'omero	nella clavicola	nel radio	nell'ulna	INFERMIERISTICA SPECIFICA
854	Cosa indica l'anopsia?	Una forma di cecità temporanea che si può manifestare quando si verificano forti variazioni di velocità	Una condizione patologica che provoca diarrea con feci voluminose	Una malattia di origine intestinale	Una malattia multifattoriale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
855	Che cos'è l'atrofia?	Riduzione di peso e di volume di un organo o di altra parte dell'organismo	Cordone fibroso	Aumento di volume di un tessuto	Concentrazione dura di sali minerali (calcolo)	INFERMIERISTICA SPECIFICA
856	Il rachitismo è causato dalla carenza di quale vitamina?	Vitamina D	Vitamina K	Vitamina B12	Vitamina E	INFERMIERISTICA SPECIFICA
857	L'insulina è prodotta da:	isole di Langerhans	fegato	reni	ipofisi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
858	Quali parti del corpo possono essere colpite dagli angiomi?	Tutte le altre risposte sono corrette	Viso	Nuca e tronco	Alcuni organi interni come il fegato	INFERMIERISTICA SPECIFICA
859	In quali condizioni c'è il rischio di sviluppare una cancrena gassosa?	Tutte le altre risposte sono corrette	Gravi lesioni a carico dei muscoli	Ferite complicate dalla presenza di corpi estranei	Amputazione di arti ischemici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
860	I segni fondamentali della peritonite acuta generalizzata sono:	Tutte le altre risposte sono corrette	Febbre e leucocitosi	Contrattura addominale	Shock	INFERMIERISTICA SPECIFICA
861	Come viene definita l'ischemia che colpisce soprattutto le dita delle mani?	Malattia di Raynaud	Morbo di Parkinson	Trombosi venosa profonda	Arteriopatia cronica ostruttiva	INFERMIERISTICA SPECIFICA
862	I traumi cranici chiusi possono essere provocati da:	Tutte le altre risposte sono corrette	Un corpo contundente	Un contraccolpo	Violenti spostamenti d'aria	INFERMIERISTICA SPECIFICA
863	Quali sono i componenti del sangue?	Tutte le altre risposte sono corrette	Plasma e trombociti	Eritrociti	Leucociti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
864	Le richieste energetiche del nostro organismo vengono soddisfatte da:	tutte le altre risposte sono corrette	carboidrati	grassi	proteine	INFERMIERISTICA SPECIFICA
865	Da quale delle seguenti sedi proviene più frequentemente l'embolo che causa l'embolia polmonare?	Vene profonde degli arti inferiori	Vena aorta	Atrio destro	Vene superficiali degli arti inferiori	INFERMIERISTICA SPECIFICA
866	Dove compaiono solitamente le strie atrofiche?	Tutte le altre risposte sono corrette	Sull'addome	Sulle cosce	Sulle mammelle	INFERMIERISTICA SPECIFICA
867	Quali sono i segni tipici dell'acromegalia?	Tutte le altre risposte sono corrette	Allungamento del volto	Ingrossamento della mandibola	Ingrossamento del naso	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

868	In quale patologia è netto e rinforzato il fremito vocale?	Polmonite lobare	Pneumotorace	Asma	Enfisema	INFERMIERISTICA SPECIFICA
869	Indicare il farmaco valido nella terapia della tubercolosi:	rifampicina	eritromicina	amoxicillina	penicillina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
870	Indicare il farmaco che di solito può determinare eruzioni cutanee:	amoxicillina	diuretici	atenololo	nessuno	INFERMIERISTICA SPECIFICA
871	Qual è il farmaco di pronto impiego di fronte a crisi ipertensiva in ambiente extraospedaliero?	Nifedipina via sublinguale	Captopril per os	Nitroglicerina via sublinguale	Verapamil evù	INFERMIERISTICA SPECIFICA
872	Quale farmaco si utilizza in caso di glaucoma acuto?	Pilocarpina 3% gocce	Nessuno è indicativo	Fluorometolone collirio	Tromantadina pomata os	INFERMIERISTICA SPECIFICA
873	Indicare il farmaco a effetto antipertensivo:	diuretici	statine	colestipolo	chinolonici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
874	Indicare quale fra questi è un farmaco ad azione antipiretica:	paracetamolo	beta-bloccanti	chinolonici	sulfamidici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
875	Quale farmaco si usa in caso di IMA della terapia fibrinolitica?	Streptochinasi	Adrenalina	Eparina	Reserpina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
876	In caso di allergia alla penicillina, quale antibiotico si usa per un'infezione streptococcica delle prime vie respiratorie?	Macrolidi (eritromicina ecc.)	Cefalosporine	Tetracicline	Sulfamidico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
877	Indicare i farmaci elettivi in caso di endometriosi:	Estroprogestinici	Cortisonici	Acth	Ciproterone acetato	INFERMIERISTICA SPECIFICA
878	Il farmaco elettivamente impiegato nel piccolo male è :	valproato sodico	idantoinico	barbiturico	benzodiazepinico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
879	I barbiturici possono determinare:	induzione enzimatica epatica	induzione enzimatica cerebrale	alterazioni oculari	crisi neurodislettiche	INFERMIERISTICA SPECIFICA
880	Quali tra questi farmaci risulta efficace per la bradiocardia?	Atropina	Nitroglicerina	Sali di potassio	Antiarritmici di I classe	INFERMIERISTICA SPECIFICA
881	Con quale farmaco asintomatico si curano solitamente i dolori osteoarticolari?	Diclofenac	Cortisonici	Paracetamolo	Acido aminosalicilico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
882	Nella preparazione farmacologica con quale sostanza di solito è utilizzata la amoxicillina?	Acido clavulonico	Josamicina	Sobrero	Eritromicina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
883	Quale dei sottoindicati farmaci dà fotosensibilità?	Tetracicline	Penicilline	Succinilcolina	Paracetamolo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
884	Indicare quale fra questi è un farmaco antiaritmico:	amiodarone	carbamazepina	ippiodi	istamina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
885	Indicare il farmaco ad azione antivirale:	acyclovir	metotrexane	chinolonici	nimesuline	INFERMIERISTICA SPECIFICA
886	Indicare il farmaco gastrolesivo:	ketoprofene	verapamil	nessuno dei precedenti	ribovirina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
887	Quali farmaci hanno un'azione miorellassante?	Benzodiazepine	Istaminici	Antiemetici	Vitamine	INFERMIERISTICA SPECIFICA
888	L'uso terapeutico della tossina botulinica è indicato per una delle seguenti condizioni. Quale?	Blefarospasmo	Distonia	Spasticità	Bruxismo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
889	Uno dei seguenti antibiotici è di prima scelta nella terapia della malattia di Lyme. Quale?	Tetracicline	Cefalosporine	Eritromicina	Penicillina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
890	Tutti i seguenti sono effetti della morfina, tranne uno. Quale?	Diarrea	Nausea	Depressione respiratoria	Miosi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
891	Uno tra i seguenti è il trattamento più indicato in un paziente che ha avuto recentemente un infarto miocardico e attualmente affetto da depressione. Quale?	Paroxetina	Tranileipromina/trifluoroperazina (IMAO)	Elettroshock	Amitriptilina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
892	Quale tipo di farmaco, se somministrato frequentemente, determina fenomeni di lipodistrofia?	Insulina	Farmaci irritanti	Diuretici	Farmaci ipertonici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
893	Nell'infezione da Clostridium difficile qual è l'antibiotico di elezione?	Vancomicina	Eritromicina	Penicillina	Amoxicillina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
894	Indicare il farmaco valido nella terapia del morbo di Crohn:	acido aminosalicilico	omoprazolo	sali d'oro	acido acetilsalicilico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
895	Indicare quale fra questi è un farmaco antidepressivo:	amitriptilina	fenilbutazone	fibrati	atenololo	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

896	Quale farmaco viene somministrato nella tachicardia parossistica?	Verapamil	Adrenalina	Clonidina	Sufedipina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
897	Indicare il farmaco antimicotico:	itraconazolo	adrenalina	vitamina	ticlopidina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
898	Quale farmaco può essere utile in caso di anemia?	Eritropoietina	Acido tranexanico	Rame	Zinco	INFERMIERISTICA SPECIFICA
899	In una tra le seguenti condizioni è indicato l'impiego degli anticolinesterasici. Quale?	Miastenia grave	Glaucoma ad angolo chiuso	Diarrea ribelle	Anestesia generale in associazione agli anestetici gassosi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
900	La loperamide può essere usata nel trattamento di uno dei seguenti sintomi. Quale?	Diarrea	Stipsi ostinata dell'anziano	Meteorismo	Reflusso gastroesofageo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
901	Uno dei seguenti farmaci produce, quando assunto insieme all'alcool, il cosiddetto effetto antabuse. Quale?	Disulfiram	Amoxicillina	Eritromicina	Digossina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
902	Tutte le seguenti sono azioni farmacologiche delle benzodiazepine, tranne una. Quale?	Convulsivante	Ipnoinducente	Ansiolitica	Miorilassante	INFERMIERISTICA SPECIFICA
903	Nel sangue che si somministra in una trasfusione è possibile aggiungere farmaci?	No	Solo nei diabetici	Sì	Dipende dai casi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
904	L'uso protratto di anfetamine può comportare:	la slatentizzazione di una psicosi	crisi oculogire	il sorgere di una psicosi	la slatentizzazione di una nevrosi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
905	Quale farmaco è indicato nel caso di ipercolesterolemia?	Statine	Atenololo	Propanololo	Fluoxetina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
906	In quale tra le seguenti patologie è indicato l'uso delle tetracicline?	Bruccellosi	Tubercolosi, come 3° farmaco di associazione	Diarrea del viaggiatore	Malaria resistente alla cloroquina e alla meflochina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
907	La colchicina è utilizzata elettivamente per il trattamento di una sola tra le seguenti condizioni. Quale?	Attacco acuto di gotta	Iperuricemia in corso di insufficienza renale lieve moderata	Malaria	Terapia non chirurgica del calazio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
908	Quale dei seguenti farmaci antidepressivi è causa di priapismo?	Trazodone	Fluoxetina	Bupropione	Clomipramina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
909	Quale dei seguenti farmaci inibisce la sintesi di acido urico?	Allopurinolo	Sulfipirazone	Benzodiarone	Probenecid	INFERMIERISTICA SPECIFICA
910	Che cos'è il dipiridamolo?	Un antiaggregante piastrinico	Un a-bloccante	Un b-bloccante	Un a-stimolante	INFERMIERISTICA SPECIFICA
911	Quando si è già instaurata una trombosi, la terapia farmacologica consiste nella somministrazione di:	tutte le altre risposte sono corrette	eparina	eparina chiusa	fibrinolitici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
912	La codeina viene usata per:	tutte le altre risposte sono corrette	mal di testa	tosse	mal di denti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
913	Il Losartan è :	un antagonista rec. Angiotensina 2	un Ace-inibitore	un beta-bloccante	un calcio antagonista	INFERMIERISTICA SPECIFICA
914	In che fase della febbre si osserva una profusa sudorazione?	Nella fase di defervescenza	Nella fase di remissione	Nella fase di acme	Nella fase di stato	INFERMIERISTICA SPECIFICA
915	Sono radiazioni ionizzanti:	i raggi X	le radiazioni solari	i raggi ultravioletti	i raggi infrarossi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
916	L'assideramento è :	la soppressione dell'attività termoregolatrice da prolungato freddo umido	l'iperproduzione di siderofilina	l'infiammazione da freddo prolungato	la distensione meccanica della membrana	INFERMIERISTICA SPECIFICA
917	Cos'è l'ipertermia?	L'aumento della temperatura corporea	L'aumento della frequenza cardiaca	La riduzione della temperatura corporea	L'aumento dei peli	INFERMIERISTICA SPECIFICA
918	Sono esempi di contagio per via aerea le seguenti infezioni, eccetto una. Quale?	Tifo esantematico	Tubercolosi polmonare	Vaiolo	Difterite	INFERMIERISTICA SPECIFICA
919	Di norma, la contrattura dello sfintere aumenta:	nella ragade anale	nel morbo di Crohn	nel cancro del canale anale	nell'ulcera tuberculare	INFERMIERISTICA SPECIFICA
920	La sala operatoria deve avere dimensioni non inferiori a:	35-40 mq	60-70 mq	100 mq	20-30 mq	INFERMIERISTICA SPECIFICA
921	Nei pazienti con anemia perniciose qual è il carcinoma più frequente?	Gastrico	Polmonare	Renale	Epatico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
922	La bagassosi è dovuta a:	miceti	batteri	virus	protozoi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
923	Nella febbre si ha generalmente:	acidosi metabolica	acidosi respiratoria	alcalosi metabolica	alcalosi respiratoria	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

924	L'osteosarcoma è il tumore maligno dello scheletro più frequente nei:	giovani	soggetti anziani	neonati	soggetti tra i 40 e i 50 anni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
925	Nell'ematoma muscolare, quale mezzo terapeutico è indicato?	Ghiaccio	Impacchi caldi	Massaggio	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
926	Le lesioni organiche vascolari vengono evidenziate con:	flussimetria doppler	ecografia	arteriografia	scintigrafia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
927	Le coliti sono:	processi infiammatori della mucosa intestinale a decorso acuto, subacuto, cronico	processi escavanti la mucosa intestinale	tumori benigni dell'intestino	processi flogistici a carico del coledoco	INFERMIERISTICA SPECIFICA
928	Con il termine di autotrapianto si intende:	la rimozione e il trapianto di un tessuto all'interno dello stesso organismo	il trapianto di un organo in un individuo appartenente alla stessa specie del soggetto da cui è stato espantato	il trapianto di organi tra specie diverse	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
929	Che cos' è un filtro cavale?	Protesi endovascolare	Drenaggio	Protesi cardiaca	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
930	L'istamina favorisce:	la coagulazione del sangue	le emorragie	la deplezione linfocitaria	la chemiotassi del PMN	INFERMIERISTICA SPECIFICA
931	Quando si trasfonde sangue?	Quando Hb è inferiore a 8 g/dl	Quando Hb è inferiore a 20 g/dl	Quando Hb è inferiore a 3 g/dl	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
932	Le cellule prevalenti nell'infiammazione prodotta da infezioni virali sono:	linfociti	eosinofili	mastcellule	plasmacellule	INFERMIERISTICA SPECIFICA
933	Il PPD è :	un antigene	un anticorpo	una tossina	un vaccino	INFERMIERISTICA SPECIFICA
934	L'anticorpo è :	una glicoproteina	un peptide	una proteina	una lipoproteina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
935	Le plasmacellule derivano da:	linfociti B	linfociti T	macrofagi	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
936	In quale di queste malattie non si riscontra un difetto di chemiotassi:	morbillo	cirrosi epatica	morbo di Hodgkin	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
937	Come viene eseguita un'embolectomia?	Con un catetere particolare (Fogarty)	Con farmaci anticoagulanti	Con by-pass	Con fibrinolitici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
938	Lo shock anafilattico può colpire:	qualunque individuo in opportune condizioni	gli individui allergici	gli atopici	gli immunodepressi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
939	Quanti sono i tipi di linfedema?	Tre	Due	Quattro	Uno	INFERMIERISTICA SPECIFICA
940	Qual è la causa del morbo di Parkinson?	Degenerazioni o lesioni delle cellule nervose all'interno dei gangli basali	Alterazioni genetiche	Ereditarietà	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
941	L'infarto polmonare è :	una conseguenza di un'embolia polmonare	l'ostruzione di una arteria a seguito della fissurazione del cappuccio fibroso di una placca ateromatosa	una necrosi provocata da un disturbo vasomotorio o dall'occlusione della circolazione arterovenosa mesenterica	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
942	I valori di frequenza cardiaca si considerano normali nel bambino se rientrano nei:	90-100 battiti	70-90 battiti	120-130 battiti	70-80 battiti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
943	Quando viene eseguito un intervento di colopessi?	Nei casi di prolasso del retto	Nei casi di cancro del colon	Nei casi di cancro della gola	Nei casi di cancro dello stomaco	INFERMIERISTICA SPECIFICA
944	La colpotomia è un intervento chirurgico che consiste:	nel praticare un'incisione nella vagina per svuotare un ascesso localizzato nel piccolo bacino	nel praticare un'incisione per il drenaggio di un ematoma	nel praticare un'incisione in cui parte del colon viene estroflessa	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
945	La narcolessia è caratterizzata da:	eccessiva e cronica sonnolenza	febbre, cefalea	dolori generalizzati	gonfiore generale dei linfonodi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
946	Cosa ha minore importanza nella diagnosi di arresto cardiaco?	L'elettrocardiogramma	L'assenza di polso	L'assenza di attività respiratoria spontanea	L'assenza di pressione sanguigna	INFERMIERISTICA SPECIFICA
947	Dove si riscontrano le metastasi più frequenti del tumore della mammella?	Ossa e polmoni	Fegato e pancreas	Cervello	Stomaco	INFERMIERISTICA SPECIFICA
948	Quali sono le alterazioni quantitative della diuresi?	Oliguria e poliuria	Poliuria e piuria	Pollachiuria	Stranguria	INFERMIERISTICA SPECIFICA
949	L'apoptosi è definibile come:	morte cellulare programmata	morte cellulare improvvisa	morte cellulare generalizzata	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

950	Le glicogenosi sono patologie derivanti da:	eccessivo accumulo di glicogeno	formazione abnorme di glicogeno	intolleranza agli zuccheri complessi	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
951	La sindrome di Down è causata da un'alterazione genetica. Nello specifico dalla:	trisomia del cromosoma 21	inversione di un frammento del cromosoma 12	triploidia del patrimonio cromosomico	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
952	In caso di emorragia arteriosa, la manovra di compressione effettuata attraverso l'utilizzo di laccio emostatico va eseguita:	tra il cuore e la zona dell'emorragia	continuamente per 20 minuti	soltanto nel caso in cui il paziente appaia ipoteso	senza stringere eccessivamente il laccio, al fine di evitare episodi ischemici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
953	L'ulcera gastrica appare frequentemente localizzata:	a livello del piloro e della piccola curva gastrica	a livello del cardias	a livello della grande curva gastrica	a livello del fondo dello stomaco	INFERMIERISTICA SPECIFICA
954	Cosa presenta il paziente, nel diabete insipido:	deficit di ormone antidiuretico	eccesso di insulina	intensa diuresi	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
955	Nell'insufficienza respiratoria la tensione arteriosa di ossigeno (pO2) minore di:	60 mmHg	30 mmHg	80 mmHg, ma superiore a 70 mmHg	110 mmHg	INFERMIERISTICA SPECIFICA
956	Indicare quale delle seguenti definizioni di virulenza è più corretta:	la capacità di un dato microrganismo di superare le difese di un dato ospite in determinate condizioni	la resistenza del microrganismo ad agenti terapeutici	la capacità del microrganismo di produrre tossine a loro volta patogene per l'organismo	la capacità del microrganismo di determinare una malattia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
957	Lo studio della causa di un evento morboso è definito:	eziologia	patogenesi	embriogenesi	epidemiologia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
958	Cosa possono provocare le radiazioni U.V. :	carcinomi cutanei	leucemia	orticaria	linfomi non Hodgkin	INFERMIERISTICA SPECIFICA
959	Le sostanze che potenziano l'azione delle radiazioni eccitanti sono dette:	fotodinamiche	monocromatiche	ossidanti	fotosensibili	INFERMIERISTICA SPECIFICA
960	Il colpo di sole è :	un danno meningeo dovuto a eccessiva esposizione ai raggi solari	un malore delle popolazioni a clima tropicale	un malore delle popolazioni a clima equatoriale	una malattia che insorge durante l'estate	INFERMIERISTICA SPECIFICA
961	Contro la stipsi è indicata una dieta ricca di:	fibre (crusca, mucillagini), farina integrale	farina bianca, proteine	cibi speziati	carboidrati	INFERMIERISTICA SPECIFICA
962	Non è una malattia infettiva:	la micosi fungoide	l'istoplasmosi	la pertosse	la tubercolosi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
963	La tossina tetanica provoca:	paralisi spastica	vomito	diarrea	paralisi flaccida	INFERMIERISTICA SPECIFICA
964	La febbre intermittente si riscontra maggiormente in caso di:	angiocoliti	trombosi arteriose	aneurismi venosi	flebiti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
965	Quale tra le seguenti NON è una malattia ereditaria?	Miastenia grave	Emofilia A	Anemia mediterranea	Albinismo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
966	Una malattia infettiva con febbre elevata, leucopenia e bradicardia probabilmente è:	febbre tifoide	malaria	epatite virale	brucellosi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
967	Qual è la sindrome in cui l'ormone gastrina si presenta a un tasso elevato?	Sindrome di Zollinger-Ellison	Morbo di Basedow	Nessuna delle altre risposte è corretta	Sindrome di Ciuffini-Pancoast	INFERMIERISTICA SPECIFICA
968	Che cosa si intende per ferita?	Perdita della soluzione di continuo della cute o della mucosa	Incisione chirurgica	Lesione causata da un oggetto tagliente	Perdita di uno strato di epitelio in seguito a trauma	INFERMIERISTICA SPECIFICA
969	L'anoressia è :	un disordine dell'alimentazione	un disordine alimentare che colpisce prevalentemente in età geriatrica	un disturbo metabolico che porta alla magrezza patologica	una malattia metabolica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
970	Che cos'è la fibrina?	Una proteina plasmatica	Un nucleotide	Una tromboglobina	Un polimero insolubile	INFERMIERISTICA SPECIFICA
971	Dopo una lesione, quale tipo cellulare si rigenera meno facilmente?	I neuroni del SNC	L'epidermide	La mucosa intestinale	I nervi periferici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
972	Il colorito terreo è caratteristico dei:	malarici cronici	colitici	nessuna delle altre risposte è corretta	diabetici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
973	Il timo è un tessuto:	epiteliale	connettivale	fibroso	linfoide	INFERMIERISTICA SPECIFICA
974	Il test di Kveim è usato nella diagnosi di:	sarcoidosi	lebbra	nessuna delle altre risposte è corretta	toxoplasmosi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
975	Il morbo di Graves è una patologia:	tiroidea	disendocrina	dismetabolica	autoimmunitaria	INFERMIERISTICA SPECIFICA
976	La rinite vasomotoria è di origine:	neurovegetativa	infettiva	nessuna delle altre risposte è corretta	allergica	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

977	I mitocondri contengono enzimi interessati nella:	fosforilazione ossidativa	sintesi di acidi grassi	nessuna delle altre risposte è corretta	glicolisi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
978	L'infarto è :	un processo di necrosi causato da ischemia	un processo di necrosi causato da una trombosi arteriosa	un processo di necrosi causato da una trombosi venosa	un'emorragia tessutale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
979	Cosa si intende per stomizzazione?	Un'apertura chirurgica per unire due organi	Sensazione di instabilità o stordimento	Nessuna delle altre risposte è corretta	Qualsiasi forma di infiammazione oppure ulcerazione di un organo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
980	La cianosi è dovuta a:	diminuita ossigenazione del sangue	iperemia passiva	ischemia	diminuita saturazione del sangue arterioso	INFERMIERISTICA SPECIFICA
981	La malattia di Cushing è sostenuta da:	iposodiemia e iperpotassiemia	curva glicemica da diabete	nessuna delle altre risposte è corretta	ipervolemia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
982	L'impetigine è più frequente:	nei bambini	negli anziani	negli adolescenti	negli adulti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
983	Quale delle seguenti caratteristiche non è tipica dei tumori benigni?	Invasione dei vasi sanguigni	Crescita lenta	Buona differenziazione	Basso indice mitotico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
984	Che cos'è il comedone?	Un tappo semisolido di materiale grasso caratterizzato da un punto nero	Una piccola escrescenza umida simile a una verruca che compare sulla pelle	Nessuna delle altre risposte è corretta	Un'alterazione della funzionalità renale caratterizzata dalla presenza di pigmenti biliari nell'urina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
985	La febbre gialla:	è causata da un virus della famiglia degli arbovirus	viene trasmessa dalla zanzara Anopheles	nessuna delle altre risposte è corretta	viene trasmessa dalla zanzara culex fatigans	INFERMIERISTICA SPECIFICA
986	Cos'è la litotriassia?	Una tecnica non chirurgica, con ultrasuoni per polverizzare i calcoli presenti nel corpo	Una tecnica che permette di osservare il feto all'interno dell'utero per mezzo di un fetoscopio	Nessuna delle altre risposte è corretta	Una tecnica di radioterapia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
987	La linea del latte:	unisce la radice degli arti inferiori a quella degli arti superiori	è una linea trasversale all'altezza della quinta costa	nessuna delle altre risposte è corretta	collega le radici dei due arti superiori	INFERMIERISTICA SPECIFICA
988	La fibrosi epatica è definibile come un processo regressivo dovuto a sintesi di:	collagene	fibronectina	enzimi litici	lipidi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
989	Quale tra le seguenti indica una proteina di fase acuta nell'infarto del miocardio?	Mioglobina	Fibrinogeno	Nessuna delle altre risposte è corretta	Aptoglobina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
990	La malattia acuta di Nissl implica:	il rigonfiamento cellulare dei neuroni	l'accumulo di lipofuscina nei neuroni	nessuna delle altre risposte è corretta	una malattia genetica del SNC	INFERMIERISTICA SPECIFICA
991	L'agente eziologico della malaria è :	un protozoo	un batterio	nessuna delle altre risposte è corretta	un virus	INFERMIERISTICA SPECIFICA
992	Quale tra queste può essere considerata una malattia ereditaria?	Fibrosi cistica	Fibrosi polmonare idiopatica	Nessuna delle altre risposte è corretta	Schizofrenia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
993	Quale tra questi organi subisce un processo naturale di regressione successivamente alla pubertà?	Il timo	La milza	Nessuna delle altre risposte è corretta	Il pancreas	INFERMIERISTICA SPECIFICA
994	Qual è l'agente eziologico della malattia reumatica?	Streptococco bemolitico	Yersinia pestis	Nessuna delle altre risposte è corretta	Klebsiella pneumoniae	INFERMIERISTICA SPECIFICA
995	Il tamponamento cardiaco è determinato da:	accumulo di liquido nel sacco pericardico	alcalosi metabolica	insufficienza respiratoria temporanea	insufficienza respiratoria acuta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
996	Una sindrome emorragica può essere determinata da una vistosa compromissione della funzionalità epatica per uno dei seguenti motivi:	il fegato non produce fattori della coagulazione	il fegato produce le piastrine	il fegato sintetizza la vitamina B	il fegato non produce le piastrine	INFERMIERISTICA SPECIFICA
997	Tutte le seguenti condizioni possono essere espressione di patologia dei recettori, eccetto una. Quale?	Nanismo dei Pigmei africani e gigantismo genetico dei Watussi	Nessuna delle altre risposte è corretta	Diabete mellito insulino-resistente	Miastenia gravis	INFERMIERISTICA SPECIFICA
998	Con il termine di omeostasi si intende:	l'equilibrio chimico-fisico degli organismi	lo studio delle patologie umane	la terapia postoperatoria	lo studio della staticità biologica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
999	500-2000 ml è il volume di secrezione salivare nelle:	24 ore	48 ore	12 ore	8 ore	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1000	Una delle seguenti malattie infettive è stata recentemente dichiarata scomparsa dal mondo dalla OMS:	vaiolo	dengue	peste bubbonica	febbre gialla	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1001	Una sola delle seguenti proposizioni è esatta. Quale?	I fattori di virulenza dei microrganismi possono essere non tossici	Le tossine batteriche non sono fattori di virulenza	Solo i microrganismi virulenti producono tossine	Tutti i microrganismi virulenti producono tossine	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1002	Le endotossine sono:	lipopolisaccaridi legati a una proteina	proteine	polisaccaridi	lipopolisaccaridi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1003	Quante sono le fasi di base della coagulazione?	2	3	5	8	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1004	Da quanti strati connettivali è costituita la parete vasale?	3	4	1	2	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1005	L'odinofagia è caratterizzata da una deglutizione:	difficoltosa e dolorosa	rumorosa	impossibile	impossibile solo per i cibi solidi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1006	Il meccanismo anticoagulante della proteina C e della proteina S richiede la partecipazione di:	trombina	nessuna delle altre risposte è corretta	fibrina	fibrinogeno	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1007	Le endotossine sono di natura:	lipolisaccaridica	lipidica	glucidica	gluciproteica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1008	La sarcoidosi è :	una malattia a eziologia ignota caratterizzata da lesioni di tipo granulomatoso	una reticolo-endoteliosi	una forma di amiloidosi primaria del tessuto muscolare striato	un tumore maligno connettivale infiltrante	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1009	Isogenico significa:	proveniente dallo stesso individuo	antigene comune ai membri di una sola specie	classe e sottoclasse di una immunoglobulina	condizione genetica simile a più individui	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1010	Dove viene solitamente effettuato un prelievo di sangue capillare?	Dal dito	Dall'orecchio	Dal tallone	Dal gomito	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1011	Per carrier si intende:	una molecola a cui vengono legati gli apteni	un organo linfoide	un antigene virale	un antigene tumorale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1012	Gli anticorpi svolgono sulle endotossine azione:	agglutinante	tutte le altre risposte sono corrette	neutralizzante	precipitante	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1013	Gli anticorpi naturali intervengono in:	reazioni trasfusionali	malattie autoimmuni	malattie infettive	reazioni di rigetto	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1014	Lo shock anafilattico può essere causato da:	farmaci	nessuna delle altre risposte è corretta	pollini	polveri	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1015	Qual è l'età di maggiore incidenza del fibroma uterino?	30-50 anni	60-70 anni	sotto i 20 anni	20-30 anni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1016	In quale paziente non si esegue mai una rachicentesi?	In un soggetto con una sospetta ipertensione endocranica	In un soggetto con sospetta malattia epatica	In un soggetto diabetico	In un soggetto cardiopatico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1017	Quanti sono i segmenti epatici?	8	6	2	4	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1018	La frequenza cardiaca viene stabilita contando il numero delle pulsazioni in un minuto; nell'adulto si considerano normali i valori:	battiti 70-80	battiti 70-90	battiti 90-100	battiti 120-130	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1019	Tra quali valori compreso il pH normale del sangue?	7,38-7,42	7,42-7,45	6,8-7,2	7,2-7,3	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1020	La diminuzione di volume di un organo in sede normalmente sviluppato si chiama:	atrofia	metaplasma	aplasia	ipoplasia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1021	Il tumore benigno può dare metastasi?	No	Man mano che cresce	Sì	In alcuni casi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1022	Che cos'è il cloasma?	Un'eccessiva concentrazione di melanina	Una malattia della pelle	Una malattia autoimmune	Una forma particolare di micosi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1023	La più comune causa di morte per tumore nella donna :	carcinoma della mammella	carcinoma dell'ovaio	carcinoma della vescica urinaria	carcinoma del fegato	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1024	Una biopsia epatica mostra noduli tumorali con struttura adenocarcinomatosa. La sede probabile del tumore primitivo :	il colon	il retto	il cervelletto	la prostata	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1025	Il fumo da tabacco può provocare:	carcinoma del polmone	melanomi	antracosi	embolia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1026	Il mughetto si manifesta soprattutto:	nei neonati	negli adulti	negli anziani	nei bambini	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1027	Il RAST è utile per la diagnosi di:	pollinosi	nessuna delle altre risposte è corretta	micosi	tumori	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1028	La fibromialgia è una malattia infiammatoria che colpisce:	le fibre di cui sono composti i muscoli	nessuna delle altre risposte è corretta	le ghiandole endocrine	i processi di trasformazione delle sostanze nutritive dell'organismo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1029	Qual è l'organo più colpito da cancro nella donna?	La mammella	I polmoni	Le ovaie	La cervice uterina	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1030	Si definiscono microorganismi intracellulari facoltativi quei microorganismi:	in grado di sopravvivere e riprodursi sia in ambiente extracellulare che intracellulare	nessuna delle altre risposte è corretta	in grado di sopravvivere all'esterno dell'organismo umano	in grado di sopravvivere in ambiente intracellulare	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1031	Tra i fattori di rischio dell'aterosclerosi, quale tra i seguenti va considerato rilevante?	Aumento del colesterolo LDL	Nessuna delle altre risposte è corretta	Trombosi arteriosa	Deficit di vitamina B12	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1032	In caso di presenza di corpo estraneo nelle vie aeree superiori all'emogasanalisi si rileva generalmente:	ipossiemia e ipercapnia	nessuna delle altre risposte è corretta	iperossia	ipertermia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1033	In un paziente con sclerosi interstiziale polmonare si ha:	incremento della tensione arteriosa di O2 e CO2	tensione arteriosa di CO2 normale o ridotta	incremento della tensione arteriosa di O2	incremento della tensione arteriosa di CO2	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1034	La b talassemia implica deficit di produzione delle catene b dell'emoglobina. Tra gli effetti:	grave anemia	nessuna delle altre risposte è corretta	deficit di mioglobina	aumento dell'emoglobina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1035	I seguenti batteri sono parassiti intracellulari facoltativi, eccetto uno. Quale?	Micoplasmi	Micobatteri	Salmonelle	Brucelle	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1036	I raggi X danneggiano principalmente:	ovaie e testicoli	il tessuto muscolare	il tessuto osseo	il tessuto nervoso	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1037	I pioni sono:	mesoni	corpuscolo del pus	piogeni in disfacimento	pazienti con delirio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1038	Quali sono i segni vitali?	Tutte le altre risposte sono corrette	Temperatura corporea e respiro	Frequenza cardiaca e polso	Pressione del sangue	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1039	Che cos'è l'escara?	Una placca di tessuto cancrenoso	Sangue deleucocitato	Un ormone antidiuretico	Una vitamina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1040	Il dolore è il sintomo principale di quale cancro?	Cancro del corpo pancreatico	Cancro del canale anale	Cancro del fegato	Cancro dello stomaco	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1041	Il colera può essere veicolato da:	acqua	aria	suolo	insetti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1042	In sala operatoria il grado ottimale di umidità :	40-60%	70-90%	24-26%	1	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1043	Le zone filtro del blocco operatorio servono a:	tutte le altre risposte sono corrette	preparare le persone nel reparto operatorio con modalità appropriate	costituire una zona di scambio di materiali diretti nel reparto operatorio o al di fuori di esso	offrire una zona di comunicazione tra il personale addetto e non al reparto operatorio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1044	Quali possono essere le complicanze post-operatorie immediate compromettenti la funzione respiratoria?	Ostruzione delle vie aeree	Infezione delle vie urinarie	Infezione della ferita chirurgica	Occlusione intestinale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1045	L'esantema rosso della scarlattina è dovuto:	alla tossina dello streptococco emolitico	a inalazioni di polveri	all'ingestione di coloranti	alla tossina difterica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1046	La pollachiuria è il segno più ricorrente nel:	cancro della vescica	cancro dell'esofago	cancro della mammella	ernia inguinale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1047	La preparazione fisica all'intervento chirurgico si effettua su base:	tutte le altre risposte sono corrette	alimentare	intestinale	vescicale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1048	La riduzione della termogenesi non si ha:	per fratture multiple	per deficit di alimenti	per deficit di ossigeno	per lesioni epatiche	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1049	Quale mezzo terapeutico è indicato per il gomito del tennista?	ghiaccio	massaggio	laserterapia	laccio emostatico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1050	Qual è la sostanza più importante nell'induzione dell'aggregazione piastrinica?	ADP	ATP	AA	PF4	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1051	Per quale via venosa si posiziona un filtro cavale?	Tutte le altre risposte sono corrette	Giugulare interna	Succlavia	Femorale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1052	I segni cardinali dell'infiammazione includono i seguenti fenomeni eccetto uno. Quale?	Iperfunzione	Calore	Tumefazione	Dolore	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1053	In una trasfusione, il plasma può essere usato:	tutte le altre risposte sono corrette	fresco	congelato	essiccato	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1054	In che modo possono essere somministrati farmaci per via endovenosa?	Tutte le altre risposte sono corrette	Attraverso l'iniezione diretta di medicinali in vena	Attraverso un'infusione continua o intermittente	Attraverso un'iniezione intermittente diretta (bolo o pressione)	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1055	Un prelievo di sangue arterioso può essere effettuato:	Tutte le altre risposte sono corrette	Dall'arteria omerale	Dall'arteria radiale	Dall'arteria femorale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1056	Nei criteri generali di terapia delle infezioni chirurgiche rientra:	tutte le altre risposte sono corrette	l'idratazione del paziente	il trattamento locale	il trattamento antibiotico	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1057	Il THF è :	un ormone timico	un ormone ipofisario	un ormone tiroideo	un autoanticorpo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1058	Da cosa è causata la rinite allergica:	pollini	polveri inorganiche	polipi nasali	fumo di tabacco	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1059	Indicare quale delle seguenti affermazioni riguardo l'asma professionale è esatta:	tutte le altre risposte sono corrette	è legata all'esposizione a polveri areodisperse, vapori o fumi	è legata all'azione di un agente specifico in grado di indurre broncospasma in soggetti sensibilizzati	determina un incremento persistente della responsività bronchiale aspecifica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1060	La toracentesi può essere:	tutte le altre risposte sono corrette	evacuativa	diagnostica	terapeutica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1061	La gangrena gassosa è una forma di necrosi associata a:	infezione da Clostridi	infezione da miceti	enfisema	tubercolosi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1062	Quale tra le caratteristiche di seguito citate non viene usata per descrivere il polso?	Mobilità	Frequenza	Qualità	Ritmo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1063	La trombosi è causata da:	edema	aumentata coagulazione del sangue	stasi della circolazione	alterazione endoteliale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1064	Le cause di morte più frequenti sono:	malattie cardiorespiratorie	malattie infettive	traumatismi	malattie dell'apparato respiratorio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1065	TNM significa:	tumore, linfonodi, metastasi	tumore non metastatizzato	tumore, neoplasia, metastasi	tessuto neoplastico e metastasi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1066	Le seguenti sono tutte vie di diffusione delle metastasi, tranne una. Quale?	Via transcutanea	Via linfatica	Via ematica	Via canalicolare	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1067	Il polyoma virus, agente responsabile di varie forme tumorali, è stato individuato:	nel topo	nel cane	nel gatto	nella scimmia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1068	Dove compaiono, di solito, le chiazze cutanee della morfea?	Tutte le altre risposte sono corrette	Sul tronco	Sul collo	Su mani e piedi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1069	In caso di dolore addominale, oltre all'esame del sangue o agli esami radiografici, quali altre indagini si possono effettuare?	Tutte le altre risposte sono corrette	Gastroscoopia	Laparoscopia	Colonscopia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1070	Quali sono le alterazioni qualitative della diuresi?	Tutte le altre risposte sono corrette	Ematuria	Emoglobinuria	Piuria	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1071	Il paziente in NPT richiede un frequente monitoraggio di:	tutte le altre risposte sono corrette	glicemia	emocromo/elettroliti	piastrine ed enzimi sierici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1072	Quale patologia, tra le seguenti, può generare granulomi?	Tubercolosi	Malaria	Echinococcosi	Diabete	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1073	L'allergene è :	un gene responsabile di manifestazioni allergiche	una proteina prodotta da mastociti di soggetti allergici	una molecola dotata di tossicità intrinseca	una molecola in grado di innescare una reazione immunopatogena IgE mediata	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1074	La cariolisi è definibile come:	processo di digestione della cromatina	processo di sintesi della membrana nucleare	processo di riproduzione cellulare	processo di trascrizione del DNA	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1075	Quale tra queste condizioni non comporta un aumento della temperatura corporea?	L'ipotiroidismo	Un abnorme sforzo muscolare	Una prolungata esposizione al sole	Una condizione di sopraggiunta ipertermia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1076	Un granuloma può essere l'effetto di:	un'inflammatione dovuta alla presenza di un corpo estraneo all'interno dell'organismo	una lesione cutanea lacero-contusa	un'infezione da rinovirus	un'infezione malarica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1077	Calore, dolore, arrossamento, gonfiore e perdita di una funzione sono i reperti semendogici tipici di:	inflammatione	febbre	colpo di calore	ipertensione	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1078	Un'alterazione citoscheletrica durante lo sviluppo intrauterino può causare:	situs inversus viscerum	sindrome di Down	sindrome di Asperger	sindrome di Ménière	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1079	Qual è una delle complicanze più frequenti del reflusso gastroesofageo?	L'insorgere di esofagite	La presenza di ematuria	Un dolore persistente nella fossa iliaca destra	L'insorgere di fenomeni febbrili	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1080	Tra le seguenti, una non può essere considerata una complicanza del diabete mellito. Quale?	Insufficienza respiratoria	Neuropatia centrale	Neuropatia periferica	Nefropatia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1081	L'insulinoma può implicare l'insorgenza di:	crisi ipoglicemiche	emorroidi	crisi ipertensive	ulcera peptica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1082	La ipercolesterolemia familiare implica spesso un aumento dei livelli plasmatici di colesterolo. Tra gli esiti si pu apprezzare:	aterosclerosi	arteriosclerosi	diabete mellito	diabete insipido	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1083	Se non trattata precocemente, una condizione di ipotiroidismo nel neonato pu determinare l'insorgenza di:	ritardo mentale grave	diabete mellito	ritardo mentale lieve	infezioni sporadiche	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1084	Tra le patologie metaboliche, la gotta è generata da:	eccesso di acido urico	eccesso di lipidi	deficit di colesterolo	eccesso di glucosio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1085	Quando si manifesta l'angoscia per l'estraneo?	7-8 mesi	2-3 anni	5-6 anni	10-11 anni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1086	In quale delle seguenti patologie endocrinologiche infantili è presente insufficienza mentale?	Ipotiroidismo	Ipertiroidismo	Diabete mellito	Ipersurrenalismo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1087	In quale delle seguenti malattie può verificarsi il fenomeno astasia/abasia?	Nevrosi isterica	Nevrosi ossessiva	Schizofrenia	Insufficienza mentale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1088	La triade di Charcot (nistagmo, tremore intenzionale, parola scandita) si riscontra in:	sclerosi multipla	sindrome di Louis-Bar	malattia di Bourneville	parkinsonismo giovanile	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1089	Le reazioni di tipo ossessivo dell'anziano nascondono per lo più da:	stati depressivi	metastasi cerebrali	una personalità psicopatica esplosiva	un viraggio maniacale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1090	A quale dei seguenti messaggi corrisponde la disconferma?	Tu non esisti	Ti rifiuto	Condivido quello che dici	Sbagli	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1091	La malattia organica con cui è più importante porre la diagnosi differenziale rispetto all'anoressia mentale è :	il morbo di Simmonds	la tubercolosi	l'ipertiroidismo	la colite ulcerosa	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1092	La vicarianza delle attitudini nelle persone anziane è :	supplire ai deficit dovuti all'età utilizzando e potenziando altre funzioni e fattori	mutare, in età avanzata, i propri interessi nelle attività ludiche	desiderare, a una certa età, il cambiamento negli orari di sonno-veglia	la tendenza, nella senescenza, ad essere meno efficienti a metà giornata	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1093	La prognosi dell'anoressia mentale:	non può essere ritenuta decisamente sfavorevole, grazie anche agli attuali sussidi psicoterapeutici	è riservata o infausta per la tendenza all'exitus per inanizione	dipende dalla guarigione della lesione neurologica che ne è la causa	è favorevole se si instaura un intervento psicoterapeutico che i pazienti mostrano di cercare e di gradire	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1094	L'empatia è :	il riprodursi in noi di uno stato affettivo simile a quello di un altro	sinonimo di simpatia	la mancanza di risonanze affettive	la risonanza affettiva tipica degli isterici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1095	La definizione più corretta di tic :	un movimento involontario e ricorrente non ritmico	un movimento coreiforme	un movimento volontario	un movimento mioclonico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1096	La fobia ossessiva si intende riferita a:	qualsiasi tipo di oggetti e situazioni	oggetti esclusivamente inanimati	oggetti esclusivamente animati	contenuti ideativi a carattere sessuale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1097	La schizofrenia ebfrenica è caratterizzata da:	marcata fatuità	depressione dell'umore	ruminazione su tematiche esistenziali	delirio lucido ben sistematizzato	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1098	Le allucinazioni nella schizofrenia sono prevalentemente:	uditiv e visive	tattili	cenestesiche	visive	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1099	Quali sono le disfunzioni sessuali maschili più frequenti nella pratica clinica?	Impotenzia coeundi secondaria; eiaculazione precoce	Impotenza assoluta; incapacità eiaculatoria	Impotenza relativa; eiaculazione precoce	Impotenza relativa; mancanza di desiderio sessuale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1100	Che cos'è lo stress?	Una risposta aspecifica dell'organismo a una qualsiasi richiesta esterna	Una risposta specifica dell'organismo a qualsiasi richiesta effettuata su di esso	Un complesso stimolo-risposta a significato patogeno	L'insieme delle condizioni esistenziali negative che possono condurre alla malattia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1101	Le psicosi croniche degli epilettici sono:	di tipo paranoicale o schizofrenico	di tipo parafrenico	di tipo maniacale	psicosi puerperali	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1102	Com'è lo stato di coscienza durante un attacco isterico?	Crepuscolare	Confusionale	Oniroide	Assente	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1103	La Psicologia è una scienza che studia il comportamento inteso come:	espressione della personalità	espressione della maturità	espressione dei condizionamenti ambientali	espressione di patologie	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1104	Quale tra i seguenti costituisce un metodo d'indagine della Psicologia?	Metodo sperimentale	Metodo razionale	Metodo ipotetico-deduttivo	Metodo intuitivo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1105	Cosa si intende per pensiero divergente?	La capacità di fornire risposte diverse a un unico problema	La capacità di fornire un'unica soluzione, quella esatta, a un determinato problema	La capacità di porre problemi	Lo spirito critico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1106	Per condizionamento operante si intende un comportamento:	attivo	passivo	punitivo	patologico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1107	Qual è il nome del pediatra e terapeuta per l'infanzia che ha parlato di spazio transizionale?	Donald Winnicott	René Spitz	Jean Piaget	Frederic Skinner	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1108	Che cosa sono le discinesie?	Paralisi cerebrali infantili	Nevrosi	Disturbi dell'apprendimento	Disturbi della personalità	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1109	Quale fra i seguenti non è un disturbo della percezione?	L'afasia	L'agnosia	Le allucinazioni	Le illusioni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1110	La paropressia è tipica:	degli epilettici	dei non vedenti	dei non udenti	dei paraplegici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1111	L'afasia può essere:	ricettiva	cognitiva	psicologica	proprioceettiva	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1112	L'afasia può essere causata da:	lesioni della corteccia cerebrale	schizofrenia	anomalie cromosomiche	paresi facciali	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1113	Il farmaco elettivamente impiegato nel piccolo male è :	valproato sodico	idantoïnico	barbiturico	benzodiazepinico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1114	I barbiturici possono determinare:	induzione enzimatica epatica	induzione enzimatica cerebrale	alterazioni oculari	crisi neurodislettiche	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1115	L'epilessia è:	un disturbo delle funzioni del sistema nervoso centrale	una forma di nevrosi	una caratteropatìa	una formazione tumorale localizzata nell'encefalo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1116	La dismorfofobia è :	la paura della deformazione corporea	la paura di cadere	la paura della solitudine	la paura dei fantasmi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1117	L'angoscia di castrazione si verifica nella fase di sviluppo:	edipica	di latenza	orale	puberale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1118	Il pavor nocturnus è :	una manifestazione d'ansia	una malattia metabolica	una manifestazione allucinatoria	la paura dei volatili	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1119	L'insorgenza del piccolo male si verifica più frequentemente:	nella II e III infanzia	nell'età puberale	nell'adolescenza	nel I anno di vita	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1120	Il piccolo male è caratterizzato da:	assenze	spasmi	crisi toniche generalizzate	crisi motorie parziali	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1121	Nella fobia scolare sono presenti più frequentemente:	conati di vomito	tachicardia	febbre	blefarospasmo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1122	Cosa si intende con il termine prassia?	Capacità di compiere un atto finalizzato	Capacità di compiere movimenti	Capacità di riconoscere l'attività fisica	Disturbo dell'attività motoria	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1123	Cosa si intende con il termine gnosià?	Capacità di riconoscere il significato della realtà	Disturbo sensoriale	Disturbo psicosomatico	Capacità di riconoscere volti noti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1124	Che tipo di personalità ha un soggetto psicopatico?	Antisociale	Depressa e malinconica	Aggressiva	Fobico-ossessiva	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1125	L'ansia libera fluttuante è :	l'ansia senza oggetto	l'ansia che cambia oggetto	l'ansia accompagnata da idee deliranti	l'ansia con oscillazioni di intensità	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1126	L'evoluzione delle demenze microinfartuali è :	lenta, a pousses	rapida, con aggravamenti preannunciati da momenti di benessere	lenta, lineare	rapida, lineare	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1127	Perché nella teoria dei sistemi si parla di modello di causalità circolare?	Perché si dà importanza alle connessioni reciproche tra le parti di un sistema e all'influenza tra di loro	Perché non si ritiene importante la ricerca delle cause	Perché si pensa che un sistema sia meglio rappresentabile da un cerchio che da una linea	Perché si valorizzano i rapporti causa-effetto nella spiegazione dei fenomeni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1128	Che cos'è, nella comunicazione, il livello di relazione?	E' il complesso di messaggi che informano sul modo in cui deve essere ricevuta una notizia e quindi definiscono la relazione tra i comunicanti	Corrisponde alla comunicazione gestuale	E' tutto ciò che, riferendosi alla relazione, è sempre in primo piano in ogni comunicazione	Si riferisce ai discorsi i cui contenuti riguardano la relazione tra i comunicanti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1129	L'apatia è :	la mancanza di risonanze sentimentali	l'enfaticizzazione dei sentimenti	la mancanza di volontà	la perdita del linguaggio interiore	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1130	Secondo il Codice Civile italiano, devono essere interdetti il maggiore di età o il minore emancipato quando:	si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi	si trovano in condizione di eccezionale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi	si trovano in condizioni di infermità di mente tali da ledere gli interessi dei propri familiari	si trovano in condizione di saltuaria infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1131	Il soggetto confuso è frequentemente:	perplesso	depresso	scarsamente ansioso	sicuro di sé	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1132	Quale dei seguenti sintomi è assente nella sindrome presuicidaria?	Fuga delle idee	Restringimento del campo di pensiero	Isolamento	Idea di morte	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1133	Secondo la teoria organismica di Goldstein, l'organismo :	ben più della somma delle parti che lo costituiscono	molto meno delle sue parti costitutive	costituito in parti uguali da psiche e soma	costituito semplicemente dalla somma delle sue parti	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1134	Cos'è lo schema corporeo?	La rappresentazione mentale del proprio corpo	La formazione della struttura ossea	La raggiunta maturazione dell'intero apparato scheletrico	La rappresentazione grafica del proprio corpo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1135	La dislessia consiste nell'incapacità di:	imparare a leggere	apprendere il disegno	apprendere il linguaggio	imparare a scrivere	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1136	Quale tra i seguenti non è un sintomo della discalculia?	Difficoltà nel percepire il materiale concreto	Difficoltà di ragionamento astratto	Timore di perdere il contatto con il reale	Difficoltà di memoria uditiva	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1137	La desensibilizzazione sistematica è una terapia:	comportamentale	di riabilitazione neuromotoria	farmacologica	disintossicante	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1138	L'agorafobia è :	la paura degli spazi aperti	la paura degli aerei	la paura della morte	la paura delle armi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1139	La balbuzie può essere:	tutte le altre risposte sono corrette	reattiva	tonica	clonica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1140	Il testo di Goodenough prevede il disegno di:	un omino	una casa	una famiglia	un albero	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1141	Il concetto di holding (accudimento) è stato introdotto da:	Jung	Winnicott	Klain	Freud	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1142	La presbifrenia è :	una demenza senile caratterizzata da confabulazioni	una demenza presenile caratterizzata da aspetto veccheggianti	una forma di oligofrenia	una forma di eccitamento maniacale senile	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1143	Tra i fattori ereditari che influenzano lo sviluppo psichico di un individuo non rientra:	l'influenza della famiglia	l'attività motoria	la costituzione somatica	il ritmo di sviluppo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1144	La possibilità di compiere l'atto sessuale solo con la mediazione di un oggetto prende il nome di:	feticismo	onanismo	sadismo	anorgasmia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1145	Il sonno REM nella depressione è per lo più:	diminuisce	si prolunga	aumenta	rimane invariato	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1146	Cos'è la dominanza laterale?	La preminenza di organi o di arti situati in una determinata parte (destra o sinistra) del corpo	La maggiore specializzazione dell'emisfero destro	Un disturbo neurologico	Un difetto dell'apparato scheletrico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1147	La legge 833/1978 vieta:	i manicomi	gli accertamenti sanitari obbligatori per malattia mentale	i servizi territoriali di psichiatria	i reparti psichiatrici in ospedale generale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1148	L'elemento psichico dello psichismo ossessivo è :	il dubbio	il delirio di rovina	il delirio persecutorio	l'euforia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1149	Quale dei seguenti termini non si riferisce a meccanismi di difesa?	Riflessione	Identificazione	Regressione	Rimozione	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1150	L'ipocondria è:	può coesistere con una malattia somatica reale	alla lunga determina una malattia somatica	non può mai coesistere con una malattia somatica reale	può coesistere solo con una malattia somatica reale, ma diversa da quella di cui il paziente si preoccupa	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1151	L'allucinosi è:	una percezione senza oggetto	una diplopia	un'allucinazione elementare	uno stato allucinatorio cronico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1152	Il delirio paranoicale si distingue dal delirio paranoideo, oltre che per altri caratteri, anche per:	l'assenza di disturbi psicosensoriali	la tendenza alla confabulazione	segni di deficit intellettivo	l'assurdità del tema	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1153	In cosa consiste il trattamento psicologico dei capricci infantili?	Nell'evitare di prestare attenzione ai bambini che attuano comportamenti disadattivi per evitare di rinforzarli	Nel rispondere prontamente a ogni richiesta del bambino	Nel punire sistematicamente i comportamenti disadattivi	Nel proteggere il bambino dalle difficoltà e dalle frustrazioni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1154	Quale dei seguenti non costituisce un trattamento per la cura della bulimia?	Riposo e antibiotici	Psicoterapia a impronta cognitiva	Impiego di farmaci antidepressivi	Psicoterapia a impronta psicoanalitica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1155	La demenza è un disturbo che si manifesta più frequentemente durante:	età senile	adolescenza	età evolutiva	infanzia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1156	L'uso protratto di anfetamine può comportare:	la slatentizzazione di una psicosi	crisi oculogire	il sorgere di una psicosi	la slatentizzazione di una nevrosi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1157	La pseudoinsufficienza mentale può essere determinata da:	tutte le altre risposte sono corrette	disturbi neuropsicologici	disturbi emotivi	deficit sensoriali	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1158	Dov' è situato il centro del linguaggio di Wernicke?	Lobulo parietale inferiore dell'emisfero sinistro	Prima e seconda circonvoluzione temporale destra	Seconda e terza circonvoluzione frontale destra	Area calcarina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1159	La sindrome di Down può essere legata a:	tutte le altre risposte sono corrette	trisomia 21 in mosaico	trisomia 21 da traslocazione G/G	trisomia 21 libera	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1160	I disturbi somatoformi comprendono tutti i seguenti, tranne:	disturbo di derealizzazione	ipocondria	disturbo da dolore somatoforme	disturbo da conversione	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1161	La claustrofobia è :	la paura dei luoghi chiusi	la paura degli animali	la paura degli estranei	la paura del contagio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1162	L'acrofobia è :	la paura delle altezze	la paura dei temporali	la paura dei terremoti	la paura delle dita	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1163	In quale condizione si può verificare mutismo elettivo?	Nevrosi	Paralisi	Sordità	Deficit intellettivo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1164	La formazione reattiva è :	un meccanismo di difesa	un tipo di nevrosi	un tipo di psicosi	un sintomo depressivo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1165	Le convulsioni febbrili si differenziano da quelle epilettiche per:	tutte le altre risposte sono corrette	esame obiettivo negativo	anamnesi negativa	durata	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1166	A quale età tende a strutturarsi la nevrosi ossessiva?	Oltre i 10 anni	2-4 anni	5-7 anni	6-8 anni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1167	L'ereutofobia è la paura:	di arrossire	degli animali	del colore rosso	delle malattie infettive	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1168	Da chi fu ideata la prima scala di sviluppo intellettuale?	Binet-Simon	Duss	Freud	Jung	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1169	La sublimazione consiste nel:	trasformare gli impulsi in attività socialmente approvate	rimuovere gli impulsi libidici	trasformare gli impulsi non accettati nel loro opposto	trovare giustificazioni per il proprio comportamento	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1170	La depressione in età evolutiva è prevalentemente:	reattiva	endogena	strutturata	primaria	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1171	La sindrome di Gilles de la Tourette è caratterizzata da:	tic e coprolalia	autismo e stereotipie	epilessia e manie	riduzione del Q.I.	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1172	L'ipsaritmia è :	un'alterazione dell'attività elettrica cerebrale	un'alterazione del sonno	un'alterazione del controllo sfinterico	un'alterazione ormonale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1173	La blesit può essere:	tutte le altre risposte sono corrette	sintomo di immaturità nell'articolazione fonetica	sintomo di deficit di sviluppo cognitivo	sintomo di paralisi cerebrale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1174	L'anoressia mentale è :	tutte le altre risposte sono corrette	più frequente nel sesso femminile	più frequente nell'adolescenza	a volte associata ad amenorrea	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1175	L'autismo è sintomo di:	psicosi	isteria	fobie	stress da guida	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1176	E' vero che uno stato di malessere organico influisce sulla psiche?	Sì, ma soltanto quando l'individuo presenta anche disturbi psichici	Sì, sempre	No, in alcun caso	Raramente	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1177	In presenza di encopresi psicogena la diagnosi differenziale va posta con:	tutte le altre risposte sono corrette	insufficienza mentale grave	colite ulcerosa	malattia di Hirschprung	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1178	Le reazioni isteriformi dell'anziano sono spesso dovute a:	malattie organiche	cambiamenti climatici repentini	soggiorni in alta montagna	viaggi in aereo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1179	Il disturbo di evitamento di personalità deve essere differenziato da:	tutte le altre risposte sono corrette	evitamento nel disturbo di panico con agorafobia	bisogno di assicurazione nel disturbo dipendente di personalità	isolamento sociale nel disturbo schizoide di personalità	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1180	Il flooding (inondamento) è una tecnica psicoterapeutica:	diretta a bloccare il meccanismo di mantenimento delle fobie rappresentato dal comportamento di evitamento	atta a stimolare il pensiero creativo	mirante a indurre il paziente depresso a fronteggiare situazioni temute	mirante al superamento delle difficoltà interpersonali del paziente fobico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1181	Chi abbia un atteggiamento di continua riflessione sullo stato somatico, alla ricerca di segni di malattia, si definisce:	ipocondriaco	maniaco	psicolabile	isterico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1182	L'egocentrismo patologico è una manifestazione psichica tipica di:	psicopatie	intossicazione da psicofarmaci	comportamento criminale	schizofrenia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1183	Le cenestopatie sono:	sensazioni corporee sgradevoli, imprecise e migranti	disturbi tipo astasia/abasia	allucinazioni olfattive	cefalee muscolo-tensive	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1184	L'amnesia retrograda è un disturbo della memoria caratterizzato principalmente da:	disturbo della rievocazione degli engrammi	disturbo della fissazione degli engrammi	disturbo della localizzazione spaziotemporale del ricordo	aprassia costruttiva	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1185	L'amnesia sistematizzata è una lacuna di ricordi che si riferisce:	a un tema fondamentale e ai fatti a questo collegati	a un determinato periodo	a nozioni di argomenti vari	alla possibilità di fare calcoli	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1186	La nozione di normalità è sinonimo di:	benessere psichico	benessere fisico	salute fisica e mentale	assenza di malattie	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1187	L'autismo è una psicosi che si presenta prevalentemente:	nella prima infanzia	in età adulta	nell'adolescenza	al momento della nascita	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1188	Quale dei seguenti sintomi non caratterizza la sindrome di Down?	Macrocefalia	Insufficienza mentale	Brachicefalia	Epicanto	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1189	L'intervento di Jatene implica:	la correzione della trasposizione dei grossi vasi	la chiusura di un difetto interatriale	la rimozione di un difetto interatriale	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1190	In presenza di perforazione intestinale, l'esame radiologico evidenzia:	doppio binario	presenza di addensamento a livello gastrico	presenza di aria al di sotto del diaframma	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1191	La lussazione traumatica è frequente a livello della:	spalla	mano	anca	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1192	La gastrectomia totale consiste nell'asportazione di un intero organo. Quale?	Stomaco	Milza	Intestino	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1193	Indicare quale tra le seguenti affermazioni è falsa:	il pneumotorace colpisce solo l'età adulta	il pneumotorace può essere «a valvola»	il pneumotorace può essere «spontaneo»	il pneumotorace può apparire in alcuni casi «aperto»	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1194	Trauma toraco-addominale sinistro. Indicare la complicanza:	rottura della milza	fratture multiple	pneumotorace	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1195	Quale, tra le seguenti, può essere causa di addome acuto?	Diverticolite	Morbo di Crohn	Frattura di un arto	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1196	L'intervento di Nissen è :	una funduplicatio	una gastrectomia subtotale	l'asportazione dello stomaco	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1197	Stenosi ipertrofica del piloro. Qual è il trattamento chirurgico indicato?	Piloromiotomia extramucosa	Gastrectomia subtotale	Asportazione dello stomaco	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1198	La frattura di Poteau-Colles interessa:	metafisi distale del radio	fibula e tibia	omero	polso e avambraccio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1199	Copioso sanguinamento della mano. Indicare a che livello deve essere posto il laccio emostatico:	al braccio	al polso	al gomito	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1200	Indicare la localizzazione dei diverticoli di Zenker:	esofago	stomaco	reni	retto	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1201	Acalasia. Indicare il trattamento utile:	miotomia extramucosa secondo Heller	terapia farmacologica	endoscopica	radioterapia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1202	La colpotomia è un intervento chirurgico che consiste nel praticare un'incisione:	nella vagina per svuotare un ascesso localizzato nel piccolo bacino	per il drenaggio di un ematoma	in cui parte del colon viene estroflessa	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1203	Indicare quale tra le seguenti opzioni si riferisce ai fattori di rischio per neoplasie a livello gastrico:	alimentazione sbagliata	disfunzioni epatiche	nessuna delle altre risposte è corretta	età maggiore ai 30 anni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1204	Il trattamento chirurgico della tiroide implica il rischio di complicanze. Indicare quale tra i seguenti.	Lesione ricorrentiale	Lesione vascolare	Nessuna delle altre risposte è corretta	Infezione sistemica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1205	In casi di atresia dell'esofago con presenza di fistola tracheoesofagea superiore, le caratteristiche morfologiche dell'addome lo mostrano:	incavato	disteso	nessuna delle altre risposte è corretta	dilatato	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1206	Il dolore della pancreatite si segnala per:	l'irradiazione a «barra»	l'irradiazione della spalla destra	nessuna delle altre risposte è corretta	l'andamento colico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1207	Quale tra questi non è un sintomo caratteristico del pneumotorace?	Febbre	Alterazioni respiratorie	Alterazioni circolatorie	Dispnea	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1208	Pneumotorace a valvola. Indicare la prima manovra da eseguire:	detendere il torace	misurare la pressione arteriosa	effettuare una lastra	TC del torace	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1209	Qual è l'eziopatogenesi della sindrome di Ciuffini-Pancoast?	La presenza di formazioni neoplastiche nelle radici del plesso branchiale	Una neoplasia alla base polmonare destra	Una neoplasia alla gola	L'insorgenza di fratture costali	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1210	Il callo osseo è definibile come:	l'esito cicatriziale di una frattura	una neoplasia benigna allo scheletro	nessuna delle altre risposte è corretta	una lesione ossea	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1211	Indicare quale zona può essere lesa accidentalmente nella chirurgia della tiroide:	il nervo laringeo superiore	il nervo vago	nessuna delle altre risposte è corretta	l'arteria tiroidea	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1212	Il segno di Blumberg indica l'infiammazione:	peritoneale	laringea	nessuna delle altre risposte è corretta	della tiroide	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1213	Cos'è l'apparecchio di Forlanini?	Un macchinario utilizzato per provocare il pneumotorace	Un macchinario per misurare la pressione arteriosa	Nessuna delle altre risposte è corretta	Un macchinario emoanalizzatore	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1214	Il filtro di Mobin-Uddin è utilizzabile per:	scongiorare rischi di embolia polmonare	evitare forme di dialisi peritoneale	nessuna delle altre risposte è corretta	ridurre la pressione renale	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1215	In un caso di neoplasia polmonare di modeste dimensioni, l'intervento indicato è :	lobectomia	nessuna delle altre risposte è corretta	pneumectomia	segmentectomia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1216	Tracheotomia. L'incisione della trachea deve essere eseguita:	a livello della II-III cartilagine	nessuna delle altre risposte è corretta	a livello della V-VI cartilagine	a livello della VI-VII cartilagine	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1217	L'ernia di Morgagni è definibile come:	ernia diaframmatica anteriore	nessuna delle altre risposte è corretta	ernia del muschio	ernia della linea alba	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1218	Carcinoma della testa pancreatica. Indicare qual è l'intervento chirurgico da praticare:	duodenocefalopancreasectomia	nessuna delle altre risposte è corretta	billroth I	billroth II	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1219	Carcinoma della prostata. Qual è la terapia indicata?	Ormonoterapia	Nessuna delle altre risposte è corretta	Emiprostectomia	Tumorectomia per via endoscopica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1220	In quali casi il morbo di Crohn necessita di terapia chirurgica?	Stenosi intestinale	Nessuno	Presenza di fistole	Malattia perianale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1221	Indicare quale, tra queste, è una delle possibili cause di rettorragia:	rettocolite ulcerosa	ulcera duodenale	cancro dell'esofago	cancro del colon-retto	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1222	La localizzazione più frequente del melanoma, dopo cute e occhio, è:	ano	sistema nervoso centrale	pancreas	sistema linfatico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1223	La formazione di un volvolo è favorita da:	briglie aderenziali	nessuna delle altre risposte è corretta	occlusione intestinale	ernia iatale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1224	Quali valori può assumere il grado di differenziazione di un tumore (G)?	4	7	1	3	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1225	In caso di invaginazione colocolica si pu intervenire risolutivamente attraverso una delle seguenti manovre:	tutte le altre risposte sono corrette	può risolversi spontaneamente	utilizzando un clisma opaco	effettuando l'evaginazione manuale a cielo aperto	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1226	Calcolosi della colecisti: indicare le modalità di intervento.	Colecistectomia laparoscopica	Radioterapia	Terapia farmacologica	Terapia con ultrasuoni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1227	Atresia esofagea. Indicare quante tipologie sono possibili.	5	9	7	2	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1228	Quali tra i seguenti tumori del fegato è più frequente in età pediatrica?	Epatoblastoma	Sarcoma	Mieloma	Emangiosarcoma	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1229	La cifosi è definibile come:	aumento della fisiologica curvatura dorsale del rachide	spostamento di una vertebra rispetto a quella sottostante	deficit permanente laterale del rachide	curvatura delle vertebre lungo l'asse longitudinale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1230	Atresia esofagea con fistola superiore. Indicare il segno clinico:	nessuna delle altre risposte è corretta	distensione addominale	addome acuto	addome a tavola	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1231	Il segno di Murphy indica:	calcolosi della colecisti	patologie a carico dei reni	ulcera duodenale	rischio di neoplasie gastriche	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1232	L'ileo paralitico può insorgere a seguito di:	tutte le altre risposte sono corrette	peritonite acuta	manipolazioni operatorie	infezioni acute di organi extra-addominali	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1233	Atresia delle vie biliari. Indicare il sintomo in età precoce:	nessuna delle altre risposte è corretta	ittero con bilirubina non coniugata	ittero con bilirubina coniugata	ittero a prevalente bilirubina diretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1234	Indicare quali tra i seguenti elementi possono generare ulcere cutanee:	tutte le altre risposte sono corrette	neoplastici	metabolici	infettivi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1235	Quale tra i seguenti accertamenti appare inutile in caso di calcolosi renale da acido urico?	Rx diretta	Urografia	Scintigrafia renale	TC	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1236	Megacolon. Indicare la terapia efficace:	resezione del segmento a valle della dilatazione	ileostomia	ileano-anastomosi	colectomia totale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1237	Quanti sono i segmenti epatici secondo Couinaud?	8	4	5	7	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1238	Quali possono essere le complicanze post-operatorie immediate compromettenti la funzione respiratoria?	Ostruzione delle vie aeree	Infezione delle vie urinarie	Infezione della ferita chirurgica	Occlusione intestinale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1239	La preparazione fisica all'intervento chirurgico si effettua su base:	tutte le altre risposte sono corrette	alimentare	intestinale	vescicale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1240	Si definisce ormone una sostanza in grado di:	entrare in circolo e determinare «effetti» su cellule bersaglio	essere sintetizzata da una cellula e agire sulla stessa cellula	entrare nel circolo linfatico e determinare «effetti» su cellule bersaglio	stimolare il sistema immunitario verso cellule bersaglio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1241	La disfunzione erettile può essere associata a:	diabete	uretriti	prostatite acuta	neoplasia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1242	Il primo segno di sviluppo puberale nella donna è :	la comparsa di sviluppo mammario	la perdita di peso	il menarca	il rigonfiamento dell'addome	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1243	Il metabolismo basale è influenzato:	dagli ormoni tiroidei	dal progesterone	dal cortisolo	dall'estradiolo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1244	Gli ormoni steroidei:	vengono rapidamente sintetizzati da precursori e secreti nel torrente circolatorio	sono conservati come pro ormoni nelle cellule bersaglio	vengono sintetizzati e agiscono nelle cellule secernenti	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1245	All'aumentare del glucosio plasmatico, aumenta la sintesi di:	insulina	cortisolo	GM-CSF	eritropoietina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1246	La principale complicanza nell'ipercolesterolemia familiare è:	la cardiopatia ischemica	l'angina pectoris	l'ictus cerebri	l'aneurisma polmonare	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1247	Il fattore che regola la spermatogenesi è:	l'FSH	il calcitriolo	nessuna delle altre risposte è corretta	l'arginina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1248	Di quali delle seguenti condizioni è responsabile l'insulinoma?	Ipoglicemia spontanea	Ipoglicemia postprandiale	Intolleranza al glucosio	Iperglicemia e alcalosi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1249	Come viene definita una secrezione paracrina?	La secrezione di ormoni che agiscono su cellule vicine	Nessuna delle altre risposte è corretta	La secrezione di ormoni che agiscono a distanza	La secrezione di ormoni che si riversano nel circolo sanguigno	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1250	Tra i seguenti, quale aminoacido è essenziale?	Leucina	Glutamina	Arginina	Prolina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1251	Durante la menopausa i sintomi principali sono:	vampate di calore e sudorazione notturna	cefalea a grappolo	sonnolenza e irritabilità	perdite di memoria	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1252	Si possono mettere in relazione l'aumento del peso corporeo e l'aumento della pressione arteriosa?	Sì, ed è significativo nei principali studi epidemiologici	Non sempre, dipende dal peso	No, in nessun caso	Sì, ma non è significativo nei principali studi epidemiologici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1253	Quale parametro si utilizza nella pratica clinica per effettuare una diagnosi di obesità?	L'indice di massa corporea (BMI)	La tabella dei rischi cardiovascolari	la formula di Broca	Le tabelle del peso ideale sulla base dell'altezza	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1254	In medicina il colloide è definito come:	la formula di immagazzinamento della tireoglobulina nel lume del follicolo tiroideo	la secrezione delle cellule parafollicolari	l'essudato delle arterie del collo	la forma di immagazzinamento dello iodio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1255	La lesione da pressione è:	una lesione cutanea protratta nel tempo non tendente alla guarigione	una lesione cutanea che guarisce spontaneamente	un'ulcera del piede diabetico	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1256	Nel paziente anziano si osserva prevalentemente:	artrosi	sindrome da immunoricostruzione	sindrome mieloproliferativa	ittero da sindrome di Dubin-Johnson	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1257	Per evitare la formazione di una lesione da pressione sacrale, quale posizione deve evitare il paziente?	Supina	Laterale sinistra 90°	Nessuna delle altre risposte è corretta	In piedi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1258	Quale sostanza viene utilizzata per ridurre il rischio di infezioni da anaerobi in caso di piaghe da decubito?	H2O2	Penicillina	Alcool etilico	Soluzione di cloruro di sodio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1259	La genesi di una lesione da pressione è rappresentata da:	infiammazione e distruzione dell'epidermide	necrosi progressiva	apoptosi delle cellule sottocutanee	riduzione del derma	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1260	La lesione da pressione nell'anziano si forma prevalentemente nella zona:	sacrale	ascellare	malleolare	calcaneare	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1261	Quale procedura è particolarmente utile adottare in caso di paziente anziano allettato?	Tutte le altre risposte sono corrette	La mobilizzazione	La fisioterapia	L'eliminazione degli sfregamenti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1262	Per causare una lesione da pressione, quanta pressione deve essere esercitata?	Nessuna delle altre risposte è corretta	17 mmHg	36 mmHg	43 mmHg	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1263	L'indice di Norton serve per valutare:	il rischio di insorgenza di piaghe da decubito nel paziente anziano	lo stato di vigilanza di una persona anziana	la vitalità degli spermatozoi nell'uomo	la condizione di salute del neonato	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1264	Quale strumento chirurgico viene utilizzato per pulire una lesione da pressione?	Tutte le altre risposte sono corrette	Pinze di Cocker	Bisturi	Forbici e pinze	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1265	Quanto tempo passa tra l'ovulazione e la successiva mestruazione?	sempre 14 giorni	12-14 giorni	28 giorni	14-28 giorni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1266	Che cosa si intende per aborto interno?	L'aborto senza espulsione del feto	L'aborto con espulsione del feto	L'aborto con espulsione del feto nella cavità addominale	Tutte le altre risposte sono corrette	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1267	Durante l'ovulazione, la temperatura vaginale è:	< 36.5°C	37°C	> 37°C < 39°C	> 38°C	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1268	Una rarissima sede per una gravidanza ectopica è:	addominale	angolare	ampollare	non esiste una sede rara per le gravidanze ectopiche	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1269	Nella donna adulta la misura della vagina è:	6-8 cm	10-15 cm	18-22 cm	24-26 cm	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1270	La lochiazione viene definita come:	il processo fisiologico che si verifica dopo il parto consistente in perdite ematiche dall'utero che durano per V-VI settimane	una emorragia vaginale da lacerazione	lo stato di depressione successivo al parto	perdita di sangue preparto	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1271	Cosa si intende per bregma?	La regione circostante la grande fontanella	La regione circostante la piccola fontanella	La regione laterale destra del feto	La regione laterale sinistra del feto	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1272	In quale delle seguenti tipologie di parto si utilizza la manovra di Mauriceau-Smellie-Veit?	Nel parto podalico	Nel parto di bregma	Nel parto di spalla	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1273	Quanto latte al giorno viene prodotto tra il IV e il V mese di puerperio?	700-800 cc	900-1000 cc	1100-1300 cc	>1400 cc	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1274	Quale dei seguenti non costituisce uno degli scopi per i quali è stato creato il servizio pubblico di assistenza alla famiglia e alla maternità?	Produzione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia in ordine alla procreazione responsabile	Tutela della salute fisica della donna	Tutela del prodotto del concepimento	Assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla paternità responsabile	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1275	Nella XL settimana di gestazione la quantità di liquido amniotico è :	800 cc	1200 cc	1700 cc	300 cc	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1276	In Italia, per legge, si può interrompere volontariamente la gravidanza entro:	90 giorni	150 giorni	180 giorni	30 giorni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1277	Si parla di patologia del secondamento dopo quanto dal parto?	30-60 minuti	80-150 minuti	24 ore	10-20 minuti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1278	Nell'oligoidramnios la quantità di liquido amniotico è di:	< 500 cc	1200-1500 cc	< 2000 cc	1000 cc	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1279	Fino a quale settimana si parla ancora di embrione?	Fino alla VIII settimana	Fino alla X settimana	Fino alla XVI settimana	Fino alla VII settimana	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1280	Quanto dura una gravidanza?	40 settimane	48 settimane	30 settimane	36 settimane	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1281	Di solito quando avviene la perdita del tappo mucoso da parte della donna in gravidanza?	Al momento dell'inizio del travaglio	Al momento dell'espulsione della placenta	Al momento della prima visita ginecologica post partum	Al momento dell'espulsione del feto	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1282	Qual è la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza?	L. 194/1978	D.Lgs. 502/1992	L. 40/2004	L. 833/1978	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1283	Il test di gravidanza su sangue ricerca quale dei seguenti parametri?	bHGC	T4	LH	CEA	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1284	Biologicamente i gemelli omozigoti sono:	gemelli nati da 1 ovulo e 1 spermatozoo	gemelli nati da 1 ovulo e 2 spermatozoi	gemelli sempre di sesso diverso	gemelli nati da 2 ovuli e 1 spermatozoo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1285	Cosa viene definito in ginecologia con il termine secondamento?	Il distacco e l'espulsione della placenta	Il distacco della placenta	L'espulsione dell'eventuale secondo feto	Le prime contrazioni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1286	Di solito al momento del parto la presentazione del feto è :	di vertice	supina	di faccia	podalica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1287	Che cos' è l'Indice di Pearl?	Un indice statico di affidabilità di un metodo contraccettivo	Un indice dello stato di salute del neonato	Un indice statico di fertilità maschile	Un indice statico di fertilità femminile	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1288	Quale delle seguenti opzioni identifica la spirale contraccettiva?	IUD	Pillola	SPC	Ogino-Knaus	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1289	In media il ciclo mestruale dura:	28 giorni	32 giorni	27 giorni	25 giorni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1290	Nel canale cervicale, gli spermatozoi possono sopravvivere per:	24-72 ore	4-5 giorni	6-12 ore	1-2 ore	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1291	Dopo i primi novanta giorni in quale caso può essere consentita l'IVG?	Quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, ovvero siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna	La legge non consente l'IVG dopo i primi novanta giorni	Solo quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna	Solo quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1292	Il prelievo dei villi coriali va eseguito nella:	X-XI settimana di gravidanza	I-II settimana di gravidanza	III-V settimana di gravidanza	VII-IX settimana di gravidanza	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1293	A che mese di gestazione va sospesa l'attività sessuale?	Nessuna delle altre risposte è corretta	IV	VI	VIII	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1294	L'amenorrea può essere:	tutte le altre risposte sono corrette	uterina	ipotalmica	ipofisaria	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1295	Il polidramnios si ha quando la quantità di liquido amniotico è :	2000 cc	300 cc	900 cc	1200 cc	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1296	Quale tra i seguenti non è un organo genitale femminile esterno?	Vagina	Clitoride	Grandi labbra	Monte di Venere	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1297	La montata latte ha luogo dopo alcuni giorni dal parto. Quanti?	4-5 giorni	1 giorno	7-8 giorni	2-3 giorni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1298	Il risultato di un pap test, in base alla classificazione di Papanicolau è suddiviso in quante classi?	5 classi	c'è una sola classe	2 classi: positivo e negativo	4 classi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1299	Quale tra i seguenti non è considerato motivo legittimante la richiesta di IVG entro i primi 90 giorni?	Il superamento della soglia della giusta età biologica per la gravidanza	Quando la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporti un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna	Quando vi siano previsioni di anomalie o malformazioni del concepito	In presenza di particolari condizioni economiche, o sociali o familiari	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1300	Indicare quando va calcolato l'indice di Apgar:	al 1° e al 5° minuto di vita	tra il 4° e l'8° minuto di vita	dopo 10 minuti dalla nascita	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1301	A due anni di vita il peso fisiologico di un bambino dovrebbe attestarsi attorno a:	il triplo di quello alla nascita	il doppio di quello alla nascita	quattro volte quello alla nascita	sei volte quello alla nascita	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1302	Indicare quale tra le seguenti patologie costituisce una pericolosa complicanza della varicella:	nevrasite	enterite	lesioni cutanee	cicatrici cutanee	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1303	A quale età ha inizio la dentizione decidua?	6-8 mesi	12-14 mesi	2 anno	4-6 anni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1304	Indicare quale tra le seguenti neoplasie risulta tra le più frequenti in età pediatrica:	leucemia e linfomi	linfoma di Hodgkin	sarcoma	melanoma	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1305	Il riflesso di Moro indica:	un tipico «auto-abbraccio» del neonato	la capacità di rispondere a stimoli sonori	la capacità di rispondere a stimoli visivi	la capacità di rispondere al dolore	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1306	Il CBCL (Child Behavior Checklist):	presenta scale di valutazione del comportamento psicopatologico infantile	presenta scale di valutazione del comportamento neurologico	presenta scale di valutazione dei disturbi cardiaci infantili	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1307	Qual è il tumore solido più frequente in età pediatrica?	Neuroblastoma	Mieloma	Sarcoma	Lipoma	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1308	Indicare la procedura corretta del massaggio cardiaco nel bambino:	mani sul torace, pollici sul III medio dello sterno	polso destro sul III inferiore dello sterno e polso sinistro sul dorso della mano destra	polso sinistro sul III inferiore dello sterno e polso destro sul dorso della mano destra	tutte le altre risposte sono corrette	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1309	Le crisi convulsive durante la febbre sono dovute a:	deficit fisiologico di crescita sinaptica	epilessia precoce	autismo infantile	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1310	Quale tra i seguenti fattori non è incluso nell'indice di Apgar?	Valutazione del nistagmo oculare	Frequenza del battito cardiaco	Riflesso laringeo	Colorito della pelle	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1311	I disturbi delle capacità motorie nel bambino sono caratterizzati da:	complessiva mancanza di coordinazione motoria	deficit del sistema nervoso periferico	tutte le altre risposte sono corrette	coordinazione motoria inferiore in relazione all'età cronologica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1312	Il fabbisogno proteico del lattante si attesta attorno a:	1.5-2 g/Kg/die	5-6 g/Kg/die	20-40 g/Kg/die	0.51 g/Kg/die	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1313	I denti decidui sono in numero di:	20	24	30	18	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1314	Il fabbisogno lipidico del lattante si attesta attorno a:	4-6 g/Kg/die	40-150 g/Kg/die	150-200 g/Kg/die	2-6 g/Kg/die	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1315	Indicare l'età in cui i bambini iniziano generalmente a camminare:	12-15 mesi	15-18 mesi	18-20 mesi	5-6 mesi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1316	Quale tra queste vaccinazioni non è obbligatoria in Italia?	Anti-parotite	Anti-tetanica	Anti-epatite B	Anti-polio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1317	Quali tra questi è un possibile danno da ossigeno terapia?	Fibroplasia retrolenticolare	Acidosi metabolica	Tutte le altre risposte sono corrette	Acidosi respiratoria	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1318	Qual è il farmaco controindicato in caso di varicella in età pediatrica?	Acido acetilsalicilico	Cortisone	Paracetamolo	Cortisolo	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1319	Il periodo neonatale va:	dal 1° al 30° giorno di vita	dal 1° giorno al primo anno di vita	dalla 1a alla 48a ora di vita	dal 1° al 7° giorno di vita	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1320	La circonferenza cranica di un neonato raggiunge la media di:	35 cm	45 cm	22 cm	28 cm	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1321	Indicare il numero delle più diffuse tipologie di glicogenosi in pediatria:	4	5	6	12	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1322	Il periodo d'incubazione della varicella copre generalmente:	14-21 giorni	14-60 giorni	24-48 ore	5-8 giorni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1323	Tra gli schemi motori già presenti alla nascita non troviamo:	la capacità di seguire con movimenti oculari uno stimolo visivo	la risposta di afferrare oggetti che sfiorano il palmo della mano o la pianta dei piedi	la respirazione autonoma e separata dalla suzione	la capacità di orientare il capo e gli occhi verso un rumore e in particolare verso la voce umana	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1324	Indicare quale tra le seguenti patologie non è congenita:	NEC	fibrosi cistica	atresia del duodeno	atresia dell'esofago	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1325	Il contenuto di un litro di latte umano, in calorie, è pari a:	680-700	790-820	100-500	550-600	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1326	Qual è il volume globulare medio di un neonato?	100-105 m3	70-80 m3	90-100 m3	90-95 m3	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1327	Indicare quale delle seguenti strutture non si forma nella quinta e sesta settimana di gestazione:	il tubo neurale	il prosencefalo	il diencefalo e i gangli della base	il tronco encefalico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1328	Nella 7ª settimana di gestazione, nel feto:	tutte le altre risposte sono corrette	si presentano lente estensioni del capo	si evidenziano sussulti non coordinati	si avverte la presenza di contrazioni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1329	Lo standard considerato fisiologico del valore della bilirubinemia nel neonato è pari a:	10 mg/dl	1 mg/dl	2 mg/dl	5 mg/dl	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1330	Indicare quale tra i seguenti test non è indicato nella diagnosi prenatale di patologie genetiche:	il prelievo di campioni di sangue fetale	l'ecografia fetale	lo studio di campioni di sangue materno	l'analisi dei tessuti materni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1331	Indicare a quale età emerge la positività per HIV in un lattante:	12-18 mesi	2-4 giorni	3-6 mesi	6-24 mesi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1332	Tra i denti permanenti, quali tra i seguenti compaiono più precocemente:	il primo molare	gli incisivi	i canini e i molari	i canini e gli incisivi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1333	Quanti liquidi deve assumere un neonato al giorno?	150 ml	50 ml	75 ml	100 ml	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1334	Indicare quale tra i seguenti indici specifici non riguarda valutazione delle fasi dell'età pediatrica:	il quoziente intellettivo	l'aumento ponderale	la circonferenza cranica	lo sviluppo sessuale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1335	Indicare il corretto punto di prelievo del sangue nel neonato:	tutte le altre risposte sono corrette	vene femorali	vene del piede	vene dell'arto superiore	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1336	Le allucinazioni sono:	percezioni senza oggetto	percezioni distorte	disturbi del contenuto del pensiero	disturbi della forme del pensiero	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1337	Nel rapporto psicoterapeutico, il transfert è definibile come:	la ripetizione di vissuti infantili, incongrui con la situazione attuale, spostati sullo psicoanalista	un meccanismo di difesa che consiste nel negare i propri conflitti	un meccanismo di difesa che consiste nel proiettare all'esterno i vissuti inaccettabili	la reazione emotiva dello psicoanalista a espressioni e comportamenti dell'analizzato	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1338	Cosa sostiene, riguardo l'eziologia della schizofrenia, la «teoria del doppio legame» elaborata da Bateson?	I bambini ricevono messaggi conflittuali tra i vari ambiti da parte dei genitori	Il modo di rapportarsi dei pazienti è scisso in funzione dell'ambito di interrelazione	I bambini crescono in una condizione di scarsa fiducia che altera la corretta evoluzione psichica	Esiste un'importante dissociazione tra i contenuti ideativi e quelli volitivi dei pazienti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1339	Cosa si intende in Psichiatria con l'espressione «pensiero magico»?	La convinzione che i propri pensieri, parole o azioni possano causare o prevenire un qualche evento	La ripetizione ossessiva di formule magiche e scaramantiche	La convinzione di potersi trasformare	La convinzione di poter trasmettere il proprio pensiero magicamente	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1340	Nella teoria psicoanalitica, l'Es costituisce:	La parte arcaica, pulsionale e stabilmente inconscia della psiche	Un complesso di inferiorità	Una specifica parte o sezione della personalità il cui ruolo è assimilante a quello di censore	Un complesso di colpa	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1341	I test proiettivi o della personalità sono:	reattivi che forniscono informazioni sulla struttura del carattere	atteggiamenti particolari che lo psichiatra assume per evocare risposte emotive	reattivi che consentono di predire la risposta a terapie farmacologiche	la lista delle associazioni verbali di Jung	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1342	Tra i meccanismi di difesa, la rimozione indica:	il procedimento per cui viene reso inconscio un evento traumatico	il rigetto delle pulsioni negative	il riapparire di sintomi e disturbi infantili in età adulta	l'oblio consapevole di esperienze luttuose	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1343	L'amenorrea nell'anoressia mentale femminile:	è di regola secondaria e conseguente al dimagrimento	è più spesso primaria che secondaria	è una conseguenza diretta del vomito autoindotto	è sempre assente	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1344	Nel delirium del paziente anziano vi è compromissione:	di tutte le funzioni cognitive	solo della memoria	solo dell'orientamento temporo-spaziale	solo dell'attenzione	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1345	La sospettosità pervasiva nei confronti degli altri è tipica:	del disturbo paranoide di personalità	dell'autismo schizofrenico	del disturbo ossessivo compulsivo	della personalità evitante	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1346	La sindrome di Korsakov si riferisce a:	un disturbo specifico della memoria	una tipica nevrosi fobica	un disturbo particolare della condotta sessuale	una tipologia di schizofrenia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1347	Nelle teorie psicodinamiche l'inconscio rappresenta:	un luogo psichico in cui si depositano i materiali rimossi	la genesi infantile dei desideri sessuali	una forza cieca, caotica, irrazionale	un'espressione psichica della libido	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1348	La legge di riforma psichiatrica (n. 180 del 1978) è nota come:	legge «Basaglia»	legge «Burani»	legge «Segni»	legge «Pannella»	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1349	Quale dei seguenti autori descrisse la catatonia?	Kahlbaum	Chiarugi	Roth	Charchot	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1350	Il decorso tipico del disturbo bipolare è caratterizzato da:	alternanza di fasi di eccitamento e di depressione	alternanza di fasi depressive con stati di tipo schizofrenico	alternanza di fasi di depressione con fasi di catatonia	alternanza di fasi di eccitamento con stati di tipo schizofrenico, con periodi di remissione	INFERMIERISTICA SPECIFICA

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

Id	Quesito	Risp_ esatta	Risp_errata_1	Risp_errata_2	Risp_errata_3	Materia
1351	Quale delle seguenti patologie è a trasmissione diretta tra individui?	Sifilide	Peste	Rabbia	Malaria	IGIENE
1352	In caso di ferita traumatica e in assenza di conoscenza dello stato vaccinale, la profilassi antitetanica prevede:	tutte le altre risposte sono corrette	disinfezione della ferita	somministrazione di immunoglobuline	terapia antibiotica	IGIENE
1353	La chemioprolifassi primaria prevede la somministrazione di:	antibiotici	vaccini	fans	qualsiasi farmaco antivirale	IGIENE
1354	Con la refrigerazione gli alimenti vengono conservati a temperatura:	tra 0°C e 4°C	ambiente	< 0°C	> 4°C	IGIENE
1355	Completare la seguente frase con l'opzione corretta: "Un oggetto si definisce sterile quando è privo di _____"	qualsiasi microrganismo o spora	spore	microrganismi patogeni	microorganismi anaerobi	IGIENE
1356	Classifichiamo il lisoformio come:	un disinfettante	un insetticida	un battericida	un acaricida	IGIENE
1357	Il botulismo è classificato come:	un'intossicazione alimentare	un avvelenamento da funghi	un'epatite a eziologia sconosciuta	un'infezione in seguito a intervento chirurgico	IGIENE
1358	Identifica il vettore di infezione tra i seguenti:	mosche	aria	alimenti	suolo	IGIENE
1359	Cosa si intende per contumacia:	il confino di un paziente in ambiente domiciliare o ospedaliero per un determinato periodo di tempo	l'obbligo per il paziente di sottoporsi a profilassi antibiotiche	la mancata presentazione della certificazione medica al datore di lavoro	la dimissione di un paziente dalla struttura ospedaliera	IGIENE
1360	La Rickettsiosi è un'infezione che utilizza come vettore:	la zecca	il cane	i molluschi	la zanzara	IGIENE
1361	Quale dei seguenti vaccini è costruito con frazioni di microrganismi:	Antipertosse	Antimalarico	Antirosolia	Antitubercolare	IGIENE
1362	Quando non si può somministrare un vaccino?	Durante terapia immunosoppressiva	Durante terapia antifungina	Durante l'adolescenza	Durante l'allattamento	IGIENE
1363	Quale dei seguenti elementi chimici deve essere assente nell'acqua potabile?	Argento	Calcio	Magnesio	Potassio	IGIENE
1364	Quale malattia è stata eradicata a livello mondiale?	Vaiolo	Micobatteriosi	Peste	Lebbra	IGIENE
1365	Per quale malattia a tutt'oggi non esiste ancora un vaccino?	Toxoplasmosi	Epatite virale B	Epatite A	Morbillo	IGIENE
1366	Per la sterilizzazione viene utilizzato:	ossido di etilene	alcol etilico	acido cloridrico	cloro	IGIENE
1367	Una malattia infettiva è a trasmissione eterogenea se:	necessita di un vettore	ha differenti manifestazioni cliniche	colpisce organismi di specie diverse	si trasmette con diverse modalità	IGIENE
1368	Da cosa può essere provocata la tossinfezione alimentare:	staphylococcus aureus	treponema pallidum	VZV	micobatteri ambientali	IGIENE
1369	In quale tipo di prevenzione si effettua il monitoraggio periodico fetale?	Secondaria	Terziaria	Tutte le altre risposte sono corrette	Primaria	IGIENE
1370	La profilassi indiretta viene attuata mediante:	disinfestazione ambientale	isolamento	inchiesta epidemiologica	notifica	IGIENE
1371	Quale tra i seguenti è un composto alogeno?	Cloro	Aldeidi	Acqua distillata	Alcool	IGIENE
1372	La temperatura ottimale per un individuo sano a riposo è:	18-20°C	25-29°C	21-25°C	14-16°C	IGIENE
1373	In seguito a pastorizzazione, per quanto tempo si conserva il latte in frigorifero?	4 giorni	7 giorni	2 giorni	3 giorni	IGIENE
1374	In caso di immunoprofilassi passiva cosa viene somministrato al paziente?	Immunoglobuline	Immunosoppressori	Eristrociti	Chemioterapici	IGIENE
1375	Per definizione che cos'è un'autoclave?	Una caldaia usata per la sterilizzazione	Una macchina per distruggere i rifiuti	Un carrello per il trasporto della biancheria	Un'autoambulanza dotata di lettiga automatizzata	IGIENE
1376	Il periodo di incubazione di una malattia indica l'arco di tempo tra:	il contagio dell'agente patogeno e la manifestazione dei sintomi correlati	il contatto con l'agente patogeno e la risposta del sistema immunitario	l'inizio dei sintomi e la guarigione definitiva	il momento in cui l'agente patogeno entra nell'organismo e la guarigione	IGIENE
1377	Prima di effettuare un prelievo di sangue venoso si deve disinfettare la parte interessata per almeno:	uno o due minuti	cinque minuti	tutte le altre risposte sono corrette	quattro secondi	IGIENE
1378	Cosa si utilizza per la disinfezione di strumenti endoscopici:	la glutaraldeide	la bollitura	l'autoclave	l'acido fenico	IGIENE
1379	Che cosa si intende per antisepsi?	Disinfezione di tessuti viventi	Disinfezione della sala operatoria	Sterilizzazione di tessuti vegetali	Sterilizzazione di strumentario chirurgico	IGIENE
1380	Qual è la caratteristica di una malattia endemica?	Ha frequenza costante	E' ad eziologia sconosciuta	Si trasmette geneticamente	Presenta bruschi aumenti di frequenza in tempi brevi	IGIENE
1381	Quale delle seguenti malattie ha bisogno di un vettore per diffondersi?	Malaria	Polmonite	Rosolia	Epatite A	IGIENE
1382	Tra le seguenti malattie quale può porre nella condizione di portatore cronico?	Epatite B	Toxoplasma	Rosolia	Malaria	IGIENE
1383	La clorexidina viene classificata come:	un disinfettante	una vitamina	un antimicotico	un agente sterilizzante	IGIENE

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1384	L'isolamento del paziente è obbligatorio in caso di:	Tubercolosi	Malaria	Polmonite da P. carinii	Aids	IGIENE
1385	Per quale tipo di sterilizzazione si utilizzano i raggi UV?	Di superfici varie	Di biancheria e garza	Della cute e delle mucose	Del cavo orale	IGIENE
1386	La cosiddetta malattia di Lyme può essere trasmessa da:	zecche	mosche tse-tse	zanzare	pulci	IGIENE
1387	Vetro o metallo si sterilizzano mediante:	stufe a secco	fenoli	alcoli	bollitura	IGIENE
1388	Un vaccino può essere composto da:	tutte le altre risposte sono corrette	microrganismi morti	microrganismi attenuati	anatossine	IGIENE
1389	I rifiuti ospedalieri si definiscono?	Speciali	Velenosi	Umidi	Tossici	IGIENE
1390	Cosa non fa parte della prevenzione primaria?	Screening di massa	Vaccinazione	Disinfezione	Educazione sanitaria	IGIENE
1391	Una sola di queste malattie non è trasmissibile per via aerea. Quale?	Epatite A	Varicella	Tubercolosi	Scarlattina	IGIENE
1392	Quale delle seguenti malattie è anche a trasmissione verticale?	Rosolia	Amebiasi	Polmonite	Bronchiolite	IGIENE
1393	Il guanto sterile non va indossato:	Prima del posizionamento del sondino naso gastrico	Prima della medicazione del catetere arterioso	Prima della medicazione di una ferita operatoria ortopedica	Prima del posizionamento del catetere vescicale	IGIENE
1394	L'utilizzo dei guanti è una misura:	aggiuntiva al lavaggio delle mani	alternativa al lavaggio sociale delle mani	alternativa al lavaggio antisettico delle mani	alternativa al lavaggio chirurgico delle mani	IGIENE
1395	Quando NON deve essere utilizzata la frizione con soluzione alcolica delle mani?	Se le mani sono imbrattate di sangue	Dopo il contatto con oggetti inanimati	Dopo la rimozione dei guanti	Se le mani non sono visibilmente sporche	IGIENE
1396	Tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo NON vanno eliminati:	farmaci scaduti	agenti chimici pericolosi	liquidi radiologici	contenitori medicinali citotossici	IGIENE
1397	La glutaraldeide viene utilizzata per la sterilizzazione di:	endoscopi	garze e batuffoli	stetoscopi	fonendoscopi	IGIENE
1398	Fra i comportamenti da tenere nel rifacimento letto, quale, tra i seguenti, è corretto:	Rimuovere dal letto le lenzuola e deporle nel cesto della biancheria sporca tenendole lontano dalla divisa	Rimuovere la biancheria dal letto, tenendola lontano dalla divisa e adagiandola momentaneamente sul pavimento in attesa di riporla nell'apposito sacco al termine della procedura	Rimuovere la biancheria dal letto, scuoterla per eliminare i microrganismi, tenendola lontano dalla propria divisa e successivamente deporla nel cesto della biancheria sporca	Rimuovere la biancheria dal letto tenendola adesa al proprio corpo e scuotendola prima di riporla nel sacco della lavanderia	IGIENE
1399	Durante l'esecuzione dell'igiene intima femminile è corretto procedere:	Versando l'acqua sui genitali pulire le grandi labbra e successivamente le piccole labbra	Versando l'acqua sui genitali pulire in senso lineare dalla zona anale alla vagina	Versando l'acqua sui genitali pulire in senso lineare dalla zona vaginale al meato urinario	Versando l'acqua sui genitali pulire le piccole labbra e successivamente le grandi labbra	IGIENE
1400	Al termine dell'esecuzione dell'igiene intima maschile, è importante ricoprire il glande per:	prevenire formazione di edema	evitare l'imbarazzo della persona	prevenire infezioni	prevenire infiammazioni	IGIENE
1401	Durante l'igiene del cavo orale del paziente incosciente, il paziente va posizionato:	Sul fianco e sollevando la testata del letto di almeno 30 gradi	Sul fianco non sollevando la testata del letto	Supino sollevando la testata del letto di almeno 45 gradi	Supino sollevando la testata del letto di almeno 30 gradi	IGIENE
1402	Le seguenti sono tutte complicanze che derivano da un'inadeguata attenzione nella pulizia del letto, tranne una: quale?	Difficoltà nel movimento a letto	Ulcere da pressione	Sensazione di disagio	Irritazioni cutanee	IGIENE
1403	Riguardo l'igiene del cavo orale di una persona non cosciente, quali tra le seguenti affermazioni sono esatte? 1. Controllare che l'aspiratore sia funzionante e nei pressi 2. Posizionare la persona seduta 3. Utilizzare le dita della mano non dominante per tenere aperta la bocca 4. Cospargere con un agente idratante le labbra dopo aver completato l'igiene orale.	1,4	1,2,3,4	1,2,4	2,3	IGIENE
1404	Che tipo di lavaggio va effettuato prima di indossare i guanti sterili per l'inserimento di un catetere vescicale?	Lavaggio sociale	Lavaggio chirurgico	Nessuna delle altre risposte è corretta	Lavaggio antisettico	IGIENE
1405	Lavare le mani non basta per favorire la prevenzione, questa azione deve essere accompagnata da alcuni accorgimenti:	Le unghie devono essere tenute corte e pulite	Le unghie possono essere ricoperte da smalto solo se di colore chiaro	Nessuna delle altre risposte è corretta	Le unghie possono essere ricoperte da smalto antibatterico	IGIENE
1406	La rosolia è una malattia di natura:	virale	genetica	sia virale che batterica	batterica	IGIENE
1407	I Batteri sono:	microorganismi che possono causare infezioni	microorganismi con cellula molto complessa	microorganismi sempre pericolosi	microorganismi che vivono solo in assenza di ossigeno	IGIENE
1408	L'epatite è una affezione che riguarda:	il fegato	il pancreas	il cuore	il colon retto	IGIENE
1409	La toxoplasmosi è una malattia:	sia dell'uomo che degli animali	solo dell'uomo	solo dei gatti	solo degli animali	IGIENE
1410	Il periodo di incubazione dell'epatite A è di:	circa un mese	circa tre mesi	circa un anno	circa sei mesi	IGIENE
1411	L'acronimo AIDS significa:	Acquired Immuno Deficiency Syndrome	Acquired Immuno Deficity Syndrome	Acquired In Deficit Syndrome	Acquired Immuno Deficiency Sistem	IGIENE
1412	La malaria è una malattia:	che ha recidive e può diventare cronica	che non ha recidive	che ha recidive ma non può diventare cronica	che raramente ha recidive	IGIENE

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1413	La penicillina si ricava:	da un fungo	da un batterio	da una pianta	da un virusa	IGIENE
1414	La comune meningite dei bambini è causata da:	un virus	un fungo	un protozoo	un batterio	IGIENE
1415	I soggetti portatori sani di una malattia:	non manifestano la malattia ma possono trasmetterla	non hanno la malattia	non manifestano la malattia e non possono trasmetterla	manifestano la malattia	IGIENE
1416	Quale tra i seguenti requisiti riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere:	Il lavaggio delle mani	Il ricambio quotidiano della biancheria del letto	La dotazione di disinfettanti e antibiotici	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1417	Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate:	Prima di indossarli e dopo averli rimossi	Solo quando evidentemente contaminate	Solo se si è venuti a contatto con liquidi organici	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1418	Qual è il più importante fattore di rischio per lo sviluppo di una batteriuria associata a cateterizzazione?	La durata della cateterizzazione	Una scorretta igiene perineale	L'inadeguata assunzione di liquidi	L'utilizzo di cateteri vescicali in lattice	IGIENE
1419	Al termine di un'iniezione, l'infermiere deve gettare siringa e ago:	Negli appositi contenitori senza rimettere il cappuccio protettivo sull'ago	Solo dopo aver reincappucciato l'ago	Tutte le altre alternative sono corrette	Nei rifiuti speciali solo dopo aver reincappucciato l'ago	IGIENE
1420	Per "antiasepsi" si intende:	Un insieme di norme atte a impedire o a rallentare la moltiplicazione di germi patogeni e non patogeni	Un processo che permette l'eliminazione di ogni microrganismo vivente (batteri, spore, miceti e virus)	Un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili	La detersione eseguita mediante l'uso di mezzi e sostanze ad alto potere detergente	IGIENE
1421	La dieta del paziente affetto da insufficienza renale cronica non sottoposto a dialisi deve:	Limitare l'apporto di potassio	Aumentare la quota di liquidi	Limitare l'apporto di grassi saturi	Limitare l'apporto di proteine	IGIENE
1422	L'uso dei guanti monouso:	Non deve mai essere un'alternativa all'igiene delle mani	Può essere un'alternativa all'igiene delle mani in alcune situazioni	E' una valida alternativa all'igiene delle mani	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1423	L'accertamento dello stato nutrizionale prevede la raccolta dei seguenti dati OGGETTIVI:	Misure antropometriche	Ambiente	Abitudini di vita	Religione	IGIENE
1424	La procedura più importante per prevenire le infezioni correlate all'assistenza infermieristica:	Igiene delle mani	Utilizzo di battericidi	Sterilizzazione degli ambienti	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1425	Quale fra le seguenti manovre è indicata per prevenire lo sviluppo di infezioni alle vie urinarie nel paziente portatore di catetere vescicale?	Utilizzare un sacchetto di raccolta sterile, munito di apposita valvola per lo svuotamento	A ogni svuotamento del sacchetto di raccolta, disconnettere il circuito e lavare l'interno del sacchetto con acqua distillata	Non svuotare mai il sacchetto di raccolta, ma sostituirlo con uno nuovo ogni volta che si riempie	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1426	Qual è la modalità corretta di detersione della ferita chirurgica?	Procedere sempre dall'area pulita verso l'area più sporca	Procedere dall'alto verso il basso	Per convenzione si procede sempre da sinistra verso destra	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1427	Per prevenire l'insorgenza del piede diabetico la persona deve essere educata a:	Asciugare bene fra le dita con un panno morbido	Lavare i piedi una volta alla settimana con soluzione alcalina	Lavare i piedi con acqua molto calda	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1428	Qual è il materiale biologico più utile per la diagnosi microbiologica di tubercolosi polmonare?	L'espettorato	La saliva	Il sangue	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1429	Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira principalmente a prevenire:	Le infezioni ospedaliere	La trasmissione di agenti virali	Le infezioni respiratorie	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1430	Per aiutare un paziente ad espettorare le secrezioni catarrali è utile:	Associare la posizione seduta a respiri profondi e colpi di tosse	Farlo tossire frequentemente, sia di giorno che di notte	Invitarlo a tossire mantenendo il capo flesso anteriormente	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1431	Durante la somministrazione di nutrizione tramite PEG, il paziente:	Deve mantenere la postura semiseduta con lo schienale del letto inclinato di 30/40 gradi	Non può deglutire liquidi per OS	Necessita di un controllo della glicemia almeno ogni 2 ore	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1432	In ambito infermieristico, l'uso dei guanti:	Non deve mai essere un'alternativa all'igiene delle mani	È una valida alternativa all'igiene delle mani	Non deve necessariamente essere seguito dall'igiene delle mani	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1433	Quale tra le seguenti è la complicanza più frequente della nutrizione parenterale totale?	Le infezioni	Il vomito	La disidratazione	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1434	Per ottenere l'effetto desiderato dei disinfettanti si devono osservare regole ben precise. Quale tra i seguenti sistemi di conservazione NON è corretto?	Lasciare aperta la confezione	Apporre la data di apertura sulla confezione	Conservare il prodotto in luoghi freschi e asciutti	Tutte le risposte sono corrette	IGIENE
1435	Qual è la misura che riduce sensibilmente l'incidenza di infezioni nella cateterizzazione urinaria a permanenza?	Il mantenimento del sistema di drenaggio continuamente chiuso e sterile	La pulizia settimanale della zona genitale del paziente e del meato urinario	L'irrigazione vescicale di routine	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1436	Durante il riposo a letto, quale posizione deve adottare un paziente di chirurgia toracica nel post-operatorio?	Posizione di semi-Fowler, con il terzo superiore del letto a 30-45 gradi	Posizione prona	Posizione supina	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1437	Quale fra le seguenti malattie può essere trasmessa per via aerea?	La tubercolosi	IVU	L'AIDS	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1438	Nella valutazione dello screening nutrizionale possono essere applicate le seguenti scale:	MNA (Mini nutritional assessment)	Nessuna delle altre alternative è corretta	Di Painad	Di Tinetti	IGIENE

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1439	"Rimuovere immediatamente qualsiasi catetere intravascolare che non sia più strettamente necessario." Questa affermazione è:	Vera, tutti i cateteri venosi, arteriosi, centrali o periferici devono essere rimossi il prima possibile e comunque non appena non siano più strettamente necessari, per diminuire il rischio di infezioni	Falsa perché devono essere lasciati in sito anche cateteri inutilizzati se si prevede che possano avere un utilizzo successivo (possibile aggravamento del paziente, possibile insorgenza di complicanze)	Falsa, i cateteri venosi centrali e quelli arteriosi vanno rimossi solo nel momento della dimissione del paziente dall'ospedale	Falsa perché devono essere lasciati in sito anche cateteri inutilizzati se il paziente è anziano e il patrimonio venoso scarso	IGIENE
1440	Secondo le più recenti Linee Guida per la prevenzione del rischio infettivo la medicazione del sito d'inserzione del CVC, con medicazione trasparente, deve essere effettuata:	ogni 7 giorni	mai	ogni 3 giorni	ogni giorno	IGIENE
1441	Secondo le raccomandazioni dell'OMS quanti e quali sono i "momenti fondamentali" per l'igiene delle mani?	5:Prima del contatto con il paziente; prima di una manovra asettica; dopo esposizione ad un liquido biologico; dopo il contatto con il paziente;dopo il contatto con l'ambiente circostante il paziente	5: Prima del contatto con il paziente; prima di una manovra asettica; dopo una manovra asettica; dopo il contatto con il paziente; dopo il contatto con l'ambiente circostante il paziente	3: Prima del contatto con il paziente; prima di una manovra asettica; dopo esposizione ad un liquido biologico	Non esistono raccomandazioni OMS in merito	IGIENE
1442	Quale tra i seguenti interventi NON è appropriato in caso di paziente portatore di catetere vescicale?	Utilizzare talco dopo l'igiene perineale	Fissare il catetere alla coscia o all'addome	Tenere la sacca di drenaggio sotto il livello della vescica dell'assistito	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1443	Per un soggetto HIV positivo, che tipo di precauzioni vanno adottate?	Standard	Contatto	Aerea	Droplets	IGIENE
1444	Quando il paziente è in posizione supina, potrebbero svilupparsi lesioni da pressioni nelle seguenti zone:	nuca, sacro, scapole, talloni	malleolo, gomito, orecchio	orecchio, sacro, ginocchio	sacro, ginocchio, scapole	IGIENE
1445	Per quanto riguarda l'alimentazione di una persona anziana, in assenza di controindicazioni, si consiglia di:	aumentare l'apporto di calcio nella dieta	eliminare le fibre dalla dieta	limitare l'apporto di liquidi	aumentare l'apporto di sodio quotidiano	IGIENE
1446	La medicazione di un catetere venoso centrale deve essere effettuata passando la soluzione disinfettante:	dall'interno verso l'esterno in modo circolare	dall'esterno verso l'interno in modo circolare	dall'esterno verso l'interno a raggiera	nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1447	Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:	Prima di eseguire procedure invasive	Al termine delle attività di strumentazione perioperatoria	Prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con l'utente	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1448	Come si trasmette il virus Sars-Cov-2:	In modo diretto, indiretto e per contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni della bocca e del naso	Solo per contatto diretto	Solo per contatto stretto	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1449	Il calibro del catetere vescicale si misura in:	In Charrier	In Mercier	In Gauge	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1450	Nella cura delle lesioni da pressione è fondamentale e irrinunciabile:	L'eliminazione o la massima attenuazione della pressione sulla lesione	La detersione della lesione con soluzione fisiologica sterile	L'applicazione di garze grasse sulla lesione	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1451	L'apertura di una ferita è chiamata:	Deiscenza	Infezione	Formazione di ernia	Sventramento	IGIENE
1452	Quali sono le più frequenti infezioni correlate all'assistenza?	Infezione delle vie urinarie, infezione della ferita chirurgica, polmoniti e sepsi	Polmoniti, tubercolosi, infezione delle vie urinarie ed infezione della ferita chirurgica	Infezione delle vie urinarie, gastroenteriti, infezione della ferita chirurgica e congiuntivite	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1453	Cosa s'intende per bilancio idrico?	L'insieme dei processi che consentono di bilanciare l'assunzione e la perdita di liquidi nell'arco delle 24 ore, cioè il rapporto tra liquidi introdotti ed eliminati	La stima approssimativa dei liquidi reintegrati attraverso la dieta	L'insieme dei processi che consentono di bilanciare l'assunzione e la perdita di liquidi nell'arco delle 12 ore, cioè il rapporto tra liquidi introdotti ed eliminati	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1454	Per garantire un adeguato riposo e sonno è necessario tenere in considerazione il microclima, che è caratterizzato da:	temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione, rumore	arredi in generale, illuminazione, temperatura, umidità, ventilazione, rumore	tipologia di materasso, temperatura, umidità, ventilazione, calore radiante	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1455	Il fabbisogno medio di acqua per una persona adulta è di circa:	1,5-2 litri al giorno	2,5-3 litri al giorno	1-1,2 litri al giorno	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1456	In quale tipo di pazienti è più importante la cura dei piedi?	Nei pazienti diabetici	Nei pazienti nefropatici	Nei pazienti influenzati	Nei pazienti traumatizzati	IGIENE

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1457	Quale delle seguenti affermazioni è sbagliata?	Quando si indossano i guanti, rimuoverli nel passare da un sito del corpo pulito ad uno contaminato	Usare i guanti tutte le volte che ci si aspetti di venire in contatto con sangue o altro materiale potenzialmente infetto, membrane, mucose o cute non intatta	L'utilizzo dei guanti non è sostitutivo dell'igiene delle mani	Rimuovere i guanti dopo aver assistito il paziente	IGIENE
1458	Secondo le più recenti Linee Guida per la prevenzione del rischio infettivo il CVP nel neonato deve:	essere sostituito solo quando vi siano segni di infezione o infiammazione (flebite) o malfunzionamento e prontamente rimosso alla sospensione della terapia endovenosa	essere sostituito ogni 24 ore e lasciato in sede per altre 24 ore dopo la sospensione della terapia endovenosa	essere sostituito ogni 72 ore fino alla sospensione della terapia endovenosa	essere sostituito ogni 96 ore fino alla sospensione della terapia endovenosa	IGIENE
1459	La pratica del lavaggio delle mani effettuata correttamente consente:	la riduzione del rischio di trasmissione di patogeni dall'operatore al paziente, dal paziente all'operatore e da paziente a paziente, anche attraverso l'ambiente	l'aumento del rischio di trasmissione di patogeni da operatore a paziente e da paziente a paziente	la riduzione del rischio di trasmissione di patogeni dall'operatore al paziente ma l'aumento del rischio di trasmissione da paziente ad operatore	l'azzeramento del rischio di trasmissione di patogeni dall'operatore al paziente e da paziente a paziente	IGIENE
1460	"Eseguire la tricotomia aumenta il rischio di infezione del sito chirurgico, in special modo se si utilizzano i rasoi manuali e il rischio aumenta se questa viene praticata il giorno prima dell'intervento". Secondo le Linee Guida questa affermazione è:	Vera: la tricotomia non andrebbe mai praticata (a meno che i peli non interferiscano con l'intervento). Se si effettua la tricotomia praticarla il giorno stesso dell'intervento preferibilmente con clipper elettrico con lame monouso	Falsa: la tricotomia diminuisce il rischio di infezione e deve essere praticata sempre, con qualunque strumento e senza indicazioni sui tempi	Vera ma incompleta: la tricotomia deve sempre essere effettuata nei pazienti immunodepressi e negli individui di colore	Falsa: la tricotomia non dovrebbe essere praticata solo per interventi agli arti inferiori ma deve sempre essere effettuata negli interventi sull'addome, preferibilmente con rasoio manuale monouso bilama	IGIENE
1461	Indicare quali sono le più frequenti infezioni correlate all'assistenza:	infezione delle vie urinarie, infezione della ferita chirurgica, polmoniti, sepsi	tubercolosi, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, infezioni delle vie urinarie	Infezione vie urinarie, gastroenteriti, infezione della ferita chirurgica, tubercolosi	polmoniti, tubercolosi, infezioni delle vie urinarie, infezione della ferita chirurgica	IGIENE
1462	Nell'esecuzione del lavaggio sociale delle mani è buona norma adottare le seguenti precauzioni tranne una. Quale?	Usare gli spazzolini per le unghie	Usare un detergente	Asciugarsi con salviettine monouso o aria calda	Asportare anelli, bracciali orologio	IGIENE
1463	Nel riposizionamento a letto, quale fra le seguenti posizioni l'infermiere dovrà fare assumere alla persona con lesione da pressione in sede sacrale, al fine di alleviare la pressione sulle prominente ossee dorsali e sacrali?	Laterale destra o sinistra	Posizione di anti-Trendelenburg	Semi-Fowler	Incrociata	IGIENE
1464	Quale dei seguenti atteggiamenti riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere?	Riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere il lavaggio delle mani	Riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere il ricambio della biancheria	Riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere l'utilizzo dei flussi d'aria laminari	Riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere la corretta dislocazione dei farmaci	IGIENE
1465	Quale delle seguenti affermazioni sulla distribuzione delle calorie nel trattamento dietetico di una persona con diabete di tipo 2 è corretta?	Almeno la metà delle calorie assunte quotidianamente deve derivare dai carboidrati	Deve contenere un apporto calorico pari tra carboidrati, grassi e proteine	L'apporto calorico deve essere determinato prevalentemente dall'assunzione di frutta	La percentuale maggiore delle calorie assunte quotidianamente deve essere determinata dall'apporto protidico	IGIENE
1466	Per eseguire l'igiene del cavo orale in un paziente incosciente, è opportuno metterlo nella:	posizione laterale	posizione di Trendelenburg	posizione di Fowler	posizione seduta	IGIENE
1467	Individuare, tra i seguenti, un possibile effetto indesiderato della somministrazione di clistere evacuativo.	Crisi vagale	Iperglicemia transitoria	Cefalea	Bradipnea e sonnolenza	IGIENE
1468	Per quale motivo è necessario far rimuovere alla persona le protesi dentarie mobili prima del suo ingresso in camera operatoria?	Per evitare il rischio di caduta nel retrobocca/vie aeree/vie digestive con ostruzione delle stesse	Per evitare il rischio di caduta solo nelle vie digestive con ostruzione delle stesse	Per evitare il rischio di caduta in bocca/retrobocca ed espulsione delle stesse	Per evitare il rischio di caduta solo nella cavità nasale con ostruzione della stessa	IGIENE
1469	Un paziente degente in terapia intensiva per complicanze post-operatorie ha in corso la nutrizione enterale attraverso sondino nasogastrico. La miscela prescritta prevede l'integrazione di elementi nutrizionali quali arginina, glutammina, acidi grassi omega 3. Questa integrazione ha lo scopo di:	migliorare la risposta immunitaria	migliorare la motilità	migliorare la tollerabilità	prevenire la comparsa di diarrea	IGIENE
1470	Al rientro dalla sala operatoria dopo intervento per un'occlusione intestinale, l'infermiere effettua il primo controllo post-operatorio a una persona di 68 anni. Con quale frequenza è raccomandabile eseguire i successivi controlli dei parametri e delle condizioni cliniche del paziente?	Ogni ora per le prime 4 ore e successivamente ogni 4 ore	Dopo un'ora e poi pressione arteriosa e frequenza cardiaca ogni 6 ore, emocromo a 8 ore dal rientro in reparto e, se le condizioni sono stabili, al bisogno	Ogni ora per le successive 24 ore	Il paziente necessita di una presenza costante per almeno 48 ore che possa segnalare al personale ogni variazione utile dei parametri vitali	IGIENE

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1471	Per quanto riguarda la gestione della ferita, il tipo di medicazione in schiuma in poliuretano idrofilico si utilizza per:	ferite con perdita totale o parziale di spessore, con scarso o medio drenaggio: la schiuma provvede all'assorbimento e protezione	ferite infette: la schiuma ha un'azione antimicrobica e antiparassitaria	ferite profonde o moderatamente secernenti: la schiuma provvede all'assorbimento	ferite a tutto spessore o a spessore parziale: la schiuma promuove la granulazione e il debridement autolitico per rimuovere il tessuto necrotico	IGIENE
1472	L'igiene del cavo orale, l'aspirazione delle secrezioni e il posizionamento dell'assistito con il tronco sollevato di 30-45° sono interventi infermieristici atti a prevenire:	la polmonite associata a intubazione endotracheale	l'insorgenza di lesioni a carico del cavo orale	la dislocazione del tubo endotracheale	la rimozione accidentale del catetere di Swan-Ganz	IGIENE
1473	L'iperemia della cute, che non scompare dopo digitopressione, denota una lesione da pressione:	al primo stadio	al terzo stadio	al secondo stadio	al quarto stadio	IGIENE
1474	Quale tra le seguenti NON è un'indicazione al posizionamento di catetere vescicale?	Neoplasia del bacinetto renale o dell'uretere, per il quale sia stato posizionato uno stent	Quando è necessario iniettare mezzi di contrasto in vescica a scopo diagnostico	Ritenzione urinaria o assenza di riflesso neurologico vescicale	Mantenere la vescica vuota in caso di interventi chirurgici a carico delle vie urinarie	IGIENE
1475	Nel riposizionamento a letto, per favorire la ventilazione e migliorare la gittata cardiaca, l'infermiere dovrà far assumere al paziente la posizione:	di Fowler	genupettorale	supina	prona	IGIENE
1476	Durante il lavaggio chirurgico delle mani è assolutamente necessario:	bagnare mani e avambracci tenendo le mani più in alto dei gomiti	bagnare mani e avambracci tenendo i gomiti più in alto delle mani	bagnare prima gli avambracci e poi le mani	usare la soluzione alcolica di clorexidina gluconato	IGIENE
1477	Quali caratteristiche deve avere un sapone utilizzato per il lavaggio di un paziente ospedalizzato?	PH neutro, poco schiumogeno, facile da risciacquare, non profumato, costo contenuto	PH leggermente basico per migliorare la disidratazione cutanea, facile da risciacquare, non profumato	Possono essere utilizzati tutti i tipi di saponi	Solo pH neutro e basso costo	IGIENE
1478	Il pronto soccorso avvisa il reparto di degenza che sta inviando per il ricovero una persona affetta da scabbia. Quali precauzioni dovrà adottare il personale di assistenza per evitare la trasmissione della malattia?	Indossare un camice monouso e i guanti da cambiare ogniqualvolta abbia contatti con la persona, programmare interventi di pulizia straordinaria per la stanza di degenza e, se possibile, accoglierla in una stanza singola	Indossare i mezzi di protezione previsti dall'isolamento per contatto all'entrata della stanza e rimuoverli prima di uscire	Metterla subito in isolamento ed evitare qualsiasi tipo di contatto	Indossare un camice e i guanti per tutti i contatti con la persona, che sarà posta in degenza con altri soggetti portatori di stati infetti di altri generi	IGIENE
1479	Quali interventi infermieristici sono indicati per la prevenzione della polmonite associata a intubazione endotracheale in un assistito degente in Terapia Intensiva e intubato da 8 giorni?	Praticare l'igiene del cavo orale, aspirare le secrezioni, posizionare l'assistito con il tronco sollevato di 30-45 gradi	Praticare l'igiene del cavo orale, evitare l'aspirazione delle secrezioni sottoglottiche, posizionare l'assistito con il tronco sollevato di 90 gradi	Praticare l'igiene del cavo orale, eseguire il monitoraggio emogasanalitico biorario, posizionare l'assistito supino	Praticare l'igiene del cavo orale, incrementare la sedazione, posizionare l'assistito supino	IGIENE
1480	Il carcinoma della cervice uterina si associa in più del 95% dei casi a infezione da:	Papillomavirus umano (HPV)	Virus di Epstein-Barr (EBV)	Candida Albicans	Virus erpetico ottavo (HHV8)	IGIENE
1481	La sacca di raccolta delle urine collegata al catetere vescicale deve essere mantenuta:	al di sotto del livello della vescica	al livello della vescica	non è importante considerare il livello rispetto alla vescica	al di sopra del livello della vescica	IGIENE
1482	Cosa si intende con l'espressione "bilancio idrico":	il monitoraggio dei liquidi sia introdotti sia eliminati dal paziente	la media aritmetica dei parametri vitali rilevati al paziente nelle ultime 48 ore	il monitoraggio dei soli liquidi introdotti dal paziente	il monitoraggio dei soli liquidi eliminati dal paziente	IGIENE
1483	Quale tra i seguenti provvedimenti riveste maggiore efficacia nella prevenzione delle infezioni ospedaliere?	L'igiene delle mani	L'utilizzo di flussi ad aria laminare	L'utilizzo di disinfettanti per pavimenti	La nebulizzazione di formaldeide	IGIENE
1484	Quale delle seguenti indicazioni si deve dare a una persona sottoposta a chemioterapia per eseguire l'igiene del cavo orale?	Utilizzare spazzolini a setole morbide	Usare garze morbide e filo interdentale ogni sera	Usare solo collutori a base alcolica	Usare dei rilevatori di placca per rimuoverla completamente	IGIENE
1485	La cura quotidiana del meato urinario in presenza di catetere vescicale prevede l'utilizzo di:	acqua e sapone	clorexidina al 2%	pomata antibiotica	iodopovidone al 10%	IGIENE
1486	"Lesione cutanea a spessore totale con degenerazione o necrosi del tessuto sottocutaneo, e con possibile estensione fino alla fascia muscolare, ma non oltre" è la definizione di una lesione al:	terzo stadio	primo stadio	quarto stadio	secondo stadio	IGIENE
1487	Quale delle seguenti affermazioni riguardo all'uso dei guanti come mezzo di barriera è corretta?	I guanti riducono l'incidenza della contaminazione delle mani ma non prevengono le lesioni dovute ad aghi	I guanti non sterili vanno indossati prima di reincappucciare gli aghi usati	I guanti sterili vanno indossati prima di venire in contatto con secreti ed escreti corporei	I guanti sterili vanno indossati prima di indossare il camice sterile	IGIENE

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1488	Il sistema di isolamento basato sulle precauzioni universali richiede:	di considerare tutti i pazienti potenzialmente infetti per le malattie che si trasmettono attraverso il sangue e altri liquidi biologici	l'utilizzo di misure di barriera ogni qualvolta si entri in contatto con il paziente	l'isolamento del paziente in stanza singola	l'isolamento immediato e stretto, tramite precauzioni standard e aggiuntive, dei pazienti sintomatici	IGIENE
1489	L'agente patogeno della malaria è:	il Plasmodium falciparum	il Dictyostelium discoideum	il Saccharomyces cerevisiae	il Bacillus subtilis	IGIENE
1490	L'effettuazione di una medicazione semplice è:	eseguita dall'operatore socio-sanitario in collaborazione con l'infermiere	un'urgenza medica e dunque eseguita in sala operatoria dal chirurgo	decisa dall'operatore socio-sanitario in autonomia	eseguita esclusivamente dall'infermiere	IGIENE
1491	L'impiego dell'acqua ossigenata permette:	una veloce ed efficace rimozione degli essudati	l'eliminazione di tutti i microrganismi	di rinfrescare la pelle del paziente	l'eliminazione di tutta la flora batterica	IGIENE
1492	"Parziale perdita di spessore del derma, che si presenta come un'ulcera aperta, superficiale, con colore rosso, senza fibrina" è caratteristica di una lesione da pressione:	al secondo stadio	al primo stadio	non classificabile	al sesto stadio	IGIENE
1493	Nella prevenzione e nel trattamento delle lesioni da pressione, occorre evitare di:	frizionare e sfregare la cute, specialmente in corrispondenza delle prominenze ossee	valutare insieme al personale infermieristico la necessità di posizionare un materasso antidecubito	mantenere il più possibile la cute pulita e asciutta	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1494	Durante la preparazione del sistema di un drenaggio toracico a valvola ad acqua che cosa deve fare l'infermiere?	Garantire l'asepsi, riempire la camera di aspirazione con acqua sterile fino al segno presente sulla camera di drenaggio	Riempire la camera con soluzione fisiologica, senza adottare manovre di particolare sterilità	Garantire l'asepsi, riempire la camera di aspirazione con acqua sterile oltre il segno presente sulla camera di drenaggio	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1495	Le infezioni ospedaliere sono sostenute prevalentemente da:	batteri	protozoi	virus respiratori	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1496	Nella fase preoperatoria, quando deve essere effettuata l'eventuale tricotomia dell'area di incisione cutanea?	Immediatamente prima dell'intervento chirurgico	Sei ore prima dell'intervento chirurgico	La sera prima dell'intervento chirurgico	Immediatamente dopo l'intervento chirurgico	IGIENE
1497	Vengono definite Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA):	Le infezioni dovute a batteri, funghi, virus o altri agenti patogeni meno comuni, contratte durante l'assistenza sanitaria e che prima o al momento dell'erogazione dell'assistenza non erano manifeste clinicamente, né erano in incubazione	Nessuna delle altre risposte è corretta	Le infezioni dovute a batteri, funghi, virus o altri agenti patogeni meno comuni, contratte durante l'assistenza sanitaria e che prima dell'erogazione dell'assistenza potevano già essere manifeste clinicamente o in incubazione	Le infezioni dovute unicamente a batteri, contratte durante l'assistenza sanitaria e che prima o al momento dell'erogazione dell'assistenza non erano manifeste clinicamente, né erano in incubazione	IGIENE
1498	In quali fasi del processo di assistenza l'intervento dell'OSS può rendersi necessario?	Attuazione degli interventi infermieristici	Pianificazione e attuazione degli interventi infermieristici	Pianificazione, attuazione e valutazione degli interventi infermieristici	Tutte le fasi del processo di assistenza	IGIENE
1499	Quali sono i parametri presi in considerazione da E. Norton per valutare il rischio d'insorgenza delle lesioni da decubito?	Condizioni fisiche, stato mentale, deambulazione, mobilizzazione, incontinenza	Igiene, alimentazione, sudorazione, peso, mobilità a letto	Condizioni fisiche, igiene, alimentazione, stato mentale, idratazione	Deambulazione, mobilizzazione, peso, idratazione, incontinenza	IGIENE
1500	Quali dei seguenti fattori possono influenzare negativamente la guarigione di una ferita?	Sepsi e deficit nutrizionali	Dieta iperproteica	Vomito e diarrea	Febbre	IGIENE
1501	Il lavaggio antisettico delle mani ha l'obiettivo di:	ridurre il numero di batteri residenti e transitori dalle mani	eliminare i residui biologici e tutti i batteri, spore comprese, dalle mani	eliminare tutti i batteri residenti e transitori dalle mani	eliminare i residui biologici dalle mani	IGIENE
1502	Per effettuare la medicazione di una ferita asettica l'infermiere deve procedere:	dal centro alla periferia, mantenendo l'asepsi chirurgica	dal centro alla periferia, mantenendo l'asepsi medica	indifferentemente dalla periferia al centro o viceversa, mantenendo l'asepsi chirurgica	dalla periferia al centro, mantenendo l'asepsi chirurgica	IGIENE
1503	Per effettuare un clistere il paziente deve assumere la seguente posizione:	laterale sinistra con la gamba destra flessa	prona con le gambe flesse	indifferente purché il paziente sia comodo	laterale con la gamba sinistra flessa	IGIENE
1504	La nutrizione parenterale si somministra:	nella via ematica	nello stomaco, nel duodeno nel digiuno	nel circolo collaterale	per via orale	IGIENE
1505	La terapia dietetica nel paziente affetto da epatite cronica scompensata è:	iposodica e ipoproteica	iposodica e iperglucidica	iposodica e ipocalorica	iposodica e iperproteica	IGIENE
1506	Il lavaggio delle mani prima di iniziare una procedura infermieristica è necessario:	sempre	solo se si indossano guanti sterili	solo se l'infermiere presenta delle soluzioni di continuo (ferite, abrasioni) sulle mani	solo se non si indossano guanti puliti	IGIENE
1507	Per effettuare l'urinocoltura in una persona con minzione spontanea, deve essere raccolto:	un campione di urina del mitto intermedio in contenitore sterile previa detersione e disinfezione del meato uretrale	un campione di urina mediante cateterismo estemporaneo in contenitore sterile	un campione di urina del mitto intermedio in contenitore pulito previa detersione e disinfezione del meato uretrale	un campione di urina dalla diuresi delle 24 ore in contenitore sterile previa disinfezione	IGIENE

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1508	In quali casi gli aghi e altri oggetti taglienti monouso devono essere eliminati seguendo precauzioni atte a evitare punture e tagli accidentali?	Sempre, indipendentemente dalla natura del soggetto sul quale sono stati impiegati	Solo quando sono stati utilizzati per soggetti HIV-positivi	Solo nell'ambito del servizio di pronto soccorso	Solo quando sono stati utilizzati per soggetti tossicodipendenti	IGIENE
1509	In una persona portatrice di drenaggio toracico:	il vaso di raccolta deve essere costantemente posto sotto il livello del torace della persona	si consiglia alla persona il decubito supino	non si deve mai sostituire il vaso di raccolta	il vaso di raccolta deve contenere soluzione sterile con eventuale antibiotico	IGIENE
1510	Al termine di un'iniezione, l'infermiere deve gettare la siringa e l'ago negli appositi contenitori:	senza rimettere il cappuccio protettivo sull'ago	rimettendo il cappuccio protettivo sull'ago	sterilizzando l'ago prima di incappucciarlo	spezzando l'ago, dopo averlo staccato dalla siringa	IGIENE
1511	Cos'è il condom?	Un presidio per consentire la raccolta delle urine	Un presidio per consentire l'eliminazione del versamento pleurico	Un presidio per consentire la nutrizione parenterale	Un presidio per consentire l'eliminazione fecale	IGIENE
1512	Dopo aver somministrato la terapia orale mediante sondino a una persona impossibilitata a deglutire, l'infermiere deve:	chiudere il sondino per almeno mezz'ora	nessuna delle altre alternative è corretta	lasciare aperto il sondino	ricollegare il raccoglitore al sondino	IGIENE
1513	La cura di un'area della cute sottoposta a radioterapia prevede di:	Mantenere il sito asciutto e pulito per tutto il periodo di trattamento	Eeguire impacchi giornalieri con alcol	Applicare crema all'ossido di zinco una volta al giorno	Mantenere il sito umido	IGIENE
1514	Quali sono i metodi di alimentazione mediante sondino enterale?	Tutte le altre risposte sono corrette	In continuo, mediante una pompa che eroga la quantità prescelta di alimentazione nel numero di ore specificato	Infusione intermittente (con o senza pompa)	Con una siringa per somministrare volumi maggiori di alimento (bolo) a intervalli di tempo prestabiliti nell'arco della giornata	IGIENE
1515	Le precauzioni standard per prevenire la trasmissione delle infezioni, prevedono:	Utilizzo dei DPI, lavaggio corretto delle mani e delle superfici cutanee dopo contatto con fluidi corporei, gestione attenta di strumenti taglienti, isolamento degli assistiti infetti	Isolamento degli assistiti solo nel caso di infezioni chirurgiche	Utilizzo di guanti monouso sterili	Unicamente il lavaggio chirurgico delle mani	IGIENE
1516	Quale prodotto per l'igiene del cavo orale può ulteriormente ridurre l'incidenza di polmonite associata a ventilazione meccanica?	Clorexidina Gluconato al 2%	Candeggina 00	Acqua Ossigenata	Soluzione fisiologica 0,9%	IGIENE
1517	I principali interventi volti a prevenire le lesioni da pressione nei soggetti a rischio sono:	mobilizzazione dell'assistito, nutrizione adeguata e protezione della cute	nutrizione adeguata e sfregamento quotidiano della cute delle zone a rischio	riposo a letto e dieta dimagrante	nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1518	Lo strumentario chirurgico si definisce sterile se è:	privo di qualsiasi tipo di microrganismo, anche sotto forma di spora	nessuna delle altre risposte è corretta	privo di microrganismi patogeni	privo di microrganismi non patogeni	IGIENE
1519	Il lavaggio sociale delle mani:	prevede che si tolgano anelli, braccialetti e orologio prima di lavarsi le mani	si effettua solo dopo aver effettuato una medicazione	non è necessario se si indossano i guanti	si effettua all'inizio e alla fine del turno di servizio	IGIENE
1520	Secondo le Linee Guida relative alle Precauzioni di Isolamento in Ospedale del CDC di Atlanta del 2007, nell'assistere una persona affetta da legionellosi, quali dispositivi di protezione individuale dovranno utilizzare gli operatori?	Sono sufficienti le precauzioni standard: non sono necessari dispositivi di protezione individuale aggiuntivi in quanto la malattia non è trasmessa da persona a persona	Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti e filtrante facciale a protezione 10 nei contatti con il malato	Non dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti e camice monouso nei contatti col malato	Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti, camice monouso, filtrante facciale a protezione 10 e occhiali nei contatti con il malato	IGIENE
1521	La trasmissione di Salmonella typhi avviene:	per via oro-fecale	per via aerea	per via sessuale	per contatto parenterale	IGIENE
1522	Per "deiscenza di una ferita" si intende:	apertura o mancata chiusura delle labbra della ferita stessa	una ferita che presenta adesioni con superfici contigue	una ferita che presenta espulsione di molti liquidi	una ferita che presenta cellule morte	IGIENE
1523	Un disinfettante si definisce batteriostatico:	quando inibisce la proliferazione batterica inattivando i microrganismi	quando non è in grado di agire sui virus	quando elimina la carica batterica	quando uccide i batteri inattivandoli	IGIENE
1524	La lebbra è una malattia provocata da quale dei seguenti microrganismi?	Mycobacterium	Pasteurella	Brucella	Xylella	IGIENE
1525	Quale tra i seguenti NON è l'agente eziologico di una tossinfezione alimentare?	Clostridium tetani	Bacillus cereus	Salmonella enteritidis	Clostridium perfringens	IGIENE
1526	In riferimento alla cateterizzazione vescicale a permanenza, è indicato scegliere cateteri:	in silicone o in siliconato in caso di cateterizzazioni per lunghi periodi	vescicali a tre vie per eseguire lavaggi vescicali in caso di infezioni	vescicali in lattice in caso di cateterizzazioni per lunghi periodi	vescicali a tre vie per eseguire esami uro dinamici e culturali in sicurezza	IGIENE
1527	Lo smaltimento degli escreti dei soggetti contaminati da tossina botulinica, deve avvenire attraverso:	incenerimento o passaggio in autoclave a temperature di almeno 120 °C	il medesimo percorso dei farmaci scaduti	passaggio in autoclave anche a temperature di 90 °C	incenerimento immediato	IGIENE
1528	Nel rifacimento del letto occupato:	è utile la presenza di due persone	nessuna delle altre risposte è corretta	è utile chiedere al paziente di mantenere il respiro	è importante obbligare tutti gli altri pazienti a uscire dalla stanza	IGIENE

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1529	Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale, quale fra i seguenti interventi infermieristici risulta ERRATO per la prevenzione di crampi addominali, flatulenza e distensione gastrica?	Al termine dell'alimentazione eseguire un lavaggio del lume della sonda, disconnettere la siringa e solo successivamente clampare la sonda	Al termine della somministrazione, eseguire il lavaggio del lume, clampare la sonda e solo successivamente disconnettere la siringa o il circuito	A ogni somministrazione, riempire la siringa a cono centrale con la formula alimentare, rimuovendo eventuali bolle d'aria formatesi durante l'aspirazione della stessa	All'inizio della somministrazione, clampare la sonda gastrostomica o il sondino nasogastrico, rimuovere il tappo e successivamente connettere la siringa a cono centrale o il circuito	IGIENE
1530	Indicare la sequenza corretta delle azioni che l'infermiere deve compiere per eseguire l'igiene delle mani con soluzione alcolica. 1. Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani. 2. Frizionare con la mano destra, con movimento rotatorio, in avanti e indietro le dita strette tra di loro nel palmo sinistro e viceversa. 3. Frizionare con il palmo della mano destra il dorso della mano sinistra, intrecciando le dita tra di loro e viceversa. 4. Frizionare palmo contro palmo, intrecciando le dita tra di loro. 5. Frizionare le mani palmo contro palmo. 6. Frizionare il dorso delle dita con il palmo opposto tenendo le dita strette tra di loro. 7. Frizionare, con movimento rotatorio, il pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa.	1 - 5 - 3 - 4 - 6 - 7 - 2	1 - 7 - 5 - 6 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 4 - 7 - 6 - 3 - 5	7 - 5 - 3 - 2 - 6 - 1 - 4	IGIENE
1531	Durante le manovre di igiene intima del paziente allettato:	è preferibile posizionare la padella e si procede al lavaggio con acqua e sapone	si fa assumere al paziente il decubito laterale per consentire un migliore accesso alle regioni da pulire con disinfettante sterile	si utilizza acqua tiepida con soluzione iodata	nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1532	Per quali tipi di patogeni vengono utilizzati gli antibiotici?	I Batteri	I Funghi	I Virus	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1533	La clorexidina è un disinfettante che agisce:	sui miceti e sui batteri gram-positivi e gram-negativi	sui miceti, sulle spore e sui virus	sui batteri gram-positivi e sui virus	nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1534	Per la prevenzione delle infezioni CVC correlate è raccomandato di praticare l'igiene delle mani:	prima e dopo la palpazione della sede d'inserzione	solo prima della palpazione della sede d'inserzione	solo prima delle procedure di sostituzione	nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1535	La pulizia dell'orifizio anale viene eseguita con il paziente:	posizionato sul fianco	nessuna delle altre risposte è corretta	in posizione prona	in posizione Fowler	IGIENE
1536	Uno degli scopi di una medicazione a piatto attuata su una ferita chirurgica semplice in via di normale guarigione è:	proteggere da infezioni	ritardare la cicatrizzazione	prevenire il sanguinamento	rilasciare endorfine	IGIENE
1537	La trasmissione dell'epatite C (HCV):	avviene per via ematica	nessuna delle altre risposte è corretta	avviene per via respiratoria	non è dimostrata scientificamente	IGIENE
1538	Un soggetto allergopatico che deve subire un intervento chirurgico in anestesia generale viene sottoposto a una premedicazione. Tale procedura prevede l'utilizzo di:	cortisonici	antipiretici	probiotici	antibiotici	IGIENE

LEGISLAZIONE SANITARIA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

Id	Quesito	Risp_esatta	Risp_errata 1	Risp_errata 2	Risp_errata 3	Materia
1539	Le aziende sanitarie dispongono di un patrimonio proprio?	Sì, secondo i principi che regolano la proprietà privata	No, perché i beni di cui dispongono sono di proprietà dello Stato	No, perché i beni di cui dispongono sono di proprietà della Regione	No, perché i beni di cui dispongono sono di proprietà del Comune	LEGISLAZIONE SANITARIA
1540	Chi, secondo il D.Lgs. 229/1999, provvede all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture pubbliche o private?	Le Regioni	Il Governo	Le ASL	Il Ministero della Salute	LEGISLAZIONE SANITARIA
1541	Le mutue sono state abolite definitivamente dalla legge 833/1978?	Sì	In parte	No	Solo alcune	LEGISLAZIONE SANITARIA
1542	Il Direttore generale di un'ASL è coadiuvato:	Dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario	Dal Direttore amministrativo, dal Direttore sanitario e da un coordinatore dei servizi sociali	Dal Direttore amministrativo, dal Direttore sanitario e dal Collegio dei revisori	Dal Direttore amministrativo, dal Direttore generale e dal Collegio sindacale	LEGISLAZIONE SANITARIA
1543	Chi istituisce e delimita le singole ASL?	Le Regioni	I Comuni	Lo Stato	Il Ministero della salute	LEGISLAZIONE SANITARIA
1544	La Carta dei servizi sanitari, con quale delle seguenti norme è stata introdotta?	Con il D.P.C.M. 19 maggio 1995	Con la L. 833/1978	Con la L. 502/1992	Nessuna delle altre risposte è corretta	LEGISLAZIONE SANITARIA
1545	L'Istituto Superiore di Sanità è:	un organo tecnico e scientifico del SSN	un'azienda privata	un dipartimento del Ministero della salute	un organo privato afferente al Ministero della salute	LEGISLAZIONE SANITARIA
1546	Il Piano Sanitario Nazionale ha durata:	triennale	quadriennale	biennale	quinquennale	LEGISLAZIONE SANITARIA
1547	Il Direttore amministrativo di una ASL:	è nominato dal Direttore generale	è nominato dalla Regione	è scelto mediante pubblico concorso	è nominato dal Ministro della Salute	LEGISLAZIONE SANITARIA
1548	Il Direttore sanitario di una ASL:	ha meno di 65 anni	può avere qualsiasi età	ha più di 65 anni	nessuna delle altre risposte è corretta	LEGISLAZIONE SANITARIA
1549	Il Direttore sanitario di una ASL:	è nominato dal Direttore generale	è nominato dalla Regione	è scelto mediante pubblico concorso	è nominato dal Ministero della Salute	LEGISLAZIONE SANITARIA
1550	Cosa sono i SERT?	Servizi per le tossicodipendenze	Servizi immunotrasfusionali	Servizi di vigilanza sanitaria	Nessuna delle altre risposte è corretta	LEGISLAZIONE SANITARIA
1551	Quale tra le seguenti attività non rientra in quelle che il distretto garantisce?	Attività di ricovero ordinario	Assistenza specialistica ambulatoriale	Assistenza termale	Assistenza residenziale e semiresidenziale	LEGISLAZIONE SANITARIA
1552	Il bilancio di previsione di un'azienda sanitaria viene approvato?	Dalla Regione	Dalla Provincia	Dal Ministero della salute	Dal Sindaco	LEGISLAZIONE SANITARIA
1553	Cosa significa l'acronimo IRCCS?	Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico	Istituto di ricovero a carattere scientifico	Istituto di ricovero convenzionato a carattere scientifico	Istituto di riabilitazione convenzionato a carattere specialistico	LEGISLAZIONE SANITARIA
1554	Da quale delle seguenti norme è disciplinata l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG)?	Dalla L. 194/1978	Dalla L. 502/1992	Dalla L. 833/1978	Nessuna delle altre risposte è corretta	LEGISLAZIONE SANITARIA
1555	Il collegio sindacale di una ASL dura in carica:	3 anni	4 anni	5 anni	6 anni	LEGISLAZIONE SANITARIA
1556	Di chi è la competenza dell'organizzazione sanitaria militare, secondo la legge 833/1978?	Dello Stato	Delle Regioni	Del Governo	Del Ministero della Salute	LEGISLAZIONE SANITARIA
1557	Le funzioni delegate alle Regioni dalla legge 833/1978 includono anche:	Controlli della produzione dei gas tossici e di sostanze pericolose	Produzione di prodotti dietetici	Produzione di attrezzature per il commercio e il deposito di sostanze radioattive	Nessuna delle altre risposte è corretta	LEGISLAZIONE SANITARIA
1558	Il D.P.R. 257/1971 ha istituito:	il Consiglio superiore di sanità	il Consiglio sanitario nazionale	il Ministero della Salute	tutte le altre risposte sono corrette	LEGISLAZIONE SANITARIA
1559	Quale ulteriore organo è previsto dal D.Lgs. 517/1999 per le aziende ospedaliere universitarie rispetto alle aziende sanitarie locali?	l'organo di indirizzo	il Consiglio dei sanitari	il Collegio sindacale	il Collegio di direzione	LEGISLAZIONE SANITARIA
1560	Le cause di risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore generale sono disciplinate:	dalla Regione	dal Ministero della Salute	dal Direttore sanitario	dalla Regione, sentito il parere del Ministero della Salute	LEGISLAZIONE SANITARIA
1561	Con il D.M. 6 luglio 2010, n. 167 il Ministero ha dettato la disciplina di quale Osservatorio?	Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità	Osservatorio nazionale rifiuti	Osservatorio nazionale volontariato	Osservatorio nazionale screening	LEGISLAZIONE SANITARIA
1562	In quale testo normativo è contenuta la frase: «Nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario, se non per disposizione di legge»?	Nella Costituzione	Nel Codice penale	Nel Codice civile	Nel Codice deontologico	LEGISLAZIONE SANITARIA
1563	Il decreto legislativo 81/2008 si applica:	A tutti i settori lavorativi	Solo ai settori privati	Solo ai settori pubblici con tipologia di lavoro a rischio	Solo ai settori privati con tipologie di lavoro a rischio	LEGISLAZIONE SANITARIA
1564	Nell'ambito dell'attività di farmacovigilanza, l'AIFA:	predispone piani di controllo dei medicinali in commercio	esercita la vigilanza sugli istituti zooprofilattici	esercita la vigilanza sui laboratori per il controllo sull'attività sportiva	effettua controlli su vaccini	LEGISLAZIONE SANITARIA
1565	Il fascicolo sanitario elettronico (FSE):	copre l'intera vita del paziente	dura un anno	dura dieci anni dura cinque anni	nessuna delle altre risposte è corretta	LEGISLAZIONE SANITARIA

LEGISLAZIONE SANITARIA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1566	Quale provvedimento ha dato attuazione al fascicolo sanitario elettronico?	Il D.P.C.M. 29-9-2015, n. 178	Il D.M. 2-11-2011	Il D.M. 2-7-2012	Il D.P.C.M. 20-6-2011	LEGISLAZIONE SANITARIA
1567	L'articolo 8 dello Statuto dei lavoratori pone il divieto al datore di lavoro di effettuare, in qualsiasi forma e ai fini dell'assunzione, indagini:	sulle opinioni di religione, politiche e sindacali	sullo stato di salute	sulle condizioni sociali	tutte le altre risposte sono corrette	LEGISLAZIONE SANITARIA
1568	La Circolare del Ministero della Sanità (oggi Ministero della Salute) del 1985, n. 52 è intitolata:	lotta contro le infezioni ospedaliere	lotta contro il lavoro in nero	lotta contro la malpratica	nessuna delle altre risposte è corretta	LEGISLAZIONE SANITARIA
1569	I Comitati infezioni ospedaliere (CIO) sono formati:	da team multidisciplinari	da ingegneri e infettivologi	da chirurghi e infermieri	dai preposti di tutti i reparti di un'azienda ospedaliera	LEGISLAZIONE SANITARIA
1570	Lo stato di necessità è disciplinato:	dal Codice penale	dal Codice civile	dal Codice deontologico	dalla Costituzione	LEGISLAZIONE SANITARIA
1571	L'interdizione è prevista per:	il maggiore di età e il minore emancipato, dalla quale infermità mentale deriva l'incapacità di provvedere ai propri interessi	il maggiore di età e il minore non emancipato, dalla quale infermità mentale deriva l'incapacità di provvedere ai propri interessi	il maggiore di età e tutti i minori, dalla quale infermità mentale deriva l'incapacità di provvedere ai propri interessi	nessuna delle altre risposte è corretta	LEGISLAZIONE SANITARIA
1572	Secondo quanto previsto dalla Costituzione, un trattamento sanitario è:	obbligatorio solo se previsto dalla legge	sempre obbligatorio	sempre facoltativo	nessuna delle altre risposte è corretta	LEGISLAZIONE SANITARIA
1573	Il collegio medico predisposto per l'accertamento di morte di un paziente deve esprimere:	un giudizio unanime	un giudizio per ogni professionalità afferente al collegio	non sempre un giudizio unanime	nessuna delle altre risposte è corretta	LEGISLAZIONE SANITARIA
1574	Il D.Lgs. 7-12-1993, n. 517 ha modificato:	il D.Lgs. 502/1992	la L. 833/1978	la L. 42/1999	nessuna delle altre risposte è corretta	LEGISLAZIONE SANITARIA
1575	Le ASL godono di:	personalità giuridica pubblica	personalità giuridica privata	autonomia giuridica	nessuna delle altre risposte è corretta	LEGISLAZIONE SANITARIA
1576	Quale articolo della Costituzione parla di ispezione personale?	Articolo 13	Articolo 22	Articolo 12	Articolo 43	LEGISLAZIONE SANITARIA
1577	L'Hospice è:	una residenza per pazienti terminali	un istituto di ricerca oncologica	una struttura di supporto per minori abbandonati	una struttura per anziani disabili	LEGISLAZIONE SANITARIA
1578	Qual è la funzione primaria del Ministero della Salute?	La tutela e la salvaguardia della salute pubblica	Il coordinamento delle Regioni, Comuni e Province in materia sanitaria	Il coordinamento delle Aziende Sanitarie	La scelta degli interventi e dei farmaci	LEGISLAZIONE SANITARIA
1579	Il D.L. 158/2012 (cd. decreto Balduzzi), in riferimento all'assistenza sanitaria primaria, ha introdotto:	la creazione di aggregazioni funzionali territoriali e unità complesse di cure primarie	la separazione operativa tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti	l'erogazione delle cure primarie nei soli ospedali	la creazione di ambulatori separati	LEGISLAZIONE SANITARIA
1580	Chi individua i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)?	Lo Stato	Le Regioni	Le Province	Le ASL	LEGISLAZIONE SANITARIA
1581	La sigla AIFA è l'acronimo di:	Agenzia Italiana del Farmaco	Associazione Italiana Farmacie	Associazione italiana del Farmaco Alternativo	Associazione Italiana Farmacisti	LEGISLAZIONE SANITARIA
1582	Secondo il D.Lgs. 502/1992, entro quanti giorni deve avvenire la nomina del Direttore generale in caso di vacanza dell'ufficio?	60 giorni	90 giorni	15 giorni	30 giorni	LEGISLAZIONE SANITARIA
1583	Le prescrizioni farmaceutiche elettroniche sono:	fruibili su tutto il territorio nazionale e su quello regionale	non sono possibili	fruibili solo sul territorio nazionale	fruibili solo sul territorio regionale	LEGISLAZIONE SANITARIA
1584	Cosa significa l'acronimo ECM?	educazione continua in medicina	educazione contrattuale in medicina	nessuna delle altre risposte è corretta	esperimenti continui in medicina	LEGISLAZIONE SANITARIA
1585	Secondo la legge 833/1978, le funzioni amministrative delegate alle Regioni sono:	sub-delegate ai Comuni	non vengono delegate	nessuna delle altre risposte è corretta	sub-delegate alle Province	LEGISLAZIONE SANITARIA
1586	Quale delle seguenti strutture non appartiene al Consiglio superiore di sanità:	Istituto superiore di sanità	Segretariato generale	Sezioni	Comitato di presidenza	LEGISLAZIONE SANITARIA
1587	Il Ministro della salute presiede l'AIFA ?	No	Sì, solo quando si prendono decisioni di direttivo	Sì, solo in casi specifici	Sì, sempre	LEGISLAZIONE SANITARIA
1588	Quale dei seguenti provvedimenti ha predisposto il passaggio alle Regioni ordinarie delle competenze in materia sanitaria?	Il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4	Il D.P.R. 16 gennaio 1973, n. 5	Il D.P.R. 18 gennaio 1970, n. 7	Il D.P.R. 17 gennaio 1971, n. 6	LEGISLAZIONE SANITARIA
1589	La relazione sullo stato di salute del paese è tenuta da quale tra queste autorità?	Il Ministero della Salute	Il Consiglio superiore di sanità	L'Istituto superiore di sanità	Il Governo	LEGISLAZIONE SANITARIA
1590	Il Piano Sanitario Regionale (PSR) ha una durata di:	3 anni	4 anni	5 anni	2 anni	LEGISLAZIONE SANITARIA
1591	Chi secondo quanto previsto nel D.Lgs. 502/1992, presiede il Consiglio dei sanitari?	Il Direttore sanitario	Il Direttore amministrativo	Il Coordinatore dei servizi sociali	Il Direttore generale	LEGISLAZIONE SANITARIA
1592	Ai sensi dell'art. 7 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, le funzioni dell'ISPESL sono state trasferite:	all'INAIL	all'Istituto superiore di sanità	al Ministero della salute	all'INPS	LEGISLAZIONE SANITARIA

LEGISLAZIONE SANITARIA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1593	Cosa si intende per sorveglianza sanitaria?	Insieme di atti medici, finalizzati alla salute e sicurezza dei lavoratori	Insieme di visite specialistiche offerte ai lavoratori	Ciclicità dei controlli medici e non offerti ai lavoratori	Periodicità dei controlli medici dei lavoratori	LEGISLAZIONE SANITARIA
1594	Una lavoratrice:	non può essere licenziata dall'inizio della gravidanza fino a tutto il periodo di interdizione dal lavoro prescritto dalla legge	non può essere licenziata dalla fine della gravidanza fino al compimento di due anni di età del bambino	nessuna delle altre risposte è corretta	non può essere mai licenziata	LEGISLAZIONE SANITARIA
1595	La Circolare del Ministero della Sanità (oggi Ministero della Salute) del 1985, n. 52 ha istituito:	l'infermiera addetta al controllo delle infezioni	il servizio di prevenzione e protezione	nessuna delle altre risposte è corretta	i comitati volontari in materia di infezioni ospedaliere	LEGISLAZIONE SANITARIA
1596	Secondo l'articolo 32 della Costituzione, il diritto alla salute è:	fondamentale	importante	obbligatorio	imprescindibile	LEGISLAZIONE SANITARIA
1597	Quale dei seguenti è uno strumento ordinario di raccolta dei dati di pazienti ricoverati presso istituti di ricovero pubblici e privati?	La cartella clinica	La SDO	Nessuna delle altre risposte è corretta	Il modello ISTAT	LEGISLAZIONE SANITARIA
1598	La SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera) deve essere firmata:	dal medico curante e dal Responsabile di divisione	dal Responsabile di divisione e dal Direttore sanitario	dal Direttore generale e dal medico curante	dal medico curante	LEGISLAZIONE SANITARIA
1599	Chi, nell'ambito dell'organizzazione aziendale verifica l'idonea compilazione e trasmette le schede di dimissioni ospedaliere al Ministero della Salute e alla Regione?	il Direttore sanitario	il Direttore amministrativo	il Primario della divisione	il Direttore generale	LEGISLAZIONE SANITARIA
1600	La legge 22-5-1978, n. 194 disciplina:	l'interruzione volontaria di gravidanza	il parto in anonimato	nessuna delle altre risposte è corretta	la potestà genitoriale	LEGISLAZIONE SANITARIA
1601	Secondo la normativa vigente, la morte di un paziente:	si identifica con la cessazione di tutte le funzioni dell'encefalo	si identifica con la cessazione di tutte le funzioni cardiache	si identifica con la cessazione di tutte le funzioni respiratorie	si identifica con la cessazione di tutte le funzioni circolatorie	LEGISLAZIONE SANITARIA
1602	Secondo le uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale, riportate nella legge 833/1978, lo Stato detta norme dirette ad assicurare condizioni di salute in materia di:	tutela igienica degli alimenti e delle bevande	tutela della maternità a rischio	tutte le altre risposte sono corrette	tutela dei lavoratori nei cantieri	LEGISLAZIONE SANITARIA
1603	Il Direttore sanitario di un'azienda sanitaria è laureato:	in medicina e chirurgia	non è laureato	in qualsiasi disciplina	in economia	LEGISLAZIONE SANITARIA
1604	A quale periodo risale il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)?	1992 – 1993	1980 – 1981	1990 – 1991	1994 – 1995	LEGISLAZIONE SANITARIA
1605	Secondo il D.Lgs. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. 229/1999, il SSN è:	il complesso delle funzioni e delle attività dei servizi sanitari regionali e degli enti ed istituti di rilievo nazionale	il complesso delle funzioni e delle attività dei servizi sanitari regionali	l'insieme dei piani e strategie sanitarie regionali	un metodo di programmazione pluriennale	LEGISLAZIONE SANITARIA
1606	Chi nomina il Direttore sanitario di un'azienda sanitaria?	Il Direttore generale	La nomina avviene per concorso pubblico	La Regione	Il Direttore amministrativo	LEGISLAZIONE SANITARIA
1607	Chi sostituisce il Direttore generale di un'azienda sanitaria in caso di assenza o impedimento?	Il Direttore amministrativo o il Direttore sanitario con precedenza per il più anziano	Sempre il Direttore sanitario	Sempre il Direttore amministrativo	Un coordinatore qualificato	LEGISLAZIONE SANITARIA
1608	In base al principio di sussidiarietà costituzionale, secondo quanti diversi livelli di responsabilità e di governo è articolato il SSN?	Due, quello centrale e quello regionale	Uno, quello regionale	Uno, quello centrale	Due, quello centrale e quello locale	LEGISLAZIONE SANITARIA
1609	Con quale delle seguenti norme è stato istituito il Sistema Sanitario Nazionale?	Dalla L. 833/1978	Dalla L. 833/1972	Dal D.Lgs. 502/1992	Dall'articolo 32 della Costituzione	LEGISLAZIONE SANITARIA
1610	In quale dei seguenti casi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 502/1992, alle Regioni non è consentito l'accreditamento di nuove strutture?	Nel caso in cui non venga adottato il Piano Sanitario Regionale dopo un anno dall'entrata in vigore del Piano Sanitario Nazionale	Nessuna delle altre risposte è corretta	In caso di mancanza di fondi	In caso di sovrannumero di strutture accreditate	LEGISLAZIONE SANITARIA
1611	Alla luce della normativa vigente, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria, spettano:	alle Regioni e alle Province autonome	al Ministero della Salute	ai Comuni	al Governo	LEGISLAZIONE SANITARIA
1612	Il Direttore amministrativo di una ASL:	è laureato in discipline giuridico/economiche	nessuna delle altre risposte è corretta	è laureato in medicina e chirurgia	non è laureato	LEGISLAZIONE SANITARIA
1613	Secondo l'articolo 32 della Costituzione, i trattamenti sanitari:	sono scelti liberamente dall'interessato, salvi i casi previsti dalla legge	sono scelti dall'interessato su consiglio medico	sono scelti dal medico	sono scelti dall'interessato	LEGISLAZIONE SANITARIA
1614	Cosa compete al collegio sindacale di un'azienda sanitaria?	La verifica della legittimità degli atti	Nessuna delle altre risposte è corretta	L'analisi dei costi	Le strategie di organizzazione	LEGISLAZIONE SANITARIA
1615	Il principio in base al quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento se non per disposizione di legge è contenuto:	nella Costituzione	nel T.U. leggi sanitarie	nel D.Lgs. 502/1992	nello statuto dei lavoratori	LEGISLAZIONE SANITARIA
1616	Quale dei seguenti organismi svolge attività di ricerca nel campo sanitario?	il Ministero della Salute	la Regione	l'Azienda ospedaliera	l'Azienda sanitaria	LEGISLAZIONE SANITARIA
1617	Il trattamento per i disturbi mentali è:	volontario e, talvolta, obbligatorio	non c'è alcuna specifica previsione	sempre volontario	sempre obbligatorio	LEGISLAZIONE SANITARIA

LEGISLAZIONE SANITARIA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1618	Il sindaco, secondo la L. 833/1978, è:	l'autorità sanitaria locale	il commissario della giunta regionale	il commissario del Ministero della Salute	l'autorità governativa locale	LEGISLAZIONE SANITARIA
1619	Cosa si intende per accreditamento istituzionale?	Le autorizzazioni ad erogare prestazioni per conto del SSN	Nessuna delle altre risposte è corretta	L'erogazione di prestazioni sanitarie per conto della Regione	La trasformazione di una struttura privata in pubblica	LEGISLAZIONE SANITARIA
1620	Che cosa si intende per TEAM?	La tessera europea di assicurazione malattia	La tessera di identità	La tessera sanitaria	Il codice fiscale	LEGISLAZIONE SANITARIA
1621	Il Fondo perequativo nazionale ha introdotto quale delle seguenti norme?	La L. Cost. 3/2001	Il D.P.C.M. 15 Maggio 1995	La L. 502/1992	La L. 833/1978	LEGISLAZIONE SANITARIA
1622	Secondo il decreto legislativo 81/2008, al termine pericolo va dato il significato di:	tutte le altre risposte sono corrette	nessuna delle altre risposte è corretta	proprietà intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni	qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni	LEGISLAZIONE SANITARIA
1623	Quale fonte giuridica stabilisce che il diritto di sciopero è esercitato nell'ambito delle leggi che lo regolano?	La Costituzione	Il Codice deontologico	Il Codice penale	Il Codice civile	LEGISLAZIONE SANITARIA
1624	Il D.Lgs. 196/2003 ha introdotto il concetto di:	privacy	diritto di informazione	diritto di cura	diritto di partecipazione	LEGISLAZIONE SANITARIA
1625	Con quale delle seguenti norme è stata introdotta in Italia la Scheda di Dimissione Ospedaliera?	Con il D.M. 28/12/1991	Con Circolare del Ministero della Sanità n. 52 del 1985	Con la L. 502/1992	Con la L. 833/1978	LEGISLAZIONE SANITARIA
1626	Chi ha diritto di accedere ai documenti amministrativi, secondo la L. 241/1990?	Chiunque abbia un interesse da tutelare che sia giuridicamente rilevante	Nessuno	Solo l'interessato	I parenti degli interessati	LEGISLAZIONE SANITARIA
1627	In quali dei seguenti casi un infermiere facente parte di una equipè dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia non può avvalersi dell'obiezione di coscienza?	Quando il suo intervento è indispensabile per la salute della donna	Quando non si configura uno stato di necessità	Quando a richiederla è una minore di anni 18	Quando a richiederla è una donna che ha già praticato una interruzione	LEGISLAZIONE SANITARIA
1628	I componenti del collegio medico accertante l'avvenuta morte di un paziente sono:	un medico legale, un medico specialista in rianimazione e un neurofisiopatologo	due medici	un medico specialista in rianimazione e un medico legale	un neurologo e un medico legale	LEGISLAZIONE SANITARIA
1629	Quale tra i seguenti non è un organo del Consiglio Superiore di Sanità?	Il Ministro della Salute	L'Assemblea generale	Il Comitato di presidenza	Le Cinque sezioni	LEGISLAZIONE SANITARIA
1630	La cartella clinica è conservabile:	anche solo in forma digitale, anche dalle strutture private accreditate	solo su supporto cartaceo	solo in forma digitale	anche solo in forma digitale esclusivamente dalle strutture pubbliche	LEGISLAZIONE SANITARIA
1631	Le prestazioni sanitarie dell'azienda sanitaria locale sono erogate attraverso:	Distretti sanitari	Collegi di direzione	Mandamenti	Circoscrizioni	LEGISLAZIONE SANITARIA
1632	L'osservatorio nazionale di farmacovigilanza è uno strumento di controllo e monitoraggio:	dell'AIFA	dell'Istituto Superiore di Sanità	del Consiglio Superiore di Sanità	del Ministero della Salute	LEGISLAZIONE SANITARIA
1633	Chi presiede il Consiglio superiore di sanità?	Nessuna delle altre risposte è corretta	Il Presidente della Repubblica	Il Presidente del Consiglio	Il Ministro della salute	LEGISLAZIONE SANITARIA
1634	Il Direttore amministrativo è un organo dell'azienda sanitaria?	No	Sì	No, tranne casi particolari	Sì, di concerto con il direttore sanitario	LEGISLAZIONE SANITARIA
1635	I dipartimenti di prevenzione garantiscono funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica, tra le quali non rientrano:	l'assistenza specialistica ambulatoriale	la prevenzione e controllo di malattie infettive	la sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori	la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	LEGISLAZIONE SANITARIA
1636	Con l'acronimo RSA si intende:	le residenze sanitarie assistenziali	la rappresentanza sindacale autorizzata	il riconoscimento scientifico di accreditamento	la responsabilità sanitaria e amministrativa	LEGISLAZIONE SANITARIA
1637	Quali sono le funzioni del Collegio di direzione di una ASL?	Coadiuvare il Direttore generale per il governo delle attività cliniche	La consulenza tecnico-sanitaria	Vigilare sulla regolarità amministrativa e contabile	Vigilare sull'osservanza della legge	LEGISLAZIONE SANITARIA
1638	L'ufficio relazioni con il pubblico (URP) è stato introdotto:	nessuna delle altre risposte è corretta	con L. 502/1992	con L. 833/1978	con D.P.C.M. 19 Maggio 1995	LEGISLAZIONE SANITARIA
1639	Chi viene rappresentato nella commissione mista conciliativa?	Tutte le altre risposte sono vere	La Regione	Gli Organismi di volontariato e tutela	L'ASL	LEGISLAZIONE SANITARIA
1640	Secondo il decreto legislativo 81/2008 il lavoratore è:	tutte le altre risposte sono vere	una persona che svolge un'attività indipendentemente dalla tipologia di contratto	una persona che svolge un'attività e che percepisce o non una retribuzione	una persona che svolge un'attività al solo fine di apprendere un mestiere	LEGISLAZIONE SANITARIA
1641	Su quale, tra i seguenti servizi, non è basato il funzionamento dei consultori familiari:	prestazioni alberghiere (vitto e alloggio)	servizio ginecologico	corsi di preparazione al parto	assistenza al singolo e alla coppia	LEGISLAZIONE SANITARIA
1642	Qual è tra le seguenti la fonte disciplinare degli obblighi del personale dipendente del SSN?	La contrattazione collettiva	Il testo unico delle leggi sanitarie	La legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale	Il codice civile	LEGISLAZIONE SANITARIA
1643	Quale articolo dell'allegato n. 7 del D.P.C.M. 19-5-1995 prevede che il paziente ha diritto di ottenere segretezza riguardo alla propria malattia?	Articolo 7	Articolo 3	Articolo 4	Articolo 5	LEGISLAZIONE SANITARIA
1644	Per quanti anni deve essere conservato il registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope delle unità operative?	2 anni	4 anni	10 anni	15 anni	LEGISLAZIONE SANITARIA

LEGISLAZIONE SANITARIA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1645	Cosa si intende per responsabilità penale?	Responsabilità che deriva dalla commissione di un reato	Responsabilità che deriva da un atto illecito che arreca danno patrimoniale	Responsabilità che deriva dalla violazione di un regolamento di disciplina	Nessuna delle altre risposte è corretta	LEGISLAZIONE SANITARIA
1646	La legge 10 agosto 2000, n. 251 ha introdotto:	la dirigenza infermieristica	l'ordine degli infermieri	la dirigenza infermieristica e l'ordine degli infermieri	nessuna delle altre risposte è corretta	LEGISLAZIONE SANITARIA
1647	Secondo la legge 1 febbraio 2006, n. 43, l'aggiornamento professionale avviene con modalità:	identiche a quelle mediche	obbligatorie	facoltative	nessuna delle altre risposte è corretta	LEGISLAZIONE SANITARIA
1648	L'articolo 3 della legge 1 febbraio 2006, n. 43:	istituisce gli ordini delle professioni sanitarie	delega il Governo per l'istituzione degli ordini delle professioni sanitarie	delinea il profilo dirigenziale infermieristico	nessuna delle altre risposte è corretta	LEGISLAZIONE SANITARIA
1649	La cartella clinica è:	un atto pubblico redatto da pubblico ufficiale	un atto pubblico redatto da incaricato di pubblico servizio	un atto privato redatto da medico o infermiere	un atto privato redatto da operatore sanitario	LEGISLAZIONE SANITARIA
1650	Qual è il braccio operativo di un Dipartimento di salute mentale?	Il Centro di salute mentale	Il Centro notturno	Il Dipartimento stesso	Il Distretto	LEGISLAZIONE SANITARIA
1651	L'aggettivo venefico è utilizzato dal codice penale per contraddistinguere un mezzo:	insidioso	doloso	tossico	lesivo	LEGISLAZIONE SANITARIA
1652	Cosa si intende per negligenza?	Omissione di atto doveroso	Mancanza di professionalità	Mancanza di impegno	Nessuna delle altre risposte è corretta	LEGISLAZIONE SANITARIA
1653	La responsabilità penale è:	personale	di tutta l'equipè	solo del medico	nessuna delle altre risposte è corretta	LEGISLAZIONE SANITARIA
1654	In base al D.M. 739/1994, l'infermiere agisce:	sia individualmente che in collaborazione	solo in collaborazione	senza alcuna autonomia	individualmente	LEGISLAZIONE SANITARIA
1655	Quali dei seguenti articoli disciplina la rivelazione del segreto professionale?	Articolo 622 del codice penale	Articolo 623 del codice penale	Nessuna delle altre risposte è corretta	Articolo 621 del codice penale	LEGISLAZIONE SANITARIA
1656	Con quale delle seguenti norme è disciplinato il reato di falsità materiale?	Articolo 477 del codice penale	Articolo 326 del codice penale	Articolo 483 del codice penale	Articolo 622 del codice penale	LEGISLAZIONE SANITARIA
1657	Quale tra i seguenti non rientra nel percorso previsto per la qualità nell'utilizzo della cartella infermieristica?	Diagnosi medica	Attuazione dell'assistenza	Valutazione finale	Pianificazione dell'assistenza	LEGISLAZIONE SANITARIA
1658	Cosa si intende per responsabilità civile?	Responsabilità che deriva da un atto illecito che arreca danno patrimoniale	Responsabilità che deriva dalla violazione di un regolamento di disciplina	Nessuna delle altre risposte è corretta	Responsabilità che deriva dalla commissione di un reato	LEGISLAZIONE SANITARIA
1659	L'infermiere:	sostiene i familiari e le persone di riferimento dell'assistito	sostiene solo i familiari	assiste solo il paziente	non è tenuto a sostenere i familiari dell'assistito	LEGISLAZIONE SANITARIA
1660	La cartella clinica, in ambito legislativo, gode:	di fede privilegiata	di relativa importanza	di fondamentale importanza	di particolare importanza	LEGISLAZIONE SANITARIA
1661	La cartella clinica è:	a formazione progressiva	a formazione settimanale	nessuna delle precedenti	a formazione ciclica	LEGISLAZIONE SANITARIA
1662	La documentazione infermieristica:	ha valore di atto pubblico in senso lato	ha valore di atto pubblico in senso stretto	non ha valore	ha valore certificativo	LEGISLAZIONE SANITARIA
1663	In quale dei seguenti casi è possibile richiedere ad un altro reparto farmaci stupefacenti?	In casi di emergenza	In casi gravissimi	Non è mai possibile	In casi di urgenza	LEGISLAZIONE SANITARIA
1664	L'infermiere:	conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le influenze che questo ha sul percorso assistenziale e sulla relazione con l'assistito	ha il dovere di essere informato sul progetto diagnostico-terapeutico, per le influenze che questo ha sul piano di assistenza e sulla relazione con la persona	non riceve alcuna informazione relativa al progetto diagnostico-terapeutico	non conosce il progetto diagnostico dell'assistito	LEGISLAZIONE SANITARIA
1665	Chi, tra l'incaricato di pubblico servizio e il pubblico ufficiale, può incorrere nel reato di rivelazione ed utilizzazione del segreto di ufficio?	Entrambi	Nessuno dei due	Solo il Pubblico Ufficiale	Solo l'incaricato di Pubblico Servizio	LEGISLAZIONE SANITARIA
1666	Quale articolo disciplina il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreto di ufficio?	Articolo 326 del codice penale	Nessuna delle altre risposte è corretta	Articolo 325 del codice penale	Articolo 327 del codice penale	LEGISLAZIONE SANITARIA
1667	Qual è la differenza tra la cartella clinica e la cartella infermieristica, dal punto di vista giuridico?	La cartella clinica è atto pubblico in senso stretto, la cartella infermieristica in senso lato	La cartella infermieristica è atto pubblico in senso stretto	Nessuna poiché entrambe possono essere redatte dal medico o dall'infermiere	La cartella clinica è atto pubblico in senso lato	LEGISLAZIONE SANITARIA
1668	Cosa si intende per responsabilità disciplinare?	Responsabilità che deriva dalla violazione di un regolamento di disciplina	Nessuna delle altre risposte è corretta	Responsabilità che deriva dalla commissione di un reato	Responsabilità che deriva da un atto illecito che arreca danno patrimoniale	LEGISLAZIONE SANITARIA
1669	Un reato colposo è caratterizzato da:	negligenza, imprudenza e imperizia	nessuna delle altre risposte è corretta	proposito deliberato di produrre l'evento	preterintenzione	LEGISLAZIONE SANITARIA
1670	Una lesione personale si dice lieve quando produce una malattia:	superiore ai 20 giorni ma inferiore ai 40	inferiore ai 40 giorni	non superiore ai 20 giorni	superiore ai 20 giorni ma inferiore ai 30	LEGISLAZIONE SANITARIA
1671	Una lesione personale si dice grave quando produce una malattia:	superiore ai 40 giorni	inferiore ai 50 giorni	superiore ai 20 giorni	superiore ai 30 giorni	LEGISLAZIONE SANITARIA

LEGISLAZIONE SANITARIA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1672	Un infermiere che compila una scheda di triage è:	pubblico ufficiale	Nessuna delle altre risposte è corretta	incaricato di pubblico servizio	ausiliario	LEGISLAZIONE SANITARIA
1673	Quale dei seguenti articoli punisce l'esercizio abusivo della professione?	articolo 348 del codice penale	articolo 2278 del codice penale	articolo 326 del codice penale	articolo 456 del codice penale	LEGISLAZIONE SANITARIA
1674	Quale articolo della legge 10 agosto 2000, n. 251 disciplina la professione sanitaria infermieristica?	Articolo 1	Nessuna delle altre risposte è corretta	Articolo 3	Articolo 2	LEGISLAZIONE SANITARIA
1675	Secondo la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 «Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina», in una situazione di urgenza, ove il paziente interessato non è in grado di conferire consenso, l'intervento:	viene effettuato immediatamente	non viene effettuato	mira a limitare i danni	è procrastinato	LEGISLAZIONE SANITARIA
1676	Quale tra le seguenti non rientra tra le attribuzioni dell'infermiere?	Identificazione dei bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici	Respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno	Somministrazione dei medicinali prescritti	Assistenza completa dell'infermo	LEGISLAZIONE SANITARIA
1677	L'iscrizione all'Ordine per un infermiere è:	è necessaria in ogni caso	indispensabile per essere assunti in strutture private	necessaria per esercitare la professione	indispensabile per essere assunti in strutture pubbliche	LEGISLAZIONE SANITARIA
1678	Secondo il D.M. 16-12-2010, gli infermieri possono erogare all'interno delle farmacie:	prestazioni professionali specifiche	prestazioni specialistiche	prestazioni di medicina non convenzionale	prestazioni di assistenza odontoiatrica	LEGISLAZIONE SANITARIA
1679	Chi accerta la corretta tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope delle unità operative?	Il Direttore del servizio farmaceutico	Il Coordinatore infermieristico	Il Dirigente medico	Il Direttore sanitario	LEGISLAZIONE SANITARIA
1680	La denominazione Professione sanitaria ausiliaria, sostituita con la legge 42/1999 dalla denominazione Professione sanitaria era contenuta:	nel R.D. 1265/1934	nel R.D. 1275/1934	nel R.D. 1268/1934	nel R.D. 1224/1934	LEGISLAZIONE SANITARIA
1681	La modifica apportata all'articolo 1 della legge in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (legge 3 aprile 2001, n. 120) consente l'uso degli stessi:	al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario	al solo personale medico	al personale sanitario non medico	al solo personale sanitario non medico	LEGISLAZIONE SANITARIA
1682	Quali sono le finalità dell'assistenza dell'infermiere pediatrico?	Preventive, riabilitative, palliative	Solo palliative	Solo preventive	Solo riabilitative	LEGISLAZIONE SANITARIA
1683	Secondo la normativa vigente, quale tra le seguenti non è una responsabilità giuridica dell'infermiere?	Morale	Penale	Civile	Disciplinare	LEGISLAZIONE SANITARIA
1684	Cosa si intende per imperizia?	Tutte le altre risposte sono corrette	Mancanza di esperienza	Mancanza di competenza	Mancanza di abilità	LEGISLAZIONE SANITARIA
1685	Nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM), è da ritenersi esonerato dall'obbligo di acquisizione dei crediti per tutto il periodo di formazione, il personale sanitario che:	Frequenta corsi annuali di formazione post laurea propri del profilo di appartenenza	Opera come libero professionista	Presta il servizio in strutture private	Non ha ancora completato il periodo di prova	
1686	L'operazione di scarico di una sostanza stupefacente o psicotropa nell'apposito registro deve essere firmata:	Dall'operatore che esegue la somministrazione	Dal Coordinatore Infermieristico dell'Unità Operativa	Dal Direttore di Farmacia	Dai medici dell'Unità Operativa	
1687	Com'è chiamata la raccolta dei dati effettuata nel momento in cui il paziente entra nella struttura sanitaria o viene preso in carico?	Accertamento iniziale	Valutazione	Accertamento diagnostico	Diagnosi infermieristica	
1688	Che cosa si intende per aggiornamento professionale?	Attività successiva al corso di laurea diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze e le competenze professionali	Attività formativa svolta durante il corso di laurea	Attività successiva al corso di laurea obbligatoria solo per gli infermieri libero professionisti	Nessuna delle altre risposte è corretta	
1689	Per Evidence Base Nursing si intende:	Il processo per mezzo del quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili, la loro esperienza clinica e le preferenze del paziente, in un contesto di risorse disponibili	Il processo per mezzo del quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche utilizzando la loro esperienza clinica in un contesto di risorse disponibili	Il processo per mezzo del quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili, la loro esperienza clinica, in un contesto di risorse disponibili	Il processo per mezzo del quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili, le preferenze del paziente, in un contesto di risorse disponibili	
1690	Per ospedalizzazione domiciliare si intende:	L'insieme delle prestazioni altamente specialistiche, di prassi erogate in ospedale, garantite al domicilio	L'accesso quotidiano del malato cronico in ospedale tramite regime di day-hospital	La fornitura di apparecchiature per la cura dei malati terminali al domicilio	Nessuna delle altre risposte è corretta	

LEGISLAZIONE SANITARIA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1691	In quale delle seguenti situazioni deve essere esplicitamente richiesto il consenso informato in forma scritta?	Sia per la trasfusione che per la donazione di sangue	Solo ed unicamente per le trasfusioni di sangue	Sia per la trasfusione che per la donazione di sangue, ad eccezione dei servizi di pronto soccorso	Nessuna	
1692	Chi definisce i LEA (Livelli Essenziali di assistenza)?	Lo Stato	Le Regioni	Le Asl	Il Ministero della Salute	
1693	La formulazione degli obiettivi nella pianificazione assistenziale:	tutte le altre risposte sono corrette	facilita la definizione degli interventi assistenziali	permette di identificare la situazione attesa in seguito all'assistenza	è fondamentale riferimento per la fase di valutazione	
1694	Le misure di isolamento in ospedale prevedono l'utilizzo di precauzioni:	Standard ed aggiuntive	Universali	Standard	Per i liquidi biologici in persone con HIV positivo	
1695	Quale delle seguenti affermazioni rispetto alle precauzioni standard è corretta?	Le precauzioni standard sono destinate all'assistenza di tutti i pazienti in ospedale, indipendentemente dalla diagnosi o dalla condizione di presunta infezione	Le precauzioni standard sono destinate all'assistenza di tutti i pazienti che si recano in ambulatorio	Le precauzioni standard sono destinate all'assistenza di pazienti immunodepressi	Le precauzioni basate sulla trasmissione sono destinate all'assistenza di pazienti nella stessa stanza di degenza	
1696	Cos'è l'Hospice?	Una residenza per malati in stadio terminale per qualunque patologia	Nessuna delle altre alternative è corretta	Una residenza per malati oncologici in stadio terminale	Un Istituto per la ricerca sul cancro	
1697	Quando è necessario applicare la procedura per la corretta identificazione del paziente?	Ogni qualvolta deve essere effettuata una prestazione alla persona assistita	Somministrazione di farmaci	Effettuazione di prelievi di sangue o di altri campioni biologici per gli esami clinici	Somministrazione di sangue ed emocomponenti	
1698	Il D.lgs. N. 81/2008 e s.m.i. titola:	Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro	Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183	Tuel	Testo unico per la regolamentazione dei diritti e dei doveri dei pubblici dipendenti	
1699	Il Servizio Sanitario Nazionale si fonda:	sul principio dell'universalità delle cure	sulla competizione con le strutture private	sul concetto di SSN come unico fornitore di prestazioni sanitarie	sul coinvolgimento delle assicurazioni	
1700	Le Regioni possono legiferare in materia sanitaria?	Sì, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale nonché dei Livelli Essenziali di Assistenza, come individuati da quest'ultima	Sì, ma solo su delega statale	No, poiché la tutela della salute è garantita costituzionalmente ed è di competenza esclusiva dello Stato	Sì, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale, a esclusione dei Livelli Essenziali di Assistenza di competenza esclusiva dello Stato	
1701	In Italia, sono iscritti e quindi assistiti dal Servizio sanitario nazionale:	tutti i cittadini	i soli cittadini che ne fanno domanda	i soli cittadini maggiorenni	i soli cittadini in stato di povertà	
1702	L'iscrizione all'ordine professionale, per l'infermiere:	Rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della professione, in qualsiasi forma	Non rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della professione	Rappresenta sempre un obbligo di legge	Rappresenta un obbligo ai fini dell'acquisizione del titolo e dell'abilitazione	
1703	Quali sono i principi fondamentali su cui si basa il servizio sanitario nazionale con la Legge 833/1978?	Universalità, eguaglianza ed equità	Accreditamento e globalità	Gratuità e riduzione dei tempi di attesa per i cittadini italiani	Privacy e sicurezza dei dati	
1704	Relativamente all'accreditamento di un'organizzazione sanitaria, indicare tra le seguenti alternative quella ERRATA.	L'accreditamento è un insieme di attività non sistematiche eseguite da un'organizzazione prima di offrire un prodotto/servizio al cliente-utente, valutandone e analizzandone i bisogni	Il cosiddetto "accreditamento istituzionale" è obbligatorio per erogare servizi per conto del Sistema Sanitario Nazionale	L'accreditamento è un processo che prevede la valutazione di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi	L'accreditamento è il processo mediante il quale un organismo preposto arriva a riconoscere formalmente che un'organizzazione sanitaria soddisfa determinati requisiti espliciti ed è dunque capace di svolgere determinati compiti	
1705	Nell'attività d'équipe, la responsabilità penale ricade:	su ogni singolo componente, poiché è strettamente personale e individuale	solo sul capo-équipe e sui medici a lui più vicini	sull'operatore che ha causato il danno	nessuna delle altre alternative è corretta	
1706	Secondo la Costituzione italiana, la salute:	è un diritto fondamentale della persona e un interesse della collettività	è un bene fondamentale del singolo individuo	non può essere annoverata tra i diritti dell'individuo	è la semplice assenza di malattia	
1707	L'esercizio abusivo della professione infermieristica è da considerarsi:	un reato penale	un reato civile	non un reato, ma solo un dolo	un reato preterintenzionale	

LEGISLAZIONE SANITARIA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1708	La medicina preventiva si occupa di:	misure atte a conservare e migliorare la salute della comunità	malattie professionali	infortuni sul lavoro	problemi medici aventi rapporto con il diritto	
1709	In caso di trasfusione di emoderivati, la normativa indica:	l'obbligo del consenso del ricevente e l'astensione dal trasfondere in caso di diniego	il mero obbligo del consenso del ricevente	la necessità del consenso solo per sangue e non per gli emoderivati	l'opportunità del consenso scritto del ricevente	
1710	L'art. 1 della legge n. 251 del 10 agosto 2000 chiarisce che gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione sanitaria di ostetrica svolgono assistenza:	Con autonomia professionale e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi	Nessuna delle altre alternative è corretta	Con autonomia professionale e utilizzando metodologie di valutazione multidisciplinare	Con autonomia professionale limitata ed espletando le funzioni previste dagli specifici Codici Deontologici	
1711	Le buone pratiche clinico-assistenziali, come declinato dall'Art. 5 della legge 24/2017 (Legge Bianco- Gelli) e s.m.i. in materia di responsabilità sanitaria, devono:	Seguire le raccomandazioni previste dal sistema nazionale delle linee guida	Non debbono seguire necessariamente le raccomandazioni previste dal sistema nazionale delle linee guida	Sono decise dal medico responsabile della cura del malato	Nessuna delle altre risposte è corretta	
1712	In base al d.lgs. 502/1992, l'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture autorizzate:	dalla Regione	dal Ministero dell'Interno	dalla conferenza Stato-Regioni-Province	dallo Stato o dal Presidente del Consiglio	
1713	Quali sono le principali funzioni dell'assistenza infermieristica, secondo quanto stabilito dal d.m. 739/1994 (Profilo professionale dell'infermiere)?	Prevenzione delle malattie, assistenza dei malati e dei disabili, educazione sanitaria	Sostenere, assistere e informare la persona e la collettività	Identificazione dei bisogni clinici, pianificazione, attuazione e valutazione degli interventi infermieristici	Collaborazione con gli altri operatori sanitari nel rispetto delle loro specifiche competenze	
1714	Riferendosi alle attività svolte in collaborazione con il medico e riguardanti l'iter diagnostico e terapeutico, il d.m. 739/1994 stabilisce che l'infermiere:	garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche	per le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche, si avvale delle figure di supporto	esegue le prescrizioni diagnostiche stabilite dal medico	prepara il paziente alle procedure terapeutiche	
1715	I Piani sanitari regionali devono essere approvati:	dalla Regione	dal Consiglio dei Ministri	dal Ministero della Salute e dell'Economia	dal Parlamento, su proposta del Ministero della Salute e di quello delle Infrastrutture	
1716	Che cosa sono gli Ordini e i Collegi Professionali?	Sono organi di autogoverno di una categoria professionale, sono costituiti per legge di Stato e hanno natura giuridica di ente di diritto pubblico	Sono un'autonoma associazione di persone che, volontariamente, si uniscono per soddisfare i propri comuni bisogni economici, sociali e professionali	Sono costituiti da un insieme di persone fisiche (gli associati) legate dal perseguimento di uno scopo comune	Sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizioni territoriali di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, avendo cura di promuovere il loro sviluppo nell'ambito delle economie locali	
1717	Il d.lgs. 502/1992, nell'ambito delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, prevede che la diversa utilizzazione di una struttura sociosanitaria:	sia sempre soggetta ad autorizzazione	non sia possibile, in quanto si tratta di strutture dedicate	sia soggetta ad autorizzazione solo in caso di modificazione delle tariffe applicate	non sia mai soggetta ad autorizzazione	
1718	Spesso durante il ricovero ospedaliero si rendono necessari degli interventi diagnostici e/o terapeutici che comportano dei rischi. Per questo motivo è stato necessario introdurre:	il consenso informato quale mezzo per legittimare tali atti	la modulistica informativa da distribuire agli utenti	figure professionali preposte a somministrare ai pazienti la modulistica informativa	la cartella clinica informatizzata, per poter documentare in modo dettagliato tutte le prestazioni erogate	
1719	Individuare l'affermazione corretta sui Livelli essenziali di assistenza (LEA).	I LEA sono le prestazioni e i servizi che il servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini	I LEA costituiscono le prestazioni di cui tutti i cittadini hanno bisogno per la tutela della propria salute	I LEA costituiscono le linee guida per gli operatori del servizio sanitario nazionale che servono per tutelare il diritto alla salute	I LEA costituiscono i servizi che il sistema sanitario nazionale è in grado di erogare per promuovere la salute e applicare coerentemente il diritto alla sua tutela	
1720	Secondo la legge 43/2006, quali requisiti sono richiesti per l'affidamento delle funzioni di coordinamento?	Master in coordinamento e tre anni di servizio nello specifico profilo	Laurea di primo livello e cinque anni di servizio nello specifico profilo	Laurea magistrale	Cinque anni di servizio nello specifico profilo	
1721	Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. 502/1992, i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA):	comprendono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione	nessuna delle altre risposte è corretta	sono definiti dalle Regioni, previo confronto con il Ministero della Salute	si suddividono nei seguenti ambiti: prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera, assistenza sociosanitaria	
1722	Il decreto ministeriale 739 del 14 settembre 1994:	vincola l'esercizio della professione	è un regolamento approvato dall'Ordine delle Professioni, ove esistente	è un regolamento stabilito dall'Associazione Professionale, ove esistente	è un regolamento non vincolante per l'esercizio della professione	

LEGISLAZIONE SANITARIA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1723	Indicare quale fra i seguenti fatti interessanti per la pubblica sanità NON deve essere immediatamente denunciato all'autorità sanitaria e all'ufficiale sanitario.	Patologie cronico-degenerative	Mancato smaltimento di rifiuti pericolosi	Presenza in commercio di medicinali guasti	Adulterazione di sostanze alimentari	
1724	Indicare, fra quelle elencate, l'affermazione corretta sul segreto professionale.	È un dovere moralmente assoluto e un obbligo giuridico	Si applica alle procedure terapeutiche, non a quelle diagnostiche	La sospensione dall'esercizio della professione e la cancellazione dagli Albi dispensano il soggetto dall'osservanza del segreto professionale	La sua rivelazione può essere in forma scritta, ma esclusivamente all'autorità competente	
1725	Se, pur conoscendo l'importanza del lavaggio delle mani come misura più importante di controllo delle infezioni ospedaliere, si omette volontariamente di adottare questa precauzione prima e dopo aver garantito assistenza ai pazienti, si parla di:	negligenza	imperizia	imprudenza	eccesso di zelo	
1726	Ai sensi della legge 251/2000, gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche:	svolgono assistenza con autonomia professionale, utilizzando metodologie di pianificazione per gli obiettivi dell'assistenza	non possono svolgere autonomamente attività dirette alla prevenzione e alla cura per la salvaguardia della salute individuale e collettiva	svolgono assistenza con autonomia professionale limitata, espletando esclusivamente le funzioni previste dai propri codici deontologici	svolgono assistenza con autonomia professionale limitata, utilizzando metodologie di pianificazione per gli obiettivi dell'assistenza previste dalle norme istitutive dei relativi profili professionali	